

KITAIBELIA	I. évf.	p.: 65.	Debrecen 1996. március
------------	---------	---------	------------------------

A sápadt kosbor (*Orchis pallens* L.) új lelőhelye a Bükk-hegységben

PELLES Gábor

Sátoraljaújhely 3980 Némahegy 7.

A Bükk-hegységben, Bükkszentlászlótól D-DK-re található „Vásárhely” nevű területre először 1991. júniusában hivatali munkám során jutottam el. Itt az enyhén DNY-nak lejtő hegyoldalt nagy kiterjedésű sajmeggyes-molyhostölgyes bokorerdő - lejtősztyep mozaikos társuláskomplex borítja, mely ekkor legszebb virágpompáját mutatta. A már elvirágzott magyar zergevirág (*Doronicum hungaricum*) és a még nyíló nagy ezerjófű (*Dictamnus albus*) tömegei mellett a rövid bejárás során megtaláltam az erdei szellőrózsa (*Anemone silvestris*) leveleit is.

A következő év tavaszán ismét felkerestem a helyet további kutatás céljából, s nem kis meglepetésemre és öröömre ekkor találtam rá a sápadt kosbor (*Orchis pallens*) néhány virágzó példányára. Azóta minden évben figyelemmel kísérem itt e növényt, az idén pedig SULYOK József kollégámmal állományát is részletesen felmértük. Összesen mintegy 70 példányt találtunk ebből az Északi-középhegységben meglehetősen ritka orchideából. Az egyedek eléggé szétszórta, de mindig az erdőfoltok szegélyén voltak megtalálhatók.

A sápadt kosbornak eddig mindössze néhány lelőhelye ismert a Bükkben (SOÓ 1973, SIMON 1992), de az utóbbi években tudomásom szerint ezekről nem került elő. A Bükkszentlászló melletti előfordulás annyiban érdemel figyelmet, hogy az eddigiektől jellegében is eltér, hiszen azok a hegység magasabban fekvő részeinek bükköseiben található. A „Vásárhely” környékének (Tatár-árok) vegetációjával LESS (1991) foglalkozott, s közölt adatokat a terület flórájáról is, ám az *Orchis pallens*-et nem említi a területről.

A „Vásárhely” területéről előkerült számos védett növényfaj közül említést érdemel még a piros kigyószisz (*Echium russicum*) és a bíboros kosbor (*Orchis purpurea*).

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerző 1992-ben a sápadt kosbor (*Orchis pallens* L.) új lelőhelyére bukkant a Bükk-hegységben, Bükkszentlászló mellett a „Vásárhely” nevű területen. Szemben a hegység magasabban fekvő részeinek bükköseiből eddig ismert előfordulásokkal, itt e növény sajmeggyes-molyhostölgyes bokorerdőben (*Ceraso-Quercetum pubescentis*) él.

IRODALOM

1. LESS, N. (1991): A Tatár-árok (Bükk-hegység) vegetációja. - Természetvédelmi Közlemények 1 (1): 65-68.
2. SIMON, T.: A magyarországi edényes flóra határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. pp.: 892.
3. SOÓ R. (1973): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve V., - Akadémiai Kiadó, Budapest.