

KITAIBELIA	XIV. évf. 1. szám	pp.: 16–29.	Debrecen 2009
------------	-------------------	-------------	---------------

Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról IV.

BAUER Norbert

MTM Növénytár, H-1476 Budapest, Pf. 222. bauer@bot.nhmus.hu

A dolgozat a Bakony-hegység és Bakonyalja florisztikai kutatása során az elmúlt két évben gyűjtött, ill. feldolgozott érdekesebb adataimait összegzi. Kiemelésre érdemes a Bakonyalja egy pontjáról új fajként előkerült *Senecio paludosus*, továbbá a Bakonyból korábban nem jelzett *Inula* × *hybrida*, *Malcolmia africana*, *Euphorbia taurinensis* kimutatása, a Keleti-Bakony területéről. A *Trigonella procumbens*, *Plantago altissima* korábbi (nem pontosan lokalizált) adatai nagy valószínűséggel nem a tájféldrajzi értelemben vett Bakony területéről származtak. A vizsgált terület egyes tájegységeire új fajok között a Déli-Bakonyból korábban nem közölt *Polystichum setiferum* említhető. Sikertelenül dokumentálni a régebbi gyűjtések alapján ismert, de az elmúlt évtizedekben nálunk feledésbe merült – feltehetően a sziklai reliktumaink közé sorolható – *Hieracium wiesbaurianum* néhány aktuális előfordulását. Ugyancsak a közelmúltban sikerült bizonyítani a *Marrubium* × *paniculatum* és az *Euphorbia* × *angustifrons* recens bakonyi előfordulását. E sorban említhető szintén csak évtizedekkel ezelőtt gyűjtött *Potamogeton berchtoldii*, *Valerianella coronata*, *Androsace maxima* újbóli előkerülése is. Figyelmet érdemel az új lelőhelyről, a devecseri Széki-erdőből előkerült *Hypericum barbatum* populáció is. A növényföldrajzi szempontból jelentős fajok egy részének regionális elterjedéséről a korábbi közléseket kiegészítve egyre pontosabb kép rajzolódik ki (pl. *Artemisia austriaca*, *Convolvulus cantabrica*, *Galium austriacum*, *Hornungia petraea*, *Ononis pusilla*, *Serratula lycopifolia*). Más taxonok térségbeli elterjedése azonban feltehetően még nem kellően feltárt, ill. adataik esetleg számottevően bővíthetők (pl. *Galium pumilum*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*, *Medicago monspeliaca*, *Ornithogalum sphaerocarpum*, *Seseli pallasii*, *Trinia ramosissima*, *Helleborus dumetorum*, *Iris humilis* subsp. *arenaria*). Az alábbi válogatásban néhány figyelemre méltó gyom- ill. gyom- jellegű faj (pl. *Herniaria glabra*, *Artemisia scoparia*, *Senecio sylvaticus*) aktuális adatai is megtalálhatók. Az itt közölt adatok jelentős része, kiemelten az értékesebb adatok, herbáriumi példányokkal (BP) dokumentáltak.

Az enumerációban a taxonok új adatainak megnevezését követően korábbi, de nagyrészt csak RÉDL (1942) monográfiáját követően publikált adatok hivatkozásait zárójelben adjuk meg. Jelen dolgozat ennél korábbi publikált adatokra, ill. herbáriumi gyűjtésekre csak néhány indokolt esetben tér ki. A felsorolás a Soó sorszámok HORVÁTH et al. (1995) munkájában szereplő rendszerét követi.

A taxonok azonosítása a következő művek alapján történt: JÁVORKA (1925), SIMON (2000), FISCHER et al. (2005), de néhány kritikus taxon esetén más/újabb határozókulcsok (GOTTSCHLICH 1996, MOLNÁR 2003, KIRÁLY – KIRÁLY 2004, FELFÖLDY 2007, SOMLYAY 2008) figyelembe vételével.

Használt rövidítések: á. – árok; e. – erdő; h. – hegy; p. – patak; v. – völgy)

Enumeráció

- 8012.00 *Equisetum hyemale* L.: Némethánya: Bittva-v., Pisztrángos-tó körül; Farkasgyepű: Tustán-á.; Bakonybél: Alsó-Szentgál; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, FEKETE et al. 1961, BÖLÖNI et al. 1997, GALAMBOS 1998, 2001, LÁJER 1998a, MÉSZÁROS – SIMON 2003, BAUER 2004).
- 8020.00 *Ophioglossum vulgatum* L.: Káptalanfa: Sárosfői-e. tisztásán *Deschampsietum*-ban; Nemeshány: Sárkány-rét; Devecser: Púpos-rét, *Succiso-Molinietum* állományokban; (RÉDL 1942, BOROS 1954, TALLÓS 1956, FEKETE et al. 1961, SZODFRIDT – TALLÓS 1966, BÖLÖNI et al. 1997, GALAMBOS 1998, BAUER 2001, 2004, MÉSZÁROS – SIMON 2003)
- 8028.00 *Asplenium adiantum-nigrum* L.: Bakonyszücs, Répás-árok, a Mókus-árok és a Bognár-árok találkozásától K-re, a Katonavágás É-i gerincén; (PILLITZ (1908) „a kápolnadombi szentgáli erdőben”, majd TALLÓS 1959a, SZODFRIDT – TALLÓS 1966, KEVEY 2001, KOVÁCS 2001, BAUER 2004).
- 8039.00 *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newm.: Farkasgyepű: Köves-patak v., Csurgó-kút; (RÉDL 1942, TALLÓS 1956, BÖLÖNI et al. 1997, GALAMBOS 1998, BAUER 2007).
- 8048.00 *Polystichum setiferum* (Forsk.) Woyнар: Ajka: Köves-árok (Szerencse-fel-forrás völgye), bükkösben. Korábban csak a Magas-Bakony néhány pontjáról jelezték (FEKETE et al. 1961, FEKETE 1963, GALAMBOS 1998 BP), a Déli-Bakonyra nézve új adat.
- 5.00 *Helleborus dumetorum* W. et K.: Tés: Kis-Futóné D-i gerincén sziklás erdőben; (vö. BAUER 2004).

- 13.00 *Aquilegia vulgaris* L.: Márkó: Slézinger-v.; Várpalota: Bükkfa-kút-árok; Tés: Csákány-v., Sötét-Horog, Öreg-Futóné, K-i oldalán gazdag *Fago-Ornetum*-ban; (vö. BAUER 2004).
- 25.00 *Hepatica nobilis* Mill.: Farkasgyepű: Farkashegyi-e., Felső-e., Bodas-patak v.; Németbánya: Bittva-v., Pisztrángos-tó körül; Zalahaláp – Ódörög: Viszlói-e.; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, KOVÁCS 1999, 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003, BAUER 2004).
- 26.00 *Anemone sylvestris* L.: Hárskút: Fehér-kő szikla tetején, erdőszélen néhány tő. Ez feltehetően az egyetlen előfordulása a Magas-Bakonyban, melyet RÉDL (1942) is csak irodalmi forrásból (Kornhuber 1859: „Fehérkőárok”) idéz, tudomásunk szerint az adatot eddig nem erősítették meg; Devecser: Széki-e., a Székpusztai-tó közelében; Kapolcs: Imár-h.; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-árok; Öskü: Felső-Balla, Hosszú-v., Gombás-v.; Felső-Bánta; Várpalota: Nyugati-nagymező; Isztimér: Burok-v., Hárs-d.; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, MÉSZÁROS 1997, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003, BAUER 2004, 2007).
- 27.00 *Anemone nemorosa* L.: Kisbér: Hántai-erdő, Ny-i szélén kis populáció; A Sári-Bakonyalján erős állománya él Bakonyszombathely: Feketevíz-pusztá erdeiben, utóbbi adat BÖLÖNI (ex verb.).
- 51.02 *Ranunculus nemorosus* DC.: Márkó: Slézinger-v.; Tés: Öreg-Futóné, Sötét-horog; Várpalota: Vaskapu-v.; (KEVEY 1999, BAUER – MÉSZÁROS 2001, GALAMBOS et al.).
- 61.00 *Thalictrum aquilegifolium* L.: Tapolca: Városi-e.; Zalahaláp – Ódörög: Viszlói-e.; Kolontár: Kolontári-e.; Ajka: Pokol-lik, Peres-e.; Nagyvázsony: Kis-rét; Veszprém: Csatár-h.; Nemesvámos: Vámosi-e.; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, SZODFRIDT – TALLÓS 1964, 1966, LENCSES 1996, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, BAUER 2004, 2007).
- 87.00 *Sorbus domestica* L.: Szóc: Balaton-hegy, melegkedvelő tölgyes szélén, néhány termő példány; (RÉDL 1942, KÁRPÁTI 1960, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 92.08 *Sorbus redliana* Kárp.: Korrekció: a Várpalota: Kis-Burok-v.-ből *Sorbus barthae* Kárp. néven közölt adatom (BAUER 2007) e taxon alatt értendő.
- 98.00 *Rubus idaeus* L.: Hárskút: Alsó-Hajag, Nagy-Nyerges, Középső-Hajag; Csehbánya: Szalmahíd-árok; bükkösökben (PILLITZ 1910, RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2003).
- 201.00 *Agrimonia procera* Wallr.: Szentgál: Öreghálás, Tekerület, régi irtásréteken, erdőszegélyeken tömegesen; Porva: Zsidó-e., erdőszélen Ménesjárás-pusztá felé, Kopasz-h., cserjésedő, egykori legelőn; Öskü: Móróc-tető, Öreg-Futóné lábánál, cseres-tölgyesben, de földút szélén; KIRÁLY – KIRÁLY (2004) munkája a Bakonyra vonatkozóan is részletesen áttekintette korábbi adatait. Az itt közölt új adatok egybevágóan élőhelypreferenciájával kapcsolatos megállapításaival.
- 224.00 *Rosa rubiginosa* L.: Olaszfalu – Alsópere: Kis-Magyválló, Aszó-v. felett, Orno-Quercetum tisztásán; Bodajk: Kesellő, a köfajtó közelében, száraz gyeppen, néhány bokr; Isztimér: Burok-v. felett, Mellár, tölgyes erdőszegélyben; FACsar (1980) a Veszprémi-fennsík környékéről, többféle élőhelyről közli.
- 235.00 *Prunus fruticosa* Pall.: Csabrendek: Öreg-h.; Sümeg: Haraszt; Márkó: Országúti-dűlő, Menyeki-erdő; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-v.; Hajmáskér: Látó-h.; Bakonykúti: Páskumi-d.; Inota: Bagyas-szőlőhegy; (TALLÓS 1956, LÁJER 1998a, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2004, 2007).
- 260.00 *Ribes uva-crispa* L.: Kisbér: Hántai-e., üde gyertyános-tölgyesében; (MAJER 1955, FEKETE et al. 1961, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, BÖLÖNI et al. 1997, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2004, 2007).
- 266.00 *Genista germanica* L.: Kolontár: Kolontári-e.; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, 1964, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003, BAUER 2007).
- 282.00 *Ononis pusilla* L.: Uza: Kisbakonyi-e., Kecskvár, Oszlop-h.; Nyirád: Kis-Bakony-h., Cseket-h.; Sáska: Csiplek-h., Cser-h., Magyar-h.; Tapolca: Nyulászó-d.; Zalahaláp: Herceg-tag feletti dolomitdombok; Zalahaláp – Ódörög: Vendek-h. lábán; Hegyesd: Hámos-d.; Veszprém: Tekerés-v.; Hajmáskér: Törökcspás; Tés: Móróc-tető; Várpalota: Pátyi-d., Kopasz-Hallgató; Inota: Öreg-Kálvária; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2004, 2007, KIRÁLY – KIRÁLY 2006).
- 286.00 *Trigonella procumbens* (Bess.) Rchb.: Várpalota: Cseri-domb felhagyott homokbányájában néhány folton tömeges. RÉDL (1942) egyetlen (valójában nem bakonyi) adatát ismerteti, Bartha Andor herbáriumára hivatkozva: Királyszentistván.
- 288.00 *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv.: Tés: Öreg-Futóné D-i lejtőjén, a Kerek-gyep alatt; Öskü: Felső-Balla, a lőtér sztyeprétein; Isztimér: Kis-Burok-v., Burok-e., DNy-i peremén. RÉDL (1942): Kiskuti-v., Pétfürdő.
- 303.00 *Trifolium aureum* Poll.: Németbánya: Hallgató; Bakonyoszlop: Dönt-h.; Hárskút: Nagy-Nyerges-h.; Zirc: Csengő-h.; Nagyvázsony: Kab-h., Bogárdi, Nyir-tó mellett; bükkös irtásokon, nyiladékokon; (RÉDL 1942, TALLÓS 1956, FEKETE 1966).
- 321.00 *Trifolium ochroleucum* Huds.: Devecser: Széki-e, Szőr-tető; Kolontár: Kolontári-e.; Öskü: Felső-Balla; (RÉDL 1942, KOVÁCS 2000, BAUER 2004, 2007).

- 331.00 *Dorycnium herbaceum* Vill.: Uzsa: Kisbakonyi-e., Oszlop-h.; Nyirád: Remece, Cseket-h.; Devecser: Széki-e., nyiladékokon és a Púpos-réten *Molinietum*-ban; Magyarpolány: Kálvária-d., Károlykúti-e.; Veszprém – Gyulafirátót: Bárány-cser; Hajmáskér: Hagyma-tető; Öskü: Felső-Balla; Bakonyháza: Csillag-h.; Jásd: Varga-h., Nád-h.; Szápár: Sánc-h.; száraz gyepekben, cserjésekben (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 349.00 *Astragalus onobrychis* L.: Uzsa: Vörös-tó-lap; Nyirád: Cseket-h.; Sáska: Kender-v.; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-v., Országúti-dűlő; Olaszfalu – Alsópere: Kis-Magyalló, Aszó-v. felett; Csetény: Gazda-páskom (Csetényi-tető); Jásd: Varga-h., Nád-h.; Szápár: Sánc-h.; Várpalota: Cseri-d., Pátyi-d., Nyugati-nagymező; Inota: Öreg-Kálvária, Belátó-h.; Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; Bodajk: Rigós; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2001, KOVÁCS 2001).
- 351.00 *Astragalus vesicarius* L. subsp. *albidus* (W. et K.): Öskü: Gombás-v. és Hosszú-v. közti hátton sok.
- 359.00 *Coronilla vaginalis* Lam.: Sáska: Kecskvár; Nyirád: Cseket-h.; Zalahaláp: Herceg-tag feletti dolomitdombok, zárt dolomitsziklagyepekben; Tés: Szűnyog-v., *Fago-Ornetum*; (RÉDL 1942, LENCSES 1996, MÉSZÁROS 1997, LÁJER 1998a, BAUER – MÉSZÁROS 2000, BAUER 2001, 2007).
- 381.02 *Vicia pannonica* Cr. subsp. *striata* (M.B.) Nym.: Isztimér: Burok-e.; Várpalota: Hárs-domb, a Kis-Burok-v. felett, *Orno-Quercetum* tisztáson és szóró körül; (PINKE et al. 2003, 2006, BAUER 2004).
- 385.00 *Lathyrus venetus* (Mill.) Wohlf.: Ajka: Pokol-lik; Ajka: Peres-e., Farkashegyi-e., Köves-árok; Bakonyszücs: Öreg-Szarvad-árok, Répás-árok, Bognár-árok; Csehbánya: Csalános-tető; Hárskút: Gyöngyös-h.; Márkó: Slézinger-v., Rókalyuk-árok; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2002, BAUER 2007).
- 388.00 *Lathyrus lacteus* (Bieb.) Wissjul.: Sümeg: Új-hegy; Márkó: Esztergáli-v.; Veszprém: Sas-h.; Öskü: Felső-Balla, Hosszú-v.; Isztimér: Burok-v., Somos-domb; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2007).
- 388.01 *Lathyrus pannonicus* (Jacq.) Garcke: Noszlop: Árvai-lap, Molnár-rét; Magyarpolány: Kun-szállás, gyomosodó lápréten; (SZALAI 1957, TALLÓS 1959a, b, LÁJER 1998a, BAUER et al. 2001, BAUER 2007).
- 394.00 *Lathyrus nissolia* L.: Tés: Hegyes-Berek, bükkös irtás szélén (PILLITZ 1910, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2007).
- 401.00 *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ.: Sáska: Kecskvár, Kender-v.; Szentgál: Hosszú-berek; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-v., Magyal, Gyökeres; Hajmáskér: Aszó-v.; Öskü: Felső-Balla; Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003, BAUER 2004).
- 407.00 *Peplis portula* L.: Taliándörögd: Bokor-kaszáló; Németbánya: Jáger-rét; Szentgál: Tekerület, pocsolyákban; (SZODFRIDT – TALLÓS 1966, MÉSZÁROS – SIMON 2002, 2003, BAUER 2004).
- 425.00 *Epilobium angustifolium* L.: Sáska: Agár-tető, Gyalogvaskapu; Farkasgyepű: Farkashegyi-e., Csurgókúti-oldal; Németbánya: Hallgató; Csehbánya: Kő-d.; Bakonyszücs: Kőrish., Kurta-v.; Porva, Pálhálás-pusztá: Holomány-tető; Bakonyháza: Zsidó-h., Gaja-szurdok; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2002)
- 443.00 *Polygala amarella* Cr.: Nyirád: Sár-álló, *Molinietum*-ban; (RÉDL 1942).
- Ptelea trifoliata* L.: Veszprém – Jutas: Cseri-e. és Jutas-e. között cserjésekben; egykor ültették.
- 481.00 *Anthriscus nitida* (Wahlbg.) Hazsl.: Farkasgyepű: Köves-patak v., Csurgókút, Bodas-patak v., Tustán-á.; Porva: Hátsó-irtás; Csesznek: Cuha-v.; Bakonyoszló: Ördög-árok; Isztimér: Burok-v., Disznófóga alatt; Ajka: Pokol-lik, Köles-kepei-árok, Köves-árok; (RÉDL 1942, TALLÓS 1956, FEKETE 1963, BÖLÖNI et al. 1997, BAUER 2004, 2007).
- 496.00 *Bupleurum praealtum* L.: Tés: Öreg-Futóné, Kerek-gyep; Hajmáskér: Aszó-v.; Öskü: Felső-Balla; Fehérvárcsurgó: Keresztes-h.; (BAUER 2004, 2007, KIRÁLY – KIRÁLY 2006).
- 498.00 *Bupleurum affine* Sadler: Kaposcsanak: Imár-h.; Öcs: Öcs-h.; Szentgál: Hosszú-berek; Nemesvámos: Tekerés-v.; Veszprém: Disznó-d., Országúti-dűlő; Hajmáskér: Ámos-h., Aszó-v.; Tés: Tési-Rakató; (RÉDL 1942, BAUER 2001, 2004, 2007, PINKE et al. 2003).
- 501.00 *Trinia ramosissima* (Fisch.) Rechb.: Pétfürdő: Cseri-e., molyhos tölgyes szélén, parlagon; Öskü: Solyi-dűlő, parlag eredetű, zárt száraz gyepekben (RÉDL 1942, LENCSES 1996, BAUER 2007)
- 514.00 *Seseli leucospermum* W. et K.: Nagyvázsöny: Hermán-v.; Hajmáskér: Solyi-erdőre-dűlő; Veszprém – Kádárta: Séd-v.; Hajmáskér: Látó-h., Séd-v., Solyi-erdőre-dűlő; Öskü: Felső-Balla és Hosszú-v., Magyarlinai-h.; Várpalota: Vaskapu-v.; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, LENCSES 1996, BÖLÖNI et al. 1997, MÉSZÁROS 1997, KOVÁCS 1999, 2000, 2001, BAUER – MÉSZÁROS 2000, BAUER 2004, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003).
- 515.00 *Seseli pallasii* Bess. (syn. *S. varium* Trev.): Pétfürdő: Cseri-e. szélén, a Péti-víz-völgye felett Cseridomb sztyepréteiben; Öskü: a 8-as főúttól D-re Peremartoni-e. szélén; Öskü: a Kápolna-domb vasúttól D-re eső részének platóján; Öskü: Tálóki-dűlő dombján; Öskü: Solyi-dűlő; Hajmáskér: Határ-e.; Várpalota: Nyugati-nagymező; Várpalota: Nyerges-tető. A fajt elsőként POLGÁR Sándor gyűjtötte a Bakonyban,

- Bodajk mellett (BP, 1921). Továbbá: MÉSZÁROS – SIMON (2001), SCHMIDT (2004).
- 541.00 *Tordylium maximum* L.: Bodajk: Rigós, erdőszegélyben kis állomány. RÉDL (1942) szerint gyakori, ma ez legfeljebb a Balaton-felvidék szőlőterületein állítható, de jelenlegi státusa ott is inkább szórványos. FEKETE – J-KOMLÓDI (1962) *Mercuriali-Tiliatum* felvételből: „Bakonybél: Somhegy” (?).
- 550.00 *Asperula tinctoria* L.: Csesznek: Kő-árok; Dudar: Kopasz-d., a Ny-i sziklás lejtőn a *Cotinus coggygria* Scop. előfordulás körül; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-árok; Olaszfalu – Alsópere: Kis-Magyalló; Hajmáskér: Hagyma-tető; Tés: Öreg-Futóné; Nyirád: Sár-álló; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 575.00 *Galium pumilum* Murray: Gézaháza, Kő-árok völgyfője felett, hegyi jellegű kaszálórét. RÉDL (1942) művében szereplő adatok valószínűleg a *G. austriacum* Jacq. taxonra vonatkoznak.
- 576.00 *Galium austriacum* Jacq.: Veszprém-Gyulafirátót: Répás-á.; Öskü: Csicsó-v., Felső-Balla; Tés: Öreg-Futóné; Várpalota: Vaskapu-v.; Isztimér: Burok-v.; (POLGÁR 1933, RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 587.00 *Valerianella coronata* (L.) DC.: Inota: Belátó-h., „Hideg-völgyi-sziklák” a Hideg-v. nyugati oldalán, meredek dolomitajtón, *Cotino-Quercetum*-ban, Baglyas-hegy, Síkvárgya” dolomitsziklagyepekben; RÉDL (1942) nem említi a fajt a Bakonyból. A BP herbáriumból előkerült egy Boros Á. által 1955-ben gyűjtött példánya a Baglyas-hegyről.
- 596.00 *Valeriana dioica* L.: Devecser: Széki-e., Nyirád: Remece; Németbánya: Jáger-rét; Farkasgyepű: Köves-patak v.; Pénzesgyőr: Hamuházi-tábla; Zirc: Putripuszt; Várpalota: Bántai-láprét; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, KOVÁCS 1962, LÁJER 1998b, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2002, 2004)
- 601.00 *Cephalaria transsylvanica* (L.) Schrad.: Kincsesbánya: Gaja-v., Rákhegy-dűlő; Iszkaszentgyörgy: Kisiszka, Sándor-major, Körtvélyes; Csór: Iszka-szőlőh., útszéleken, néhol tömeges; Várpalota: Bántapuszt, "Karszt-Horgásztó"-tól D-re, törmelékcupacon néhány (TALLÓS 1959a, BAUER – BÖLÖNI 2007).
- 608.00 *Scabiosa canescens* W. et K.: Bakonyszentlászló: Tilos-fenyő; Devecser: Székpusztai-rét, a Széki-e. Ny-i peremén; Nyirád: Remece, *Succiso-Molinietum* szélén; Sümeg: Új-hegy, Bárdió-tag; Tapolca: Hármás-h.; Sáska: Kecskvár, Cser-h., Csiplek-h.; Hegyesd: Sa-h.; Taliándörögd: Baksa-h.; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-árok, Magyar; Veszprém – Kádárta: Séd-v.; Tés: Szúnyog-v.; Hajmáskér: Aszó-v., Látó-h., Törökcsapás; Inota: Belátó-h.; Csór: Szenes-Horog, Száraz-Horog, Iszka-h.; Bakonykúti: Kisházi-Páskom; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959a, 1959b, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, 1966, MOLNÁR et al. 1995, MÉSZÁROS 1997, KOVÁCS 2000, BAUER 2001, 2004, 2006, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, 2003).
- 621.00 *Malva alcea* L.: Uza: Lesence-v.; (BAUER 2004, 2007).
- 628.00 *Linum flavum* L.: Tés: Nagy-rét-tető, cserjésedő száraz gyeppen; Várpalota: Nyerges-tető; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, MÉSZÁROS 1997, LÁJER 1998a, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2007)
- 631.00 *Linum hirsutum* L.: Csabrendek: Öreg-h.; Sümeg: Haraszt, felhagyott szőlőkben, kőbányákban tömegesen; Jásd: Varga-h., bolygatott száraz gyeppen; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2004, 2007).
- 638.00 *Geranium phaeum* L.: A Bakony nagyobb völgyeiben nem ritka, néhány új adata a Bakonyaljáról: Bakonyszombathely: Feketevízpuszta, a Concót kísérő üde erdőben; Devecser: Széki-e., Csigere-patak égeresében; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, FEKETE 1963, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003, BAUER 2004).
- 650.00 *Geranium palustre* L.: Uza: Lesence-v., magaskórásban, a vasútállomástól Ny-ra; Devecser: Széki-e., Mogyorós-kút; Olaszfalu: Perei-ér; Porva: Páskom, Nyolckaszás forrásai körül, a Hódos-ér felett, erdőszéli magaskórásban; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, MÉSZÁROS – SIMON 2003, BAUER 2004).
- 655.00 *Erodium ciconium* (L.) L'Hérit.: Csór: Iszka-szőlőhegy, löszös útszélén, a D-i oldalon, a Keleti-Bakony peremén. (PILLITZ 1910: „Márkó, Menyke”, PINKE et al. 2006: Várpalota és Csór közt).
- 666.00 *Euphorbia villosa* W. et K. ex Willd.: Nemeshany: Sárkány-rét, Nyirád: Remece; Devecser: Rák-sík
- 680.00 × 681.00 *Euphorbia × angustifrons* Borb.: Várpalota: Fajdas-h. lankás K-i lábán, egy felhagyott „bicskabánya” murvás felszínén, a szülőfajok (*E. segueriana* Necker, *E. panonica* Host.) között gyűjtöttük. A Bakonyban korábban Jávorka Sándor gyűjtötte Bakonykúti mellett (BP).
- 684.00 *Euphorbia taurinensis* All.: Várpalota: Badacsony-alja (Fajdas-szőlőhegy), szőlők közt felhalmozott kő- és törmelékcupacokon, szálanként. A Bakonyból még nem jelezték.
- 69.00 *Adonis flammea* Jacq.: Csór: Iszka-szőlőh., Gomba-h.; Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; Várpalota: Nyugati-nagymező; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, PINKE et al. 2003, 2006, BAUER 2004, 2007).
- 693.00 *Centaurium littorale* (Turner) Gilmour subsp. *uliginosum* (W. et K.) Rothm. ex Meldris: Noszlop: Hosszú-rét; Döbrönte: Ilkapusztai-láprét, mindkét helyen *Succiso-Molinietum*-ban; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, KOVÁCS 1962, SZODFRIDT – TALLÓS 1966).
- 695.00 *Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce: Magyarpolány: Károlykúti-e.; Németbánya: Jáger-rét; Szentgál: Tekerület; Hárskút: Alsó-Hajag, Gombápusztai-dűlő; Várpalota: Kikerítő; iszapnövényzetben; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, BAUER 2004).

- 698.00 *Gentiana cruciata* L.: Tés: Oszkó; Hárskút: Borzás-h., Törkö-lap, Alsó-Hajag; Szentgál: Vinyéte-árok; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2007, MÉSZÁROS – SIMON 2003).
- 700.00 *Gentiana pneumonanthe* L.: Nagyvázsony: Kis-rét; Nyirád: Remece; Devecser: Pernyész-rét, Szór-tető, Szarka-rét; Noszlop: Hosszú-rét, Árvai-lap, Molnár-rét; Bakonygyepes: Mák-hely; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, TALLÓS 1959b, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, 1965, MÉSZÁROS 1997, BAUER et al. 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003, BAUER 2007).
- 708.00 *Vinca herbacea* W. et K.: Veszprém – Gyulafirátót: Bárány-cser, Tüskés; Iszkaszentgyörgy, Csór: Iszka-szőlőh.; Kincsesbánya: Szeg-h.; (RÉDL 1942, LENCSES 1996, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2004).
- 717.00 *Convolvulus cantabrica* L.: Márkó: Kis-Gömbölyű-h., Kő-ka-pu-tető; Veszprém: Tüzes-tető, Bárány-cser, Rác-halála; Várpalota: Cseri-d., Józán-szőlő, Bögre-v., Vár-berek, Kopasz-Hallgató; Hajmáskér: Hagyma-tető, Aszó-v., Törökcsapás; Öskü: Felső-Balla, Kápolna-d.; „Vízmű-d.”; Inota: Óreg-Kálvária, Belátó-h., Baglyas-h.; Csór: Kilátó-h., Kis-Bácsó, Iszka-h.; Isztimér: Szentgyörgyi-e.; Bakonykúti: Páskumi-dűlő; Iszkaszentgyörgy: Kő-hegy; Kincsesbánya: Szeg-h.; Fehérvárcsurgó: Keresztes-h.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2001, KOVÁCS 1999, 2000, 2001).
- 722.00 *Omphalodes scorpioides* (Haenke ex Jacq.) Schrank: Olaszfalu: Nagy-Magyalló, Som-h.; Eplény: Határ-v.; Zirc – Akli: Köves-gerinc; (RÉDL 1942, FEKETE 1963, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, BÖLÖNI et al. 1997, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2004, 2007).
- 768.00 *Teucrium botrys* L.: Tapolca: Tücsöknyerítő-dombok (tűzpásztában); Tapolca: Nyulászó-domb, bolygatott száraz gyepben; Hegyesd: Sa-h., felhagyott köfejtőben; (RÉDL 1942, BAUER 2004, 2007).
- 776.10 *Marrubium* × *paniculatum* Desr. (syn. *M. remotum* W. et K.): Inota: Belátó-h., a murvabánya melletti gyomos gyepben; RÉDL (1942): „Jutas, Pétfürdő – Mész. (Bs.)”.
- 788.00 *Phlomis tuberosa* L.: Öskü: Kápolna-d., É-i lejtőn, a vasút felett; „Vízmű-domb”; Alsó-Gyélok, a majorhoz vezető út rézsűjében; Gombás-v., nyiladék; Hajmáskér: Hagyma-tető; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, BAUER 2004, 2007).
- 789.02 *Galeopsis angustifolia* Ehrh. ex Hoffm.: Zalahaláp – Ódörög: Csilla-h.; Hegyesd: Sa-h.; Pápa – Tapolcafő: Tevel-h.; Szentgál: Tisza-alja; Hárskút: Vejem-kő; Márkó: Kő-ka-pu-tető; Isztimér: Luszi-dűlő; szántókon, felhagyott köfejtőkben; (RÉDL 1942).
- 792.00 *Galeopsis tetrahit* L.: Porva: Hódos-ér-v., Hátsó-irtás, Nyolckaszás, üde erdőszegélyek; (RÉDL 1942).
- 817.00 *Melissa officinalis* L.: Öcs: Bököny-erdei-dűlő, erdőszélen, a Nagy-tó felé.
- 820.00 *Calamintha menthifolia* Host. subsp. *sylvatica* (Bromf.) Menitskij: Zalahaláp – Ódörög: Viszlói-e.; Sümeg: Lesence-v.; Uzsa: Kisbakonyi-e.; Öcs: Urasági-e.; Bánd: Malom-h.; Fehérvárcsurgó: Keresztes-h., Szeles-árok; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, KOVÁCS 1999, BAUER 2007).
- 882.00 *Gratiola officinalis* L.: Noszlop: Árvai-lap; Nyirád: Remece, Sár-álló; Kolontár: Kolontári-e. láprétjén, vízállásos gyepben (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, 1965, KOVÁCS 2001).
- 891.00 *Veronica montana* L.: Farkasgyepű: Bodas-patak völgye, a Jégvermi-földek alatt, üde gyertyános-tölgyesben; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, BAUER 2007).
- 965.00 *Plantago arenaria* W. et K.: Zalahaláp: Herceg-tag; Nyirád: Falu-rét, parlagon tömeges; (RÉDL 1942, BAUER 2006).
- 969.00 *Plantago argentea* Chaix: Márkó: Országúti-dűlő; Veszprém: Sas-h.; Hajmáskér: Tó-h., Aszó-v., Likaskői-h., Vásártér, Törökcsapás; Öskü: Körös-h., Lapos-h., Hosszú-v., Felső-Balla, „Vízmű-d.”; Várpalota: Vaskapu-v.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2004, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003).
- 971.00 *Plantago altissima* L.: Veszprém – Kádárta: Rekeszi-rét, a Séd-patak mentén, mocsárréten, más alföldi fajokkal pl. *Clematis integrifolia*, *Carex distans*, *Teucrium scordium*; RÉDL (1942) v. Bartha herbáriumi példányára hivatkozva „Pétfürdő” megjegyzéssel közli.
- 1022.00 *Aethionema saxatile* (L.) R. Br.: Nemesvámos: Hárs-h.; Márkó: Kerek-hegyi-dűlő; Veszprém: Csatár-h.; Veszprém - Gyulafirátót: Gyökeres, Magyal-h., Bárány-cser, Tüskés; Hajmáskér: Aszó-v., Hajcsár-d., Öskü: Felső-Bánta, Malom-kúti-v., Hosszú-v., Gombás-v., Olasz-erőd, Felső-Balla; Várpalota: Cseri-d., Vár-berek, Kőhányás-alja, Nyugati-nagymező, Nyerges-h.; Isztimér: Kis-Burok-v., Burok-e.; Bakonykúti: Kisházi-páskom; Csór: Kilátó-h., Kis-Bácsó, Iszka-h.; (RÉDL 1942, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, KOVÁCS 1999, LENCSES 1996, MÉSZÁROS 1997, BAUER – MÉSZÁROS 2000, BAUER 2001, 2004).
- 1032.00 *Hornungia petraea* (L.) Rchb.: Zalahaláp – Ódörög: Csilla-h.; Sáska: Ember-kő, Cser-h. dolomitsziklagepekben; Bakonyszücs: Répás-árok felett, a Nyírmegyeri-út, Kopasz-h. felé, kisebb tisztás dolomitszikláján; Tés: Óreg-Futóné, Téses-tető, dolomitsziklán; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, BAUER – MÉSZÁROS 2000, MÉSZÁROS – SIMON 2002, BAUER 2004).
- 1058.00 *Cardamine amara* L.: Taliándörög: Ilonaházi-kút; Farkasgyepű: Köves-patak v., Bodas-patak v.; Némethbánya: Jáger-rét; Csehbánya: Szalmahíd-á., Torna-patak v.; Csesznek: Cuha-v., Rekettyés-á.; Zirc:

- Király-kút, Szarvas-kút, Putripuszta; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, LÁJER 1998a, BAUER 2007).
- 1073.00 *Nasturtium officinale* R. Br.: Öskü: Tálók-dűlő, Táloki-források kifolyójában tömeges; Öskü: Középső-Tálók, Kikeri-tótól D-re, árokban; (PILLITZ 1910, BOROS 1937, RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1081.00 *Malcolmia africana* (L.) R.Br.: Várpalota: Vár-v. alján a kis temető mellett, löszös útszéli tömeges.
- 1082.00 *Hesperis tristis* L.: Nagytevel: Tevel-h.; Hajmáskér: Aszó-v.; Hajcsár-d., Törökcsapás; Öskü: Felső-Bánta, Hosszú-v.; Várpalota: Cseri-d., Bögre-szőlők, Nyugati-nagymező, Nyerges-tető, Kis-Burok-v.; Inota: Belátó-h., Hideg-v.; Isztimér: Burok-e.; Csór: Iszka-h.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2002, 2003, BAUER 2004).
- 1085.00 *Erysimum cheiranthoides* L.: Úrkút: Felső-Csinger-v.; Hárskút: Vejem-kő alatt Aranyos-patak közelében, bolygatott, üde erdőszéleken (RÉDL 1942, BAUER 2004, PINKE et al. 2006).
- 1097.00 *Sisymbrium loeselii* Jusl.: Nagyvázsöny, Hermán-v. K-i peremén, szemetes helyen (BAUER 2007).
- 1120.00 *Viola collina* Bess.: Uzsa: Oszlop-h.; Nyirád: Cseket-h.; Sáska: Ember-kő; Olaszfalu: Nagy-Magyalló; Hajmáskér: Látó-h., Séd-v.; Öskü: Hosszú-v.; Várpalota: Vaskapu-v., Bükkfa-kút-árok; (MÉSZÁROS 1997, BAUER – MÉSZÁROS 2000, BAUER 2001, 2004, 2007, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1121.00 *Viola ambigua* W. et K.: Csór: Iszka-h.; Hajmáskér: Látó-h., Ótott-h.; Öskü: Körös-h., Lapos-h., Felső-Bánta; Inota: Öreg-Kálvária, Baglyas-szőlőhegy, törpemandulásokban; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1124.00 *Viola rupestris* F. W. Schm.: Uzsa: Kisbakonyi-e., Hosszú-Magyal, Oszlop-h., Sáska: Cser-h., Csiplek-h.; Zalahaláp: Herceg-tag; Tapolca: Tücsöknyerítő-d.; Jásd: Nád-h., Szápár: Sánc-h.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2003, BAUER 2007)
- 1149.02 *Hypericum maculatum* Cr. subsp. *obtusiusculum* (Tourlet) Hayek (syn. *H. dubium* P. Mártonfi): E taxont P. Mártonfi revíziója alapján ismerjük a Bakonyból, aki Polgár Sándor korábbi *Hypericum maculatum* Cr. ssp. *Desestangsiforme* Fröhlich. néven cédulázott gyűjtései („inter Zirc et Borzavár”) alapján közli (MÁRTONFI et al. 1999). Néhány újabb adata: Hárskút: Alsó-Hajag, Fehér-kő; Pénzesgyőr: Bárány-legelő; Ugod: Makkos-árok; Fenyőfő: Pápai-lapos, Körös-h., Tekereskút-árok; üde erdőszegélyeken; Borzavár: Páskom; A *H. m.* ssp. *Desestangsiforme* taxont SZALAI (1957) is közli.
- 1151.00 *Hypericum barbatum* Jacq.: Devecser: Széki-erdő, kavicsos dombháton, a 8-as nyiladéka merőleges, kaszált nyiladékon, fiatal tölgyes szélén (~20 tő). Korábbi adatok: RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1968b, ill. Mészáros András és Simon Pál néhány éve újra megtalálta régi nyirádi adatát (Mészáros et Simon ex verb.), mely után, ez a második aktuális bakonyaljai előfordulás.
- 1168.00 *Campanula cervicaria* L.: Nemesahy: Sárkány-rét, *Molinietum*-ban; Kolontár: Kolontári-e., cseres-tölgyesben; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1964, MÉSZÁROS – SIMON 2002, BAUER 2007).
- 1176.00 *Campanula rapunculus* L.: Isztimér: Tüskés, fás-legelő szélén; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-árok felett, a Magyal sztyeprétjén, Bárány-cser, nyílt molyhos tölgyesben; Várpalota: Nyugati-nagymező, Julisírja, Gombás-v., Nyerges-tető; (POLGÁR 1933, RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, BAUER 2007).
- 1182.00 *Phyteuma orbiculare* L.: Tés: Öreg-Futóné, Bér-h., Tompa-v.; Várpalota: Vaskapu-v., Bükkfa-kút-á. Vár-berek; (RÉDL 1942, BAUER – MÉSZÁROS 2000, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, BAUER 2004).
- 1192.00 *Aster amellus* L.: Veszprém-Gyulafirátót: Alsó-Bárány-cser, *Orno-Quercetum* tisztáson; Tés: Bér-h.; Hajmáskér: Törökcsapás; Várpalota: Nyerges-tető; Csór: Iszka-h.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, 2003, BAUER 2004, 2007).
- 1203.00 *Bombcilaena erecta* (L.) Smolj.: Szóc: Balaton-h.; Nagyvázsöny: Edvárd-h., Nözsér, legeltetett száraz gyeppen; (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003, 2006, BAUER 2004, 2007).
- 1208.00 *Gnaphalium sylvaticum* L.: Tés: Oszkó, Hegyes-Berek; (RÉDL 1942, BAUER 2004, 2007).
- 1211.00 *Helichrysum arenarium* (L.) Mönch: Tapolca: Nyulászó-d., Tücsöknyerítő-d.; Hegyesd: Sa-h., Hámos-d.; Öskü: Felső-Bánta; (RÉDL 1942, KOVÁCS 2001, BAUER 2004, MÉSZÁROS – SIMON 2002, 2003).
- 1214.00 × 1218.00 *Inula × hybrida* Baumg.: Tés: Bér-h., a hegy D-i oldalán, *Amygdaletum nanae* és bokorerdő közti tisztáson, a szülőfajok között. A Bakonyból eddig nem gyűjtötték, de Borbás és Jávorka gyűjtéseinek köszönhetően Balatonfüred környékéről már dokumentált (BP).
- 1218.00 *Inula germanica* L.: Öskü: Táloki-dűlő, cserjésben kis folton; Várpalota, Pétfürdő: a Cseri-domb több pontján; Inota: Baglyas-szőlőhegy, Túró-Horog; (RÉDL 1942, BAUER – BÖLÖNI 2007).
- 1220.00 *Inula oculus-christi* L.: Devecser: Székpusztai-réten, a Székpusztai-tótól (víztározó) K-re egy kis magasságú ecén mész-kő dombon, félszáraz gyeppen. A Bakonyalján figyelemre méltó faj közelében néhány más erdőssztyep- (egy-két sziklai) növény is megtalálható, pl.: *Anemone sylvestris* L., *Adonis vernalis* L., *Rosa gallica* L., *Dorycnium germanicum* (Gremli) Rikli, *Prunella grandiflora* (L.) Scholler, *Scabiosa canescens* W. et K., *Dictamnus albus* L., *Geranium sanguineum* L., *Globularia punctata* Lap., *Campanula sibirica* L., *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich., *Poa badensis* Hke. stb.; A faj a Déli-Bakonyban szórványos, a Keleti-Bakonyban elterjedt, néhány kiegészítő adata: Sümeg: Mogyorós-d.;

- Nemesvámos: Hermán-v.; Lókút: Papod-h.; Veszprém: Tüzes-tető, Cseri-e.; Hajmáskér: Hagyma-tető, Látó-h., Aszó-v.; Öskü: Felső-Balla, Hosszú-v.; Malomkúti-v.; Várpalota: Cseri-d., Nyerges-tető; Isztimér: Szentgyörgyi-e.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2004, MÉSZÁROS–SIMON 2001).
- 1223.00 *Carpesium cernuum* L.: Zalaszántó: Farkas-hegy, sziklás üde erdőben, igen ritka; RÉDL (1942): Márkó „Kápolnadomb”.
- 1237.00 *Bidens cernuus* L.: Öcs: Nagy-tó szélén, az elgátolás mellett újabban tömegesen jelent meg; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1249.00 *Achillea distans* W. et K.: Olaszfalu – Alsópere: Kis-Magyalló, Aszó-v. felett; Tés: Öreg-Futóné; Hajmáskér: Aszó-v.; Öskü: Felső-Balla; Várpalota: Nyerges-tető; karszterdőkben, bokorerdőkben, nyílt molyhos tölgyesekben; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, FEKETE 1966, BAUER 2004, 2007).
- 1267.00 *Artemisia austriaca* Jacq.: Veszprém: Jutaspuszta, Rátóti-nagymező Ny-i részén, az Esztergáli-völgy alatti erdős dombok alján. Valószínűleg RÉDL 1942 „Jutas – Eplény!” adatának megerősítése. További bakonyi adatai: RÉDL (1942), BAUER (2007).
- 1271.00 *Artemisia scoparia* W. et K.: Veszprém – Gyulafirátót: Nagy-mező, gyomos útszélén néhány tő; Zalahaláp: Herceg-tag, bolygatott homoki gyepekben és törmelékcupacokon, tömegesen; PILLITZ (1910): Nagytevel [ez az adat a herbáriumi lap (BP) alapján téves, törlendő], RÉDL (1942): Nyirád „Agártető alja”.
- 1278.00 *Erechtites hieraciifolia* (L.) Raf.: Bakonyszücs: Réz-bükk-árok, földút szélén; (RÉDL 1942, BAUER 2001, 2004, MÉSZÁROS–SIMON 2001, 2003).
- 1280.00 *Doronicum hungaricum* (Sadl.) Rchb.: Várpalota: Juli-vágás tölgyes tisztásán, néhány tő.
- 1288.00 *Senecio sylvaticus* L.: Némethánya: Hallgató, Szarvas-rét, friss tarvágás gyomnövényzetében és erdő szélén; (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003).
- 1290.00 *Senecio vernalis* W. et K.: Devecser: vasútállomás; Noszlop: Becsei-e.; Kolontár: Kolontári-e., nyiladékok, utak mentén; Tés: Bér-h., a vadállomány által erősen bolygatott gyepekben; Várpalota: Badacsony-alja, szőlők közt, Nyugati-nagymező, földút szélén; (BAUER 2001).
- 1296.00 *Senecio paludosus* L.: Devecser: Széki-e., a Nádas-ér mentén, a Pernyész-rét déli részén, *Molinietum* szélén (~10 tő). A Bakonyaljára és az egész Bakonyvidékre új adat. Legközelebbi előfordulása a Marcal-medencéből ismert, itt Boros Ádám gyűjtötte (BP).
- 1306.00 *Carlina acaulis* L.: Hárskút: Borzás-h., cserjésedő hegyi réten; (SZALAI 1957, TALLÓS 1959a, LAJER 1998a, BAUER 2001, 2007, MÉSZÁROS–SIMON 2003).
- 1323.00 *Cirsium brachycephalum* Juratzka: Várpalota: Kikeri-tó üdébb *Molinia coerulea* s.l. és *Deschampsia caespitosa* gyepeiben (KOVÁCS 1962). A közeli Sárréten és a Balaton körüli még ma is elég gyakori faj.
- 1326.00 *Cirsium pannonicum* (L.f.) Link: Devecser: Széki-e., Püpos-rét ÉNy-i részén, erdőszélén *Succiso-Molinietum*-ban. Németh F. már gyűjtötte a Széki-erdőben (BP); (POLGÁR 1935, RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1329.10 *Cirsium × tataricum* (Jacq.) All.: Porva: Hódos-ér-v., Páskom, a falutól É-ra, a Hátsó-irtás felé, erdőszéli magaskórósban, a szülőfajokkal (*Cirsium canum* (L.) All., *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.); (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1331.00 *Crupina vulgaris* Pers. in Cass.: Csór: Iszka-h., Kis-Bácsó; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1333.00 *Serratula lycopifolia* (Vill.) Kern.: Hajmáskér: Hagyma-tető, néhány tő, nyiladékon, a csúcstól É-ra, felszáraz gyepekben; Öskü: Felső-Balla K-i részén, kis populáció, felszáraz gyepekben; Öskü: Hosszú-v. északi részén; Öskü: Gombás-v., nyiladékon; Öskü: 326,3 és a 321,1 m-es dombok között, a hajmáskéri Aszó-v. felett, felnyíló *Orno-Quercetum*-ban; Inota: Baglyas-h., Hideg-v., néhány tő *Orno-Quercetum* szélén /megerősítés/; A hegységben először Kitaibel találta a Baglyas-hegyen, 1799-ben (vö. GOMBOCZ 1945, WALDSTEIN & KITAIBEL 1802). További adatok: POLGÁR 1933, MÉSZÁROS 1997, ill. BAUER 2001, 2007).
- 1334.00 *Serratula radiata* W. et K.: Öskü: „Vizmű-d.”; Hajmáskér: Törökcsapás; (vö. BAUER 2007).
- 1336.00 *Centaurea solstitialis* L.: Hajmáskér: Látó-h., dolomitbánya felett; Inota: Öreg-Kálvária, a hegy száraz gyepeiben szálanként, K-i lábán az elhanyagolt futballpálya gyepeiben tömegesen; Iszkaszentgyörgy: Kő-h. és Szeg-h. közt szőlőkben; (RÉDL 1942, BAUER 2001, 2007, PINKE ET AL. 2006).
- 1341.02 *Centaurea scabiosa* L. subsp. *tematinensis* (Domin) Domin var. *vertesensis* (Boros) Soó: Inota: Baglyas-h.; Csór: Iszka-h., Kis-Bácsó; Márkó: Peres-nagymező, dolomit-sziklagyepekben. A Balaton-felvidék K-i részén is gyűjtöttük, Litér környén. BOROS (1940) a Bakonyból, a várpalotai Vár-völgyből és az isztiméri Burok-völgyből jelezte, RÉDL (1942) Veszprém és Várpalota mellől további adatokat közöl.
- 1355.00 *Centaurea stenolepis* Kern.: Uzsa: Kisbakonyi-e., Vörös-tó-lap, cseres-tölgyes irtás szélén; Devecser: Széki-e., a Pernyész-rét szélén; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, BAUER 2007).
- 1357.00 *Carthamus lanatus* L.: Tapolca: Tücsöknyerítő-d. K-i lábán; Hajmáskér: Törökcsapás; Öskü: Kápolna-d., Hosszú-v., Tálóki-dűlő; Várpalota: Nyugati-nagymező; Inota: Öreg-Kálvária, Belátó-h.; Csór: Iszka-h.; Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003, BAUER 2004).

- 1362.00 *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Mérat (syn. *Thrinicia nudicaulis* auct., non (L.) Dostál): Döbrönte: Ilkapsztai legelőn kis populáció, a közeli kavicsbánya nedves felszínein viszont tömegesen fordul elő; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, SZODFRIDT – TALLÓS 1966, LÁJER 1998b).
- 1363.00 *Leontodon incanus* (L.) Schrank: Uzsza: Kisbakonyi-e., Kecskvár; Tapolca: Nyulászó-d.; Hegyesd: Hámos-d.; Zalahaláp: Herceg-tag dolomitdombjain; (RÉDL 1942, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, KOVÁCS 2001, BAUER 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2003).
- 1371.00 *Scorzonera purpurea* L.: Csabrendek: Öreg-h.; Uzsza: Kisbakonyi-e., Oszlop-h.; Zalahaláp: Herceg-tag; Sáska: Cser-h., Magyar-h., Homok-v., Kecskvár; Nyirád: Kis-Bakony-h.; Szóc: Farkas-berek; Devecser: Széki-e.; Bakonyszentlászló: Tilos-fenyő; Hajmáskér: Aszó-v., Likaskői-h.; Öskü: Felső-Balla; Várpalota: Nyerges-tető, Vaskapu-v.; Tés: Öreg-Futóné; Isztimér: Burok-v., Hárs-d.; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, 1965, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, KOVÁCS 2000, BAUER 2004).
- 1372.00 *Scorzonera hispanica* L.: Sümeg: Új-h., Hajnal-h., félszáraz gyepekben; a Bakony Ny-i részén ritka; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2002, BAUER 2004, 2007).
- 1374.00 *Scorzonera humilis* L.: Devecser: Púpos-rét, cserjésedő *Molinietum*-ban; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, LÁJER 1998, LÁJER 1999, BAUER 2007).
- 1379.00 *Taraxacum serotinum* (W. et K.) Poir.: Jásd: Varga-h., Nád-h.; Öskü: Bér-h. K-i lábán, Pléhornya-v. felett; Várpalota: Vár-v. alja, Pátyi-d., Barbély-v., Nyugati-nagymező; Nemesvámos: Tekeres-v. (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003, BAUER 2004, 2007).
- 1383.00 *Taraxacum palustre* (Lyons) Simons: Noszlop: Hosszú-rét; Devecser: Széki-e., Púpos-rét, Pernyész-rét, 8-as nyiladék, *Succiso-Molinietum*-okban. (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, KOVÁCS 1962, LÁJER 1998b, BAUER 2004, 2007).
- 1389.00 *Lactuca saligna* L.: Hajmáskér: Törökcsapás; Öskü: Solyi-dűlő; Várpalota: Nyugati-nagymező; Csór: Iszka-h., Gomba-h.; Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; szikár helyeken gyomtársulásokban (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003, 2006, BAUER 2007).
- 1391.00 *Sonchus palustris* L.: Pápa – Tapolcafő: Jári-patak; Nyirád: Remece, Kígyós-p.; Öskü: Alsó-Gyélók; Bakonyszombathely: Feketevízpuszta; (RÉDL 1942, BAUER 2001, 2007).
- 1396.00 *Crepis paludosa* (L.) Moench: Nyirád: Remece, Kígyós-p., üde cserjésben; Farkasgyepű: Bodaspatak v., Köves-p. v., égerligeteken, magaskőrösökben helyenként tömeges; (SZODFRIDT – TALLÓS 1965, LÁJER 1998a, b, BAUER 2004, 2007).
- 1397.00 *Crepis praemorsa* (L.) Tausch.: Zalahaláp – Ódörög: Viszló-v., *Fago-Ornetum*-ban; Veszprém – Gyulafirátót: Bárány-cser; Márkó: Esztergáli-v. és a Peres-Nagy-mező határán, az egykori „Veszprémi út”-tól nem messze, mindkét ponton *Orno-Quercetum*-ban; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, BAUER 2007).
- 1398.00 *Crepis pulchra* L.: Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; Kincsesbánya: Szeg-h.; (PINKE et al. 2003, BAUER 2007).
- 1406.00 *Crepis setosa* Hall.: Némethánya: Hallgató, Szarvas-rét; Hárskút: Klein-tanya; Szentgál: Öreg-Hálás; Lókút: Papod-h.; Veszprém – Gyulafirátót: Bárány-cser; Hajmáskér: Hagyma-tető; Tés: Öreg-Futóné, Kerek-gyep; Öskü: Felső-kertek, Móroc-tető; Várpalota: Kikeri-tó, Nyugati-nagymező; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1408.20 *Hieracium*×*bifurcum* M.B.: Veszprém: Betekints-v.; Inota: Belátó-h., Várpalota: Barbély-v.; sztyepréteken.
- 1413.00 *Hieracium cymosum* L.: Csabrendek: Öreg-h.; Sümeg: Tompor-cser; Tapolca: Hármash.; Sáska: Ember-kő; Bánd: Malom-h.; Veszprém – Gyulafirátót: Tüzes-tető; Hajmáskér: Tó-h.; Öskü: Ballai-Magyar, Hosszú-v.; Várpalota: Vár-v.; Isztimér: Burok-v., Somos-d.; (RÉDL 1942).
- 1415.00 *Hieracium echiooides* Lum.: Fenyőfő: Mennydörgő-hegyi-legelő; Bakonyszentlászló: Tilos-fenyő; Sáska: Magyar-h., Kecskvár; Zalahaláp: Herceg-tag; Nyirád: Cseket-h.; Hajmáskér: Látó-h., Aszó-v.; Várpalota: Bántapuszta; Inota: Belátó-h., Baglyas-h.; Bodajk: Rigós, Kajmáti-h. kőfejtője; (RÉDL 1942, BAUER 2006).
- 1418.40 *Hieracium wiesbaurianum* Uechtr. ex Baenitz: Várpalota: Fajdas-h., a Pléhornya-v. feletti sziklákon, Vaskapu-v. D-i részén; Inota: Baglyas-h., a Nagy-Aszó-v. felett, a szirti teryés sziklán; Bodajk: Gaja-sz. dolomitszikláin; Isztimér: Burok-v., É-i kitettségi dolomit sziklafalain. Kicsi, sérülékeny populációk. A faj reliktum jellegű, védelemre érdemes. Korábbi gyűjtései (BP) a Bakonyból: Polgár S. 1929: Várpalota: Vár-v.; Jávorka S. 1930: Inota: Baglyash.; Boros Á. 1938: Bodajk: Gaja-szurdok; Ugyancsak régen ismert, s ma is megvan a Balaton-felvidék bazalt tanúhegyein és néhány nagyobb dolomitszikláján is, innen származó újabb adatainkat később összegezzük (BORBÁS 1900, PILLITZ 1910, BAUER et al. 2008).

- 1421.00 *Hieracium maculatum* Schrank: Sümeg: Hárs-h.; Uzsa: Kisbakonyi-e., Oszlop-h.; Sáska: Ember-kő; Devecser: Széki-e.; Öcs: Urasági-e.; Nagyvázsony: Kab-h., Sátán-árok; Csesznek: Kő-árok; Eplény: Mészán-tető; Veszprém-Gyulafirátót: Tüzes-tető, Kis-Berecki-e., Hosszú-h.; Hajmáskér: Aszó-v.; Várpalota: Kis-Burok-v.; Isztimér: Burok-e.; száraz és sziklás tölgyesekben (RÉDL 1942, FEKETE 1966).
- 1422.00 *Hieracium bifidum* Kit.: Isztimér: Burok-v., Somos-d. sziklái; Tés: Móroc-tető, a Csákány-v. felett; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1440.00 *Lychnis coronaria* (L.) Desr. ex Lam.: Sümeg: Barcza-tag, Uzsa: Kis-Bakonyi-e., Vörös-tó-lap; Nyirád: Deáki-e.; Kolontár: Kolontári-e.; Taliándörögd: Agár-tető, Bokor-kaszáló; (RÉDL 1942, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2003, BAUER 2004).
- 1442.00 *Silene noctiflora* L.: Németbánya: Pásztorkúti-e.; Bakonybél: Szömörke-v., Fehér-kő-árok, Szentgáli-dűlő, erdőszéleken, útszéleken; Hárskút: Klein-tanya felett; Öcs: Öcs-h.-alja, szántón, parlagon; (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003, 2005).
- 1445.00 *Silene dioica* (L.) Clairv.: Devecser: Székpusztá, Csigere-p. mentén; Farkasgyepü: Köves-patak v.; Csehbánya: Torna-patak v.; Bakonybél: Kopasz-h.; Pénzesgyőr: Gulyaberki-tábla; Szentgál: Tisztavíz-v., Gella-v.; Hárskút: Nagy-Nyerges, Középső-Hajag; Bakonyszombathely: Feketevízpusztá, a Concót kísérő üde erdőben; (RÉDL 1942, FEKETE 1963).
- 1448.00 *Silene viridiflora* L.: Zalahaláp – Ódörögd: Viszlói-e.; Sáska: Cser-h.; Kolontár: Kolontári-e.; Noszlop: Becsei-e.; Magyarpolány: Károlykúti-e.; Nagyvázsony: Kab-h., Kis-rét; Öcs: Urasági-e.; Hárskút: Borzás-h.; Veszprém-Gyulafirátót: Kis-Berecki-e., Hosszú-h.; Hajmáskér: Határ-e.; Öskü: Móroc-tető és a Bér-h. lábán; Bakonyána: Zsidó-h., Gaja-szurdok; Bodajk: Borjúkúti-e.; cseres-tölgyesekben, erdei utak mentén (RÉDL 1942 mindössze két adatát adja („Esztergályv.”, „Somh.”); TALLÓS 1959b, BAUER 2007).
- 1461.00 *Gypsophila fastigiata* L. subsp. *arenaria* (W. et K.) Domin: Hegyesd: Hámos-domb kevésbé legeltetett részén, feketefenyves szélén és a feketefenyő állomány alatt. A közeli Babuka-h.-ről KOVÁCS – TAKÁCS (1995), a Kis-Bakony-h.-ről FARKAS (1999) közli, egyébként csak a Bakonyalján, a Fenyőfő környéki homokterületen jellemző (RÉDL 1942, BAUER 2006, BP).
- 1462.00 *Gypsophila paniculata* L.: Zalahaláp: Herceg-tag, homoki parlagon; (RÉDL 1942).
- 1470.00 *Dianthus superbus* L.: Nemesbánya: Sárkány-rét; Nyirád: Remece, Falu-rét, Bodó-rét; Kolontár: Kolontári-e.; Noszlop: Molnár-rét, Hosszú-rét; Devecser: Pernyész-rét; Gic: Malom-r.; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, TALLÓS 1959a, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, BAUER 2001).
- 1471.00 *Dianthus deltooides* L.: Uzsa: Kisbakonyi-e., Kőkenyes-árok; Nemesbánya: Sárkány-rét; Kolontár: Kolontári-e.; Devecser: Széki-e., Rák-sík.; Noszlop: Becsei-e.; Magyarpolány: Károlykúti-e.; Németbánya: Savanyú-rét; Szentgál: Vinyéte-árok, Tobány, Tekerület; Porva: Kopasz-h.; Zalahaláp: Viszló-v.; Tés: Oszkó; gyepekben, nyiladékokon (RÉDL 1942, BAUER 2001, 2004, 2007, MÉSZÁROS – SIMON 2002, 2003).
- 1485.00 *Cerastium sylvaticum* W. et K.: Csehbánya: Töredék-árok, Vámos-patak forrása körül; Bakonybél: Kő-kút-árok; (RÉDL 1942, BÖLÖNI et al. 1997, BAUER 2007).
- 1492.00 *Cerastium arvense* L.: Káptalanfa: Sárosfői-e.; Nyirád: Csoportos, Remece, legelőkön, erdőszéli gyepekben; Szentgál: Vinyéte-árok, Tobány; Hárskút: Borzás-h., cserjésedő hegyi réten; (RÉDL 1942).
- 1494.00 *Moenchia mantica* (L.) Bartl.: Ugod: Szár-h.; Németbánya: Bittva-v., Savanyú-rét, Szentgál: Dobkerek-h., Hosszú-berek; legelőkön, kaszálóréteken; Nyirád: Mester-tag; SZODFRIDT – TALLÓS 1962, MÉSZÁROS – SIMON 2001, KOVÁCS 2001, BAUER 2006, 2007).
- 1510.00 *Moehringia muscosa* L.: Bakonyszentlászló: Iszka, mészkösziklákön és a vasutas emlékmű kő talapzatán; Bakonybél: Gella-v., Macskakő-hát; Bakonybél: Szent-kút (Borostyán-kút) lépcsőjén; Hárskút: Fehér-kő-á.; Csehbánya: Csalános, Torna-p. v.; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-á.; Várpalota: Kis-Burok-v., Vaskapu-v.; Pléhornya-v.; Tés: Öreg-Futóné; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, FEKETE – J-KOMLÓDI 1962, BÖLÖNI et al. 1997, MÉSZÁROS 1999, KOVÁCS 1999, BAUER – MÉSZÁROS 2000, BAUER 2004, 2007).
- 1511.00 *Spergula arvensis* L.: Uzsa: Kis-Bakonyi-erdő szélén tűzpásztában tömeges; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1966, PINKE et al. 2003, BAUER 2007).
- 1515.00 *Spergularia rubra* J. et C. Presl.: Hárskút: Alsó-Hajag, Gombápusztai-dűlő; Szentgál: Öreg-hálás; Szentgál: Tekerület; Pénzesgyőr: Hamuházi-tábla; (POLGÁR 1941, PINKE et al. 2003, 2006, BAUER 2007)
- 1522.00 *Herniaria glabra* L.: Németbánya: Bittva-v., Savanyú-rét, murvás földűn, pár négyzetméteren tömeges; (RÉDL 1942).
- 1523.00 *Herniaria hirsuta* L.: Devecser: Széki-e., Rák-sík szélén, bolygatott gyepekben (RÉDL 1942, PINKE et al. 2003, 2006, BAUER 2004).

- 1565.00 *Salsola kali* L.: Zalahaláp: Herceg-tag, homoki parlagon; Tapolca: Tücsöknyerítő-d., tűzpászta; Inota: Öreg-Kálvária, Belátó-h.; Isztimér: Lusztó-dűlő; (PINKE et al. 2003, BAUER 2004).
- 1572.00 *Amaranthus albus* L.: Öskü: Középső-Tálok, bolygatott parlagon; (RÉDL 1942, PINKE et al. 2006).
- 1582.00 *Androsace maxima* L.: Inota: Baglyas-szőlőhegy, meredek útrézsűn; (RÉDL 1942).
- 1583.00 *Androsace elongata* L.: Sáska: Szijjas száraz legelőn; Taliándörögd: Répa-szer, löszös mélyút feletti gyepben; (RÉDL 1942).
- 1697.00 *Potamogeton berchtoldii* Fieber: Veszprém-Gyulafirátót: Hosszú-h. mesterséges mélyedéseiben, a Határ-e. közelében; Öskü: Középső-Tálok, a Kikeri-tó D-i végében a Péti-vízbe vezető Tálóki-kifolyó állóvíz jellegű medrében; (Herb. BP: Boros Á. 1926: Pétfürdő; Boros Á. 1927: Kikerítő; Tapolca; Boros Á. 1932, 1949: Inota; Polgár S. 1936: Inota; Jávoroka S. 1936: Inota; Boros Á. 1950: Lesenceistvánd; Jávoroka S. et al. 1953: Inota).
- 1714.00 *Hemerocallis lilio-asphodelus* L. Em. Soó: Nemeshany: Sárkány-rét; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959a, b, KOVÁCS 1999, 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, BAUER 2004).
- 1717.00 *Gagea minima* (L.) Ker.-Gawl.: Tés: Hegyes-Berek; Olaszfalu: Nagy-Magyalló, Som-h., Csengő-h., törmelékletjtő-erdők, sziklás tölgyesek; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1727.00 *Allium suaveolens* Jacq.: Uzsza: Lesence-v. gyomosodó láprétjén, a vasúti megállótól Ny-ra; Noszlop: Hosszú-rét; (RÉDL 1942, TALLÓS 1954, 1959a, b, SZALAI 1957, LÁJER 1998b, BAUER 2001, 2004, 2007, BAUER et al. 2001).
- 1728.00 *Allium moschatum* L.: Öskü: Kápolna-d., Solyi-dűlő; Várpalota: Nyugati-nagymező; Iszkaszentgyörgy: Kő-h.; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2004, 2007).
- 1729.00 *Allium carinatum* L.: Nyirád: Remecse; Uzsza: Kavics-d., Kisbakonyi-e.; Devecser: Nádas-rét, Rák-sík, Székpusztai-rét; Noszlop: Becsei-e.; Taliándörögd: Répa-szer; láprétek, erdőszélek; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, MOLNÁR et al. 1995, LÁJER 1998a, BAUER 2001, 2007, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002).
- 1747.00 *Ornithogalum sphaerocarpon* Kern.: Devecser: Széki-e., Mogyorós-kút, Púpos-rét szélén; Noszlop: Becsei-e.; Magyarpolány: Károlykúti-e.; Márkó: Slézinger-v.; Hajmáskér: Aszó-v., tölgyesben a völgytalpon néhány tő; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1748.00 *Ornithogalum comosum* L.: Öskü: Felső-Balla, Hosszú-v., Lapos-h., Kápolna-d., Magyalinai-h.; Várpalota: Nyugati-nagymező, Nyerges-tető; Inota: Hideg-v.; Csór: Iszka-h., Kis-Bácsó; (BAUER 2007).
- 175.00 *Potentilla rupestris* L.: Devecser: Széki-e., a Púpos-rét K-i erdőszegélyében és a 68NY1 nyiladékon a 63E és a 68H erdőrészek között; (RÉDL 1942, LÁJER 1998a, Szalai ap. GALAMBOS 2001, BAUER 2007).
- 1753.00 *Muscari tenuiflorum* Tausch.: Sümeg: Úrbéri-e., Haraszt; Csabrendek: Öreg-h.; Zalahaláp: Újdörögdpuszta; Nyirád: Cseket-h.; Márkó: Esztergáli-v. alja, a Peres-Nagy-mező határán; Veszprém: Tüzes-tető; Tés: Bér-h.; sztyepréteken, melegkevelő erdők szélén (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1757.00 *Ruscus hypoglossum* L.: Bakonyszücs, Répás-tető É-i letörésén a Bognár árok felet; Katonavágás É-i gerincén; Első bizonyított adata a Bakonyból: Mágocsy-Dietz (1904, BP): „Lapos-hegy, Szücs határa; Újabb adatok: FEKETE et al. (1961), aktuális adatait LELKES (1999) tekinti át.
- 1767.00 *Leucojum vernum* L.: Farkagyepű: Köves-patak völgy, kiszélesedő völgytalpán, magaskórásban, a Vadászháztól D-re; Noszlop: Hajagos-v., égeresben (RÉDL 1942, BOROS 1954, TALLÓS 1959a, FEKETE et al. 1961, BAUER 2004).
- 1771.00 *Tamus communis* L.: Ajka: Peres-e.; Csehbánya: Csalános-tető; Lókút: Borzás-h.; Öskü: Felső-Balla ÉNy-i letörésén, az Öreg-Futóné lábán; Tés: Kis-Futóné, D-i gerincén; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959a, b, FEKETE et al. 1961, FEKETE 1966, FEKETE – J-KOMLÓDI 1962, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, LENCSES 1996, BÖLÖNI et al. 1997, BÖLÖNI – KIRÁLY 1997, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2004, KEVEY – BORHIDI 2001, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2003).
- 1778.00 *Iris pumila* L.: Sümeg: Mogyorós-d.; Márkó: Kerek-hegyi-dűlő; Olaszfalu – Alsópere: Kis-Magyalló, Aszó-v. felett; Hajmáskér: Törökcapás; Öskü: Felső-Balla, Felső-Bánta; Várpalota: Cseri-d.; Inota: Öreg-Kálvária; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, LENCSES 1996, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2004, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1779.00 *Iris humilis* Georgi subsp. *arenaria* (W. et K.) Fisch.: Öskü: Felső-Balla, a lőtér sziklafüves-lejtősztyeprétjén; „Felső” Gombás-v.; Csór: Szenes-Horog; (RÉDL 1942, LENCSES 1996, BAUER 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1785.00 *Iris sibirica* L.: Kolontár: Kolontári-e.; Nemeshany: Sárkány-rét; Noszlop: Árvai-lap, Molnár-rét; Hosszú-rét; Devecser: Székpusztá, Cigány-kút láprét; Bakonygyepes: Mák-hely; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, TALLÓS 1959a, b, MÉSZÁROS 1997, LÁJER 1998b, KOVÁCS 1999, BAUER 2001, 2004, BAUER et al. 2001, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2002).

- 1792.00 *Juncus tenuis* Willd.: Devecser: Széki-e.; Sümeg: Hajnal-h.; Uzsa: Kisbakonyi-e.; Hárskút: Alsó-Hajag, Nagy-Nyerges; (MÉSZÁROS–SIMON 2003, BAUER 2007).
- 1796.00 *Sternbergia colchiciflora* W. et K.: Várpalota: Cseri-d., Cseri-e. ligetes tölgyesei; (Id. BAUER 2007).
- 1813.00 *Epipactis palustris* (L.) Crantz.: Kolontár: Kolontári-e., Nyirád: Remece; kékperjés lápréteken (RÉDL 1942, TALLÓS 1959a, b, MOLNÁR et al. 2000, MÉSZÁROS–SIMON 2003, BAUER 2007).
- 1814.00 *Epipactis atrorubens* Hoffm. ex Bess.: Bakonybél: Száraz-Gerence-v., gyertyános-tölgyes; Márkó: Slézinger-v.; Veszprém – Gyulafrátót: Répás-árok, *Fago-Ornetum*-ban; (RÉDL 1942, BAUER 2007).
- 1815.00 *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw.: Uzsa: Kisbakonyi-e., Avas; Devecser: Széki-e., a Mogyorós-kút, Púpos-rét körül; Isztimér: Burok-v.; (RÉDL 1942, SZALAI 1957, TALLÓS 1959b, BÖLÖNI et al. 1997, MÉSZÁROS–SIMON 2001, 2003, BAUER 2004, 2007).
- Epipactis nordeniorum* K. Robatsch: Devecser, Széki-e., a Púpos-réttől DK-re (Devecser 68D) a TALLÓS (1959b) által érdekesnek talált, „*Cariceto remotae-Fraxinetum*” néven jellemzett keményfa-ligeterdőben él kis populációja; (MOLNÁR et al. 1997, MÉSZÁROS–SIMON 2003).
- 1818.00 *Limodorum abortivum* (L.) Sw.: Öskü: Felső-Bánta, Pléhornya-v. alsó szakasza körüli dombokon, a Bér-h. K-i lábán. Inota: Hideg-v., *Cotino-Q.*; Várpalota: Juli-sírja; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, KOVÁCS – TAKÁCS 1995, MOLNÁR – SULYOK 1996, LÁJER 1998a, BAUER 2001, 2007).
- 1819.00 *Listera ovata* (L.) R.Br.: Kolontár: Kolontári-e.; Devecser: Széki-e., Púpos-rét, Mogyorós-kút, Tölös-rét, Rák-sík, Nádas-rét, Pernyész-rét környéke; Farkasgyepü: Bodas-patak v., Köves-patak v.; Nyirád: Mester-tag; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, 1964).
- 1821.00 *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.: Sáska: Csiplek-h. közelében, a Csiplek-oldal (Benárd-h.) É-i, borókásodó gerincén; (SZALAI 1957, TALLÓS 1959a, MÉSZÁROS – SIMON 2002, 2003, BAUER 2007).
- 1829.01 *Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.: Noszlop: Hosszú-rét, *Succiso-Molinietum*-ban (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, BAUER 2007).
- 1832.00 *Ophrys sphegodes* Mill.: Sáska: Cser-h., Magyal-h., Kecskvár, sziklafüves lejtősztyepekben.
- 1836.00 *Orchis morio* L.: Devecser: Székpusztai-r.; Sáska: Kecskvár; Öskü: Felső-Balla, Hosszú-v.; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, 2003).
- 1837.00 *Orchis coriophora* L.: Nyirád: Mester-tag láprétjén, a Popper-tanya felé; (RÉDL 1942).
- 1838.00 *Orchis ustulata* L.: Öskü: Felső-Balla É-i részén, félszáraz gyeppen, ~50 tő (RÉDL 1942, LÁJER 1998a, KOVÁCS 2000, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1841.00 *Orchis militaris* L.: Noszlop: Irtási-dűlő, Hosszú-rét; Devecser: Székpusztai-rét; Uzsa: Kisbakonyi-e., Kecskvár; (RÉDL 1942, BÖLÖNI et al. 1997, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001).
- 1852.00 *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.: Devecser: Székpusztai-rét, *Bromus erectus* gyeppen, de néhány tő a gyeppel érintkező *Molinietum*-ban (!); Csabrendek: Szőlő-h. (~Öreg-h.); Olaszfalu – Alsópere: Kis-Magyalló; Várpalota: Cseri-d.; Isztimér: Mellár; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2001, 2004, 2007, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1878.00 *Eriophorum latifolium* Hoppe: Nemesahany: Sárkány-rét; Noszlop: Hosszú-rét; Devecser: Nádas-rét, Szarka-rét; Bakonygyepes: Mák-hely; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, MÉSZÁROS 1997, LÁJER 1998b, BAUER 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1879.00 *Eriophorum angustifolium* Honckeney: Noszlop: Hosszú-rét; Nemesahany: Sárkány-rét; (RÉDL 1942, TALLÓS 1959b, LÁJER 1998b).
- 1889.00 *Cladium mariscus* (L.) Pohl.: Várpalota: Kikeri-tó, jelenleg kisebb foltokon állományalkotó. (KOVÁCS 1962, LÁJER 1998a).
- 1891.00 *Carex davalliana* Sm.: Nemesahany: Sárkány-rét; Noszlop: Hosszú-rét; Devecser: Nádas-rét; (TALLÓS 1956, 1959b, KOVÁCS 1962, SZODFRIDT – TALLÓS 1962, 1965, BAUER et al. 2001, LÁJER 1998a, b, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1908.00 *Carex ovalis* Gooden.: Kolontár: Kolontári-e.; Káptalanfa: Sárosfői-e., nyiladékokon; Öcs: Nagy-tó szélén; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1964, 1965, MÉSZÁROS – SIMON 2001).
- 1919.00 *Carex pendula* Huds.: Taliándörögd: Ilonaházi-kút; Farkasgyepü: Tustán-árok, Köves-patak v.; Csehbánya: Szalmahid-árok; Csesznek: Mogyorós-kút, Rekettyés-á.; Olaszfalu: Mészán-tető É-i lábán forrásos horhosban; Balinka – Kisgyónbánya, Kígyós-v., Bükk-h., Hosszú-Kígyós; (RÉDL 1942, BAUER 2001, 2004, KOVÁCS 2001, MÉSZÁROS – SIMON 2001, 2002, 2003).
- 1920.00 *Carex pallescens* L.: Noszlop: Hosszú-rét, Becsei-e.; Kolontár: Kolontári-e.; Ajka: Peres, Köves-á. felett; Márkó: Rókalyuk-árok; Tés: Kis-Futóné; (RÉDL 1942, SZODFRIDT – TALLÓS 1964, LÁJER 1997, MÉSZÁROS – SIMON 2001, BAUER 2004, 2007).

- 1925.00 *Carex fritschii* Waishb.: Devecser: Széki-e., a 11-es nyiladék mentén, cseres-tölgyes szélén, a Mogyoróskúti-erdészlak közelében; Nyirád: Remecse, a Kolontári-e. szélén, cserjésben; (JÁVORKA 1940, SZODFRIDT – TALLÓS 1965, SZODFRIDT – TALLÓS 1966).
- 1926.00 *Carex supina* Wahlbg.: Uzsa: Kecskvár; Zalahaláp – Ódörög: Csilla-h., sziklafüves-lejtősztyepben; Fenyőfő: Nagy-Aszói-dűlő; Bakonyszücs: Legelő-dűlő; homoki gyepekben, kisebb foltokon tömegesen; (RÉDL 1942). A flóramű megjelenését követően a Sümeg és Tapolca közötti dombvidéken többen is gyűjtötték (Baksay L., Boros Á., Jávorka S. /BP/).
- 1930.00 *Carex halleriana* Assó: Várpalota: Vaskapu-v.; Öskü: Vízmű-d., Hosszú-v., Gombás-v. (RÉDL 1942).
- 1944.00 *Carex serotina* Mérat: Várpalota: Kikerítő mellett, kisebb mesterséges mélyedésben, *Plantago maritima*, *Euphorbia exigua*, *Centaurium pulchellum*, *Lythrum hyssopifolia*, *Potentilla supina* kísérőfajokkal; (KOVÁCS 1962, LÁJER 1998b: Bakonyalja).
- 2029.00 *Sesleria uliginosa* Opiz.: Tés: Márkus-szekerénye, Kis-Futóné; Öskü: „Felső” Gombás-v.; Várpalota: Nyugati-nagymező; félszáraz gyepek, erdőszélek (vö. BAUER et al. 2007).
- 2035.00 *Agropyron pectiniforme* R. et Sch.: Várpalota: Cseri-d., Badacsony-alja; Inota: Öreg-Kálvária; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS 1997, BAUER 2004, 2007).
- 2053.00 *Avenella flexuosa* (L.) Parl.: Bakonyoszlop: Felső-Kőhegy, Rekettyés-árok, meredek oldalon, erodált talajú bükkösben kis foltokon. A Bakonyban ritka, legközelebbi adata: JÁVORKA (1926), Kítaibel herbáriumából: „Esztergár in Cttu Veszprim”; PILLITZ (1908-10): Farkasgyepű mellől közli. Jávorka S. Uzsapuszta közelében gyűjtötte (BP, 1949). A Balaton-felvidék vörös homokkő hegyein, a Kisörsi-hegyen (Csöngé-h.), és az ábrahámhegyi Bagó-kövön, mészkérülő tölgyesben néhány foltban ma is tömeges.
- 2080.00 *Calamagrostis varia* (Schrud.) Host.: Zalahaláp – Ódörög: Viszló-v.; Uzsa: Kisbakonyi-e., Kecskvár, Oszlop-h.; Veszprém – Gyulafirátót: Répás-árok; (RÉDL 1942, FEKETE et al. 1961, BÖLÖNI – KIRÁLY 1997, BAUER 2007).
- 2094.00 *Stipa tirsá* Stev.: Zalahaláp: Herceg-tag és a Cseket-h. között; Öskü: Felső-Bánta; Várpalota: Nyugati-nagymező; Inota: Baglyas-h. platóján; (RÉDL 1942, ALMÁDI 1996, 2005, BAUER 2007).
- 2102.00 *Milium effusum* L.: Magyarpolány: Károlykúti-e.; Farkasgyepű: Farkashegyi-e., Köves-patak v.; Csehbánya: Szalmahíd-á; Tés: Tábla-v.; (RÉDL 1942, MÉSZÁROS – SIMON 2003, BAUER 2004, 2007).
- 2108.00 *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.: Uzsa: Kis-Bakonyi-e. szélén, tűzpáztában; (BAUER 2007: Sümeg).

Köszönetnyilvánítás

Köszönetem fejezem ki a határozásokban nyújtott segítségükért és a megerősítésekért Zbigniew Szlag (*Hieracium*), Pavol Mártonfi (*Hypericum dubium*) kollégáknak. Köszönöm Felföldy Lajosnak és Somlyay Lajosnak, hogy kéziratos határozókulcsaik használatát lehetővé tették.

Summary

Floristical data from the Bakony and the Bakonyalja IV.

N. BAUER

Data collected during floristical research of the Bakony Mts. and the Bakonyalja are published. Species new to the region were revealed (*Senecio paludosus*, *Inula* × *hybrida*, *Euphorbia taurinensis*, *Malcolmia africana*, *Trigonella procumbens* and *Plantago altissima*). *Polystichum setiferum* is new to the Southern-Bakony. Presence of several further taxa, reported more than half a century ago from Bakony Mts., was confirmed (e.g. *Hieracium wiesbaurianum*, *Marrubium* × *paniculatum*, *Euphorbia* × *angustifrons*, *Potamogeton berchtoldii*, *Valerianella coronata* and *Androsace maxima*). Regional distribution of phytogeographically important species (e. g. *Artemisia austriaca*, *Convolvulus cantabrica*, *Galium austriacum*, *Hornungia petraea*, *Ononis pusilla* and *Serratula lycopifolia*) was clarified by new records. Regional distribution schemes for other taxa (e.g. *Galium pumilum*, *Gypsophila fastigiata* subsp. *arenaria*, *Medicago monspeliaca*, *Ornithogalum sphaerocarpum*, *Seseli pallasii*, *Trinia ramosissima*, *Helleborus dumetorum* and *Iris humilis* subsp. *arenaria*) are likely to be improved by further examination. *Herniaria glabra*, *Artemisia scoparia* and *Senecio sylvaticus* are mentioned as threatened, rare weedy species. Most data are documented by specimens deposited at herbarium (BP).

Irodalom

- ALMÁDI L. (1996): Új *Stipa dasyphylla*-termőhely a Balaton-felvidéken. – Lippay János Tud. Ülés. Összefoglalói, Budapest, pp.: 2–3.
- ALMÁDI L. (2005): A *Stipa tirsá* Stev. Új előfordulása Tapolca mellett. – *Flora Pannonica* 3: 176.

- BAUER N. – MÉSZÁROS A (2000): A *Viola collina* Bess. új előfordulásai és cönológiai viszonyai a Bakonyban – *Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis* **16**: 75–92.
- BAUER N. (2001): Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról – *Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis* **17**: 21–37.
- BAUER N. (2004): Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról II. – *Kitaibelia* **9**(1): 187–206.
- BAUER N. (2006): Open sandy grasslands of the Bakony region. – *Studia Botanica Hungarica* **37**: 5–33.
- BAUER N. (2007): Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról III. – *Kitaibelia* **12**(1): 41–51.
- BAUER N. – BALOGH L. – KENYERES Z. (2001): A Tapolcafői- és az Attyai-láprét vegetációja és természetvédelmi problémái (Pápai-Bakonyalja). – *Bot. Közlem.* **88**(1-2): 71–94.
- BAUER N. – BÖLÖNI J. (2007): A *Pisum elatius* Stev. és más új növényfajok a Bakony hegységéből. – *Kitaibelia* **12**(1): 26–29.
- BAUER N. – LÖKÖS L. – PAPP B. (2008): Distribution and habitats of *Cardaminopsis petraea* (L.) Hiitonen in Hungary. – *Studia Botanica Hung.* **39**: 113–138.
- BAUER N. – MÉSZÁROS A. – SOMLYAY L. (2007): A *Sesleria uliginosa* Opiz. hazai xerotherm előfordulásairól. – *Kitaibelia* **12** (1): 56–65.
- BORBÁS V. (1900): A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete. – A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I., Budapest, 432 p.
- BOROS Á. (1937): Fejér-vármegye növénytakarója. – Különlenyomat a Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája XXII. Kötetéből, Budapest, pp: 3–14.
- BOROS Á. (1940): *Centaurea vertesensis* nov. spec. – *Bot. Közlem.* **37**: 40–44.
- BOROS Á. (1954): Florisztikai közlemények IV. – *Bot. Közlem.* **45**: 247–250.
- BÖLÖNI J. – KIRÁLY G. – SZMORAD F. – TIMÁR G. (1997): Új adatok az Északi-Bakony flórájának ismeretéhez – *Kitaibelia* **2**(1): 13–19.
- BÖLÖNI J. – KIRÁLY G. (1997): A Bakony florisztikai feltárásának részeredményei – *Kitaibelia* **2**: 210–212.
- FACCSAR G. (1980): A Bakony és a Balaton-felvidék rózsa-flórájának fontosabb jellemzői. – A 8. Bakonykutató Ankét előadásai, Zirc, pp.: 37–44.
- FARKAS S. (szerk. 1999): Magyarország védett növényei. – Mezőgazda Kiadó, Budapest, 415 pp.
- FEKETE G. – JÁRAI-KOMLÓDI M. (1962): Die Schuttabhängwälder der Gerecse- und Bakony-Gebirge. – *Ann. Univ. Sci. Bp. Rol. Eötv. Nom.* **5**: 115–129.
- FEKETE G. – MAJER A. – TALLÓS P. – VIDA G. – ZÓLYOMI B. (1961): Angaben und Bemerkungen zur Flora und zur Pflanzengeographie des Bakonygebirges. *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.* **53**: 241–253.
- FEKETE G. (1963): Die Schluchtwälder des Bakony-Gebirges. Die Phytozönosen des Bakony-Gebirges II. – *Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung.* **55**: 215–231.
- FEKETE G. (1966): Der xerotherme Flaumeichen-Buschwald des nördlichen Bakony-Gebirges. – *Ann. Hist.-Nat. Mus. Nat. Hung.* **58**: 2007–221.
- FELFÖLDY, L. (2007): *Hieracium* L. – Hölgymál. (határozókulcs), MTM, Budapest, kézirat.
- FISCHER, M. – ADLER, W. – OSWALD K. (2005): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. – Biologiezentrum der OÖ, Linz, 1392 pp.
- GALAMBOS I. (1998) Adatok a Bakony hegység flórájához I. – *Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis (Zirc)* **13**: 55–61.
- GALAMBOS I. (2001) Adatok a Bakony hegység flórájához II. – *Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis (Zirc)* **17**: 7–20.
- GOMBOCZ, E. (1945): *Diaria itinerum Kitaibelii*. Auf Grund originaler Tagebücher zusammengestellt I–II. – Természettudományi Múzeum, Budapest, 1082 pp.
- GOTTSCHLICH G. (1996): *Hieracium* L. 1753. In: SEBALD, O. – SEYBOLD, S. – PHILIPPI, G. – WÖRZ, A. (eds.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württenbergs. Band. 6. Valerianaceae bis Asteraceae. – Ulmer, Stuttgart, pp.: 393–535.
- HORVÁTH F. – DOBOLYI Z. K. – MORSCHHAUSER T. – LÖKÖS L. – KARAS L. – SZERDAHELYI T. (1995): FLÓRA adatbázis 1.2. Taxonlista és attribútum-állomány. – Vácrátót.
- JÁVORKA S. (1925): Magyar Flóra (Flora Hungarica) 1–2. – Studium, Budapest, 1307 pp.
- JÁVORKA S. (1926): Kitaibel herbariuma. Herbarium Kitaibelianum. I. – *Annales Musei Nationalis Hungarici* **24**: 428–585.
- JÁVORKA S. (1940): A *Carex Fritschii* Waisb.-ről – *Acta Geobot. Hung.* **3**(1): 148–150.
- KÁRPÁTI Z. (1960): Die Sorbus-Arten Ungarns und angrenzenden Gebiete. – *Feddes Rep.* **62** (2–3): 71–334.
- KEVEY B. (2001): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. – *Bot. Közlem.* **88**(1-2): 95–105.
- KEVEY B. – BORHIDI A. (2001): Egy új erdőtársulás a bakonyban (*Veratro nigri-Fraxinetum orn* n.ass.). – *Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis (Zirc)* **17**: 37–54.
- KIRÁLY G. – KIRÁLY A. (2004): Az *Agrimonia procera* Wallr. előfordulása Magyarországon. – *Flora Pannonica* **2**(2): 7–24.
- KIRÁLY G. – KIRÁLY A. (2006): Adatok és kiegészítések a magyar flóra ismeretéhez II. – *Kitaibelia* **10**(1): 88–103.
- KOVÁCS M. (1962): Die Moorwiesen Ungarns. – Akadémiai Kiadó, Bp. 214 p.
- KOVÁCS J. A. (1999): Adatok a Déli-Bakony flórájának ismeretéhez 1. – *Kanitzia* **7**: 75–89.

- KOVÁCS J. A. (2001): Adatok a Déli-Bakony flórájának ismeretéhez 2. – *Kanitzia* **9**: 181–210.
- KOVÁCS J. A. – TAKÁCS B. (1995): A Sümegetapolcai-hát és a Déli-Bakony néhány dolomitos felszínének botanikai értékei. – *Kanitzia* **3**: 97–124.
- KOVÁCS J. A. (2000): A Tekeress-völgy /Déli-Bakony/ növényzete. – *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis* **16**: 59–74.
- LÁJER K. (1998a): Az *Aldrovanda vesiculosa* L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez. – *Kitaibelia* **3**(2): 263–274.
- LÁJER K. (1998b): Bevezetés a magyarországi lápok vegetáció-ökológiájába. – *Tilia* **6**: 84–238.
- LÁJER K. (1999): Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácraót környékéről. – *Kitaibelia* **4**(2): 311–317.
- LELKES A. (1999): Lónyelvű csodabogyó – *Ruscus hypoglossum* L. In: BARTHA D. – BÖLÖNI J. – KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. – *Tilia* **7**: 281–285.
- LENCSEŠ G. (1996): A várpalotai Baglyas-hegy természeti értékei és növényvilága – Bio-Gero Ökocsoport, Várpalota – Nagykanizsa.
- MAJER A. (1955): A Magasbakony termőhelyfeltárásának eredményeiből. – *Erd. Kut.* 1955. pp.: 55–74.
- MÁRTONFI, P. – MICHÁLEK, J. – HADINEC, J. – MÁRTONFIOVÁ, L. – REPCÁK M. (1999): *Hypericum dubium* – a new species of the Czech flora. – *Preslia* **71**: 337–348.
- MÉSZÁROS A. (1997): Adatok Várpalota környékének flórájához. – *Kitaibelia* **2**(1): 51–55.
- MÉSZÁROS A. – SIMON P. (2001, 2002, 2003): Adatok a Déli-Bakony flórájának ismeretéhez I. II. III. – *Kitaibelia* **6**(1): 113–120., **7** (2): 183–186., **8** (1): 113–116.
- MOLNÁR V. A. – MOLNÁR A. – VIDÉKI R. – PFEIFFER N. – GULYÁS G. (2000): Néhány adat Magyarország flórájának ismeretéhez. – *Kitaibelia* **5**(2): 297–303.
- MOLNÁR V. A. – SÜLYOK J. (1996): Néhány adat Magyarország flórájának ismeretéhez. – *Kitaibelia* **1**: 56–59.
- MOLNÁR V. A. – SÜLYOK J. – VIDÉKI R. (1995): A *Gladiolus palustris* Gaud előfordulása a Bakonyalján és a Tapolcai-medencében. – *Kanitzia* **3**: 125–136.
- MOLNÁR V. A. – VIDÉKI R. – SÜLYOK J. (1997): Adatok hazai *Epipactis*-fajok ismeretéhez I. – *Kitaibelia* **2**(2): 204–209.
- MOLNÁR V. A. (2003): Az *Epipactis* Zinn. nemzetség fajai Magyarországon. – *Flora Pannonica* **1**(1): 44–57.
- PILLITZ B. (1908, 1910): Veszprém vármegye növényzete. – Veszprémvármegyei Múzeum Kiadványai, Veszprém, 167 pp.
- PINKE GY. – PÁL R. – MESTERHÁZY A. – KIRÁLY G. – SZENDRÓDI V. – SCHMIDT D. – UGHY P. – SCHMIDTMAJER Á. (2006): Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez II. – *Kitaibelia* **10**(1): 161–184.
- PINKE GY. – SCHMIDT D. – SCHMIDTMAJER Á. – KIRÁLY G. – UGHY P. (2003): Adatok a Dunántúli-középhegység és a Nyugat-Magyarországi peremvidék gyomflórájának ismeretéhez I. – *Kitaibelia* **8**(1): 154–185.
- POLGÁR S. (1933): A bakonyi Tobánhegy vegetációja. – *Bot. Közlem.* **30** (1-4): 32–47.
- POLGÁR S. (1935): A Cuha-völgy növényzeti viszonyai – Györi Szemle (1935): 149–160.)
- RÉDL R. (1942): A Bakonyhegység és környékének flórája. Magyar flóraművek V. – Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém, 159 pp.
- SCHMIDT D. (2004): A *Himantoglossum caprinum* (M-Bieb.) Spreng. újrafelfedezése a Bakonyban. – *Kitaibelia* **9** (1): 85–86.
- SIMON T. (2000): A magyarországi edényes flóra határozója. 4. átdolgozott kiadás. – Tankönyvkiadó, Budapest.
- SOMLYAY L. (2008): *Inula* L. – Peremizs. (határozókulcs). – MTM, Budapest, kézirat.
- SZALAI M. (1957): Adatok Halimba környékének flórájához. – *Bot. Közlem.* **47**: 117.
- SZODFRIDT I. – TALLÓS P. (1962): *Carex hartmani* Cajand. Magyarországon és újabb florisztikai adatok a Bakonyaljáról. – *Bot. Közlem.* **49**: 258–262.
- SZODFRIDT I. – TALLÓS P. (1964): A Felsőnyirádi erdő cseres-tölgyesei. – Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei **2**: 423–435.
- SZODFRIDT I. – TALLÓS P. (1965): Újabb adatok a Dunántúl flórájához. – *Bot. Közlem.* **52**: 23–84.
- SZODFRIDT I. – TALLÓS P. (1966): A *Koeleria pyramidata* (Lam.) Domin Magyarországon Újabb florisztikai adatok a Felsőnyirádi-erdőből. – *Bot. Közlem.* **53**: 31–33.
- SZODFRIDT I. – TALLÓS P. (1968a): Újabb adatok a Dunántúl flórájához. – *Bot. Közlem.* **55**: 3013–314.
- SZODFRIDT I. – TALLÓS P. (1968b): Vegetációtanulmányok a Felsőnyirádi-erdőben. – Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei **7**: 221–229.
- TALLÓS P. (1956): Érdekes és újabb florisztikai adatok a Bakonyból és Magyarország egyéb tájairól – *Bot. Közlem.* **46**: 313–314.
- TALLÓS P. (1959a): Növényföldrajzi és florisztikai adatok a Dunántúlról. – *Bot. Közlem.* **48**(1–2): 77–80.
- TALLÓS P. (1959b): Erdő- és réttípus tanulmányok a Széki-erdőben. – *Erd. Kut.* **6**(1–2): 301–353.
- WALDSTEIN F. – KITAIBEL P. (1802): *Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariae* I. – Vindobonae, 1799–1802.