

KITAIBELIA	XV. évf. 1–2. szám	pp.: 119–132.	Debrecen (2010) 2011
------------	--------------------	---------------	----------------------

## Adatok a Mezőföld löszflórájához II.

LENDVAI Gábor<sup>1</sup> – HORVÁTH András<sup>2</sup>

(1) 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 162. gaborlendvai@hotmail.com

(2) MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4. ahorvath@botanika.hu

### Bevezetés

A Mezőföld löszterületeinek botanikai vizsgálatát a nyolcvanas évek második felében kezdtük el azzal a céllal, hogy az ott nagy számban fellelhető völgyeket részletesen bejárjuk, a még természetes állapotban fennmaradt vegetáciomaradványokat felkutassuk és flórájukat felmérjük. E munkának kezdeti florisztikai eredményeit két rövid közleményben már korábban ismertettük (LENDVAI 1993, LENDVAI & HORVÁTH 1994). Az azóta is folyamatosan végzett vizsgálatok során nagy mennyiségben gyűlt össze növényföldrajzi, vegetációtörténeti és/vagy természetvédelmi szempontból jelentősebb florisztikai és elterjedési adat, amelyeket az alábbiakban adunk közre. A korábbi közleményünktől eltérően a lelőhelyeket pontosabban, a legközelebbi földrajzi elnevezés és esetenként részletesebb leírás segítségével is megadjuk. Az adatok dokumentálására számos esetben bizonyító példányt gyűjtöttünk be, melyeket a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának herbáriumában (BP) helyeztünk el.

A felsorolt fajok kiválasztása során törekedtünk arra, hogy elsősorban a növényföldrajzi szempontból érdekes, természetvédelmi szempontból jelentős, valamint a lösz vegetációjára jellemző, de nem általánosan elterjedt fajokat tárgyaljuk. Ennek megfelelően nem tárgyalunk több, a löszre jellemző, esetenként védett fajt (*Viola ambigua*, *Taraxacum serotinum*, *Centaurea sadleriana*), viszont szerepeltetünk az ország más tájain gyakori, de a Mezőföldön regionálisan ritkább növényt.

Az általunk gyűjtött adatok mellett feltüntetjük az időközben napvilágra került, zömében ötven évnél régebbi és megerősítésre váró adatokat is, mint azt a korábbi közleményünkben is tettük. Ezek zöme a Természettudományi Múzeum Növénytárának gyűjteményéből származó herbáriumi adat, illetve ZÓLYOMI BÁLINT kéziratban megmaradt olyan cönológiai felvételeiből származik, melyeknek csupán összesített táblázatait közölte (ZÓLYOMI 1958). Bár a régi adatok közül a Kitaieltől származók zömét korábban már közöltük (lásd LENDVAI & HORVÁTH 1994), a dégi Hódos-erdő növényzetének bemutatására ezek egy részét – az újabban hozzáférhetővé vált későbbi utak adataival egyetemben – pontosabb helymeghatározással itt megismételjük. Kitaiel különböző útjaira az alábbi módon hivatkozunk: KITAIBEL IB: Iter Baranyense 1799 [GOMBOCZ (szerk.) 1945, pp. 291–471], KITAIBEL IS: Iter slavonicum 1808 [LÖKÖS (szerk.) 2001, pp. 107–193], KITAIBEL IE: Iter ertsienense 1814, 1815 [LÖKÖS (szerk.) 2001, pp. 261–268], KITAIBEL IF: Iter furediense 1816 [LÖKÖS (szerk.) 2001, pp. 331–356].

A felsorolásban a nemzetségek a SOÓ-féle rendszertani sorrendben követik egymást. A fajok neve után a közigazgatási határt, valamint a közelebbi földrajzi helynevet (a HM 1 : 25.000 1968-as, 1987-es, és az EOTR 1 : 10.000 1989-es térképsorozatokat szerint) is megadjuk. Aláhúzással jelöltük az általunk talált jelenkori (1990 utáni) előfordulási helyeket. A területre nézve új fajokat vastag szedéssel jelöltük.

### Előfordulási adatok

*Ephedra distachya* L.: Dunaföldvár: Alsó Öreg-hegy.

Egy korábbi adat (OSZOLI in KEVEY 2004) megerősítése. Adony (FARKAS 1999). Balatonszabadi (PAPP J. exsicc. in KEVEY 2004). E lelőhely a tóparti magasparton (tehát nem Balatonszabadi falunál, hanem a Sóstó falurészben) volt található, mai megléte kérdéses. Érd: Sánc-hegy. A vaskori sáncon (ZÓLYOMI mscr). Százhalombatta: téglagyár melletti oldal (legutóbb SZERÉNYI 2000).

*Adonis vernalis* L.: Alsószentiván: Külső-Dögvölgy északi mellékvölgye. Dég: Aligvári-völgy.

Előszállás: Fördös oldalában. Hantos: a hantossárosdi vízfolyás menti gyepen több ezres

állomány. Igar: Nagyvölgy. Lajoskomárom-Hangáspuszta. Lajoskomárom-Külsősáripuszta: a Sári-völgy keleti ágában tömeges. Mezőfalva: a sárbogárdi műút melletti árokszél a Sismándi-vízfolyástól nyugatra; Bolondvár: a váron és a legelőn több ezres állomány. Mezőkomárom: Tüske-völgy. Mezőszilas: Bogárdi-vízfolyás völgye, Bozót-patak völgyének löszlejtője Dég alatt, Ángyád-völgy. Mezőszilas-Halompuszta: ozorai út melletti tölgyes. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben tömegesen; Névtelen-patak völgye. Perkáta: Mélyvölgy. Seregélyes: Rác-völgy. Simontornya:

- a Bozót-patak melletti oldalban. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Érdekes módon e fajt a dunai magaspartokon (Belo-iannisz-Dunaföldvár között) eddig nem találtuk, viszont igen gyakori a Nyugat-Mezőföld déli felén.
- Pulsatilla grandis* Wender.: Dunaföldvár: a Gyűrűs-völgy három pontján; Vajai-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Kisapostag fölött a magasparton az állományt a dunai városi szemételep megsemmisítette.
- Pulsatilla pratensis* subsp. *nigricans* (Störck) Zamels.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Az igari Hordó-völgyben (MAJER 1984) és Kulcsnál (ZÓLYOMI mscr.) a többszöri keresés ellenére sem találtuk.
- Ranunculus illyricus* L.: Baracs: a 6-os főútra vezető bekötő út két oldalán tömeges; dunai magaspart. Belsőbáránd: Kazalok-völgy. Előszállás: Tüzoki-völgy keleti ága. Kisapostag: löszfal. Lajoskomárom-Hangászpusztá. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Nagyvenyim: a szőlők felé a völgy peremén. Perkáta: Hosszú-völgy. Adony: Nyugati-völgy; adonyi szőlőhegy É-i vége. Sárbogárd: Bolondvár. Sárbogárd-Pusztagegres: Téglaházi-völgy.
- Ranunculus pedatus* W. et K.: Adony: Nyugati-völgy. Előszállás: Tüzoki-völgy. Hantos: a hantos-sárosdi ér melletti gyepen. Kisapostag: magaspart. Mezőfalva: Bolondvár. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Ez a faj nem csak a sziki ürömpusztán, hanem a löszgyepek szárazabb típusában is otthon van.
- Anemone sylvestris* L.: Dég: Hunyoros. Mezőszilas: Bogárdi-vízfolyás völgye. Nagykarácsony: Nagy-völgy. Sárbogárd: Bolondvár. Seregélyes: Rác-völgy.
- Anemone ranunculoides* L.: Perkáta-Kisperkáta: Hosszú-völgy. Telepített tölgyesben egyetlen csoportozat. Valószínűleg recens betelepülés. Lajoskomárom-Irtáspusztá: Névtelen-patak völgye keleti ágában. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé.
- Helleborus dumetorum* W. et K.: Pátka: Tikmony-völgy. Székesfehérvár: Nagy-völgy, Aszal-völgy.
- Thalictrum aquilegifolium* L.: Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Suszter-völgy végén lévő tölgyesben. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Mezőszilas-Halompusztá: Hosszú-völgy végi tölgyesben. Paks-Hegyespusztá: a műút melletti tölgyes legelő fölött, ostorfás-tölgyes cserjésben.
- Thalictrum lucidum* L.: Alsószentiván: Katlan-völgy. Hantos-Újtelep: a seregélyesi műút Ny-i oldalán, legelőn.
- Cotoneaster niger* (Thunb.) Fries: Dunai város: papírgyár alatti magaspart. E termőhelyet a papírgyár hulladéklerakója veszélyezteti. Kisapostag: magaspart. Élőhelyének nagy részét sok más értékes fajjal (*Iris pumila*, *Jurinea mollis*, *Pulsatilla grandis*, *Prunus fruticosa*) a terjeszkedő dunai városi szemételep már megsemmisítette. A dunai városi híd nyomvonalát pontosan a termőhelyen vezették keresztül. E faj az Alföldön kizárólag csak a Mezőföldön található fentiekben kívül még Érdnél (SZERÉNYI 2000). HORVÁTH (2002) és SZERÉNYI (2000) ezt a növényt valójában a *C. matrensis* Domokos-nak tartják; e taxon rangja azonban teljesen bizonytalan s a *C. niger*-től morfológiai alapon egyértelműen nem is elkülöníthető (BÖLÖNI 1997). Növényföldrajzi, vegetációtörténeti szempontból itteni előfordulása kiemelkedő jelentőségű, mert a bölcskei *Spiraea media*-val (FARKAS & KUN 1998) együtt valószínűleg a „mogyorókor” előtti hidegebb sztyepidőszak maradványa.
- Potentilla recta* L.: Adony: Keleti-völgy. Bölcske: Űrge-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy. Előszállás: Tüzoki-völgy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában tömeges. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellék-völgyekben. Pátka: Tikmony-völgy.
- Prunus fruticosa* Pall.: Belsőbáránd: Ebvár. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Alsó Új-hegy magaspartja. Füle: Kő-hegy. Kulcs: a szélkereket tartó hegy északi letörésén. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Berhida (BP, BAUER N. exsicc.). E faj jóval ritkábbnak tűnik, mint a törpemandula.
- Prunus mahaleb* L.: Adony-Szentmihálypusztá: a Duna felőli löszmagaslaton, erdőszéleken. Kulcs: a szélkereket tartó hegy északi letörésén. Mezőszilas: Vaskapu. Az egykori tó D-i oldalának lejtőjét borító erdő domináns cserjéje. Enying: Kustván-erdő (KEVEY B. exsicc.). Székesfehérvár: Aszal-völgy, és a közelébe eső, szántók által körülvevett gyepes-fás-cserjés folt. Fokszabadi-Enying, Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB).
- Prunus tenella* Batsch: Adony: Keleti-völgy. Dunaföldvár: Alsó Öreg-hegy: a hegy déli felén, a magaspart peremének több pontján. Alsó Új-hegy magaspartja. Gyulahegy: a magaspart oldalában, cserjésben. Dunaszentgyörgy: szőlőhegy peremén, több állomány. ZÓLYOMI (1958) adatának meg-erősítése. Dunai város: papírgyár alatti magaspart. Kisapostag: löszfal melletti magasparton. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában tömeges. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye

- középső ágában többfelé. Mezőszilas-Halompuszta: ozorai út melletti tölgyes. Nagyvenyim: a szőlőkhöz vezető út peremén. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Eddig csak a földvarról volt ismert. Szabadegyháza: a Sárosd-Szabadegyháza közti vasúti mezsgyében. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Fokszabadi-Enying, Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB, IS). A nagykará-csonyi Nagyvölgyből időközben kipusztult.
- Rosa gallica* L.: Belsőbáránd: Ebvár és környéke. Bölcske: Ürge-völgy. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. Füle: Kő-hegy. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszt: Drótos-hegy. Lajoskomárom-Külsősáripuszt: Sári-völgy keleti ágában. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy, Lóki-patak völgye. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB). Ercsi (KITAIBEL IE).
- Rosa rubiginosa* L.: Ercsi-Aggszentpéter: a Váli-víz hídjától É-ra, az oldalban. Paks-Hegyespuszta: a műút melletti tölgyes legelő cserjésében.
- Rosa spinosissima* L. (incl. *R. pimpinellifolia*): Ab: törpemandulás mélyút. Belsőbáránd: Ebvártól északra. Dég: Hunyoros. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Előszállás: Fördös oldalában. Füle: Kő-hegy. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszt: Drótos-hegy. Lajoskomárom-Külsősáripuszt: a Sári-völgy keleti ágában. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Ercsi (KITAIBEL IE).
- Astragalus asper* Wulf.: Adony: Nyugati-völgy. Beloianisz: a meredek partoldalon szórványosan végig. Belsőbáránd: az Ebvár és a Bolondvár környéke. Dég: Bozót-patak völgye. Hantos-Újtelep: a seregélyesi műúttól Ny-ra elterülő nagy legelőn. Igar: Nagyvölgy; Hordó-völgy. Iváncsa: Ercsi felé a vasút melletti bevágásban; a falu alatti magasparton. Mezőfalva: Bolondvár. Mezőszilas: Bozót-patak völgyének löszlejtője Dég alatt. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Pusztaszabolcs (KITAIBEL IS). Martonvásár, Seregélyes, Nagyhorcsók-Káloz, Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB). Dég (KITAIBEL IF). Elterjedése és gyakorisága alapján a mezőföldi löszpuszták egyik jellegzetes, gyakori faja lehetett.
- Astragalus dasyanthus* Pall.: Adony: Nyugati-völgy: 371 tő 2004. VI. 10-én. Adony-Szentmihálypuszta a 6. sz. műút mellett: 119 tő 2004. VI. 15-én. A 80-as évek végi kb. 230, és az 1997-es 200 tőhöz képest az állomány jelentősen megcsappant. Kulcs: 51 pld. A felmérés kései időpontja miatt az állomány nagysága feltehetőleg jelentősen alulbecsült. 1997-ben két foltban kb. 300 példány volt. Bölcske: Leányvári-völgy: 9 tő 2005. E lelőhely eddig nem volt ismert. Ürge-völgy: 1 tő. Az ürge-völgyi állomány 1990-ben, megtalálásakor sem volt nagy, mindössze 4-6 tő. FARKAS (1994) e fajt innen négy elkülönült foltból jelzi. Azóta az állomány alakulását feltehetőleg senki sem kísérte figyelemmel. Ez a populáció időközben katasztrofálisan megfogyott és mostanra a faj innen szinte teljesen eltűnt. Mivel a korábbi évekből ismert ürge-völgyi lelőhelyeinek mindegyikéről eltűnt, a jelenlegi előfordulási helye (a természetvédelmi területet jelző tábla közelében) viszont korábban nem volt ismert, ezért a ma meglévő egyetlen tő eredetisége bizonytalan.
- Astragalus exscapus* L.: Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Ezres nagyságú állomány.
- Astragalus glycyphyllos* L.: Alsószentiván: Kerék-hegy. Bölcske: Ürge-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Lajoskomárom-Ujmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában.
- Onobrychis arenaria* (Kit.) Ser.: Belsőbáránd: Ebvár környéke. Bölcske: Ürge-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy, Kanacsi-völgy, Oláh-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kulcs: magaspart. Nagykarácsony: Nagyvölgy.
- Hippocrepis comosa* L.: Adony: Nyugati-völgy. Belsőbáránd: Ebvár környéke. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kulcs: magaspart. Nagyhorcsók-Káloz (KITAIBEL IB). Balatonkenese (ZÓLYOMI mscr.).
- Trifolium montanum* L.: Belsőbáránd: Ebvár; Kazalos-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszt: Drótos-hegy. Lajoskomárom-Külsősáripuszt: Sári-völgy K-i ága. Mezőfalva: Bolondvár. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Sárbogárd: Bolondvár; Bolondvári-völgy. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB). Dég (KITAIBEL IF).
- Trifolium rubens* L.: Pátka: Tikmony-völgy. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB).
- Trifolium alpestre* L.: Belsőbáránd: Ebvár környéke. Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Oláh-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszt: Drótos-hegy. Lajoskomárom-Külsősáripuszt: a Sári-völgy keleti ágában. Sárbogárd: Bolondvár. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB). Dég (KITAIBEL IF). Pusztaszabolcs (KITAIBEL IS). Az északias kitétségű rétsztyepek jellegzetes faja az előző két fajjal együtt.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeffer) Rothm.: Lajoskomárom-Külsősáripuszt: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőszilas-Halompuszta: az ozorai út menti tölgyesben. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben, a 9. km környékén.
- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb.: Mezőszilas-Halompuszta: ozorai út melletti tölgyes. Pátka: Tikmony-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy.

- Dég (MAJER 1984).
- Colutea arborescens* L.: Bölcske: Űrge-völgy; Leányvári-völgy. Dunaföldvár: Alsó Új-hegy magaspartja; Alsó Öreg-hegy; Nagyhegy; Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. Kisapostag: löszfal. Paks: Kömlődi út mentén. Balatonkenese (KITAIBEL IF). Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB). Paks: Vörösmalom-völgy (VOIGT & FARKAS 1996).
- Thymelea passerina* (L.) Coss. et Germ.: Adony: Keleti-völgy. Bölcske: Űrge-völgy, Gabonás-völgy. Dég: Bozót-patak völgye. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Igar: Nagyvölgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy. Kisapostag: magaspart. Kulcs: magaspart. Nagykarácsony: Zöld halom. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőn a 9. km-nél.
- Dictamnus albus* L.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Pátka: Tikmony-völgy. Sárbogárd-Kislók: Lóki-patak völgye. Székesfehérvár: Nagy-völgy; Aszal-völgy. Enying-Káloz, Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).
- Cotinus coggygria* Scop.: Székesfehérvár: Nagy-völgy, tölgyes cserjeszintjében.
- Acer tataricum* L.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Lajoskomárom-Tüsképusztá: a mezőszilasi földút mentén. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Németkér: Hardi-völgy; Hardi-hegyi törpemandulás. Nádasdladány: Kasza-völgyi erdő (SONNEVEND 2001).
- Acer platanoides* L.: Baracs: a magasparti tölgyesben.
- Cornus mas* L.: Lajoskomárom: Hangászpusztá; Tüsképusztá; Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Völgyoldalakon gyakori. Pátka: Tikmony-völgy.
- Bupleurum affine* Sadler: Adony: Keleti-völgy; Hosszú-völgy. Baracs: szakadópart. Dég: Aligvári-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kisapostag: magaspart. Mezőszilas-Halompusztá: Hosszú-völgy; ozorai út melletti tölgyes. Ozora: a Sióra néző meredek oldalakon és mellék-völgyekben.
- Bupleurum falcatum* L.: Berhida: Séd oldal, Somlyó-hegy alja. Érd; Balatonkenese (ZÓLYOMI mscr.).
- Bupleurum pachnospermum* Pančić: Paks-Hegvespusztá: a műút melletti tölgyes legelőn, cserjésekben.
- Bupleurum praealtum* Nath.: Székesfehérvár: Nagy-völgy.
- Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench.: Dunaföldvár: Oláh-völgy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Dunakömlőd (ZÓLYOMI mscr.).
- Peucedanum arenarium* W. et K.: Belsőbáránd: Ebvár. Mintegy 35 tő elszórtan a tátorjános mellékvölgy keletre néző oldalán, további 25 tő a következő mellékvölgyben. Meglepő, hogy e fajt eddig senki nem jelezte innen annak ellenére, hogy e terület – „felfedezése” óta – a botanikusok egyik szentélyévé és így gyakran látogatottá vált. Adony; Adony-Dajapusztá (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Paks-Dunakömlőd között MENYHÁRTH (1877) is jelzi.
- Seseli hippomarathrum* L.: Százhalombatta (ZÓLYOMI mscr.). Paks (KITAIBEL IB).
- Trinia glauca* (L.) Dum.: Belsőbáránd: Kazalovölgy.
- Trinia ramosissima* (Fish.) Reichb.: Érd (ZÓLYOMI mscr.).
- Galium odoratum* (L.) Scop.: Székesfehérvár: a Nagy-völgy északi része.
- Rubia tinctorum* L.: Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy, származása bizonytalan, valószínűleg egykori természetéből maradt fenn.
- Cephalaria transylvanica* (L.) Schrad.: Dunaföldvár: Kálvária-hegy; Alsó Öreg-hegy. Ercsi: Kápolnai csapás. Paks: a Kömlődi út és a téglagyár közt, útszélén. Seregélyes (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.; KITAIBEL IE). Paks, Dunakömlőd, Dunaföldvár (MENYHÁRTH 1877). BOROS (1959) csak általánosságban említi.
- Scabiosa canescens* W. et K.: Adony: Nyugati-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy K-i ága. Belsőbáránd: Ebvár (HORVÁTH 1998). Érd; Százhalombatta (ZÓLYOMI mscr.). Dég (MAJER 1984). SZERÉNYI (2000) már jelezte e faj előfordulását a Perkáta és Adony közti területről.
- Lavatera thuringiaca* L.: Adony: Nyugati-völgy. Adony-Dajapusztá: Sinai-hegy. Baracs: szakadópart. Belsőbáránd: Bolondvár. Bölcske: Űrge-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy. Mezőfalva: Bolondvár. Nagylók: Lóki-vízfolyás melletti oldal. Perkáta: Hosszú-völgy. Sárbogárd: Bolondvár.
- Althaea pallida* W. et K.: Adony: Keleti-völgy. Beloianisz: magaspart. Belsőbáránd: a seregélyesi úttól D-re, löszoldalban. Bölcske: a Leányvári-völgybe a 6-os út felől vezető mélyút peremén. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Igar: Nagyvölgy. Ivácsa: magaspart. Nagyhöröcsök: Sárhatvan felé a műút mellett a 16. km-nél. Balatonkenese (KITAIBEL IF).
- Linum flavum* L.: Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Harasztos-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ágában. Németkér: Hardi-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Fokszabadi-Enying,

- Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB). Dég (KITAIBEL IF).  
*Linum hirsutum* L.: Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Harasztos-völgy; Kanacsi-völgy. Belsőbáránd: Ebvár és környéke. Dég (MAJER 1984). Fokszabadi-Enying, Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB). Dég, Benta (KITAIBEL IF).  
*Linum tenuifolium* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Bölcske: Üрге-völgy. Dunaföldvár: Harasztos-völgy; Kanacsi-völgy. Dunaújváros: a papírgyár alatti magasparton nem ritka. Iváncsa: magaspart. Innen SZERÉNYI (2000) már jelezte. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Káloz-Nagyláng (KITAIBEL IB).  
*Geranium sanguineum* L.: Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy. Előszállás: Fördös oldalában. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy. Pátka: Tikmony-völgy. Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).  
*Euphorbia epithymoides* L.: Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában és a völgy végi tölgyesben. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Sárbogárd: Bolondvár. Lajoskomárom-Irtáspusztá: Névtelen-patak völgye keleti ága. Lajoskomárom-Újmajor. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).  
*Euphorbia salicifolia* Host.: Adony: Keleti-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában. Nagyvenyim. Sárbogárd: Bolondvár.  
*Euphorbia seguierana* Necker: Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kisapostag: magaspart. Kulcs: magaspart.  
*Euphorbia virgata* W. et K.: Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Kisapostag: magaspart. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF). Káloz-Nagyláng (KITAIBEL IB).  
*Fraxinus ornus* L.: Baracs: a szakadópart tetején tölgyesben, idős egyedek is. Székesfehérvár: Nagy-völgy.  
*Gentiana cruciata* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Bölcske: Üрге-völgy. Dég: Hunyoros. Dunaföldvár: Harasztos-völgy. Előszállás: Túzoki-völgy. Lajoskomárom: Tüske-völgy. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Nagylók: Nagylókpusztától délre, löszoldalban. Székesfehérvár: Aszal-völgy. A 80-as évek végén került elő először a Dunaföldvár-környéki löszvölgyekben.  
*Vinca herbacea* W. et K.: Adony: Keleti-völgy; adonyi-szőlőhegy É-i vége. Alsószentiván: Katlan-völgy. Belsőbáránd: Ebvár és környéke. Dunaföldvár: Nagy-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Füle: Kő-hegy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy; a hegy melletti völgy végén lévő tölgyes. Kisapostag: magaspart. Kulcs: magaspart. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sióra néző meredek oldalon. Mezőfalva: Bolondvár. Mezőszilas: Bogárdi-vízfolyás völgye. Mezőszilas-Halompusztá: a Hosszú-völgy végi tölgyesben.  
Nagykarácsony: Nagyvölgy. Németkér: Dögvölgy; Hardi-hegyi törpemandulás. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben. Sárbogárd: "Anna-völgy", Bolondvár; Bolondvári-völgy. Sárosd: szántóföldeket elválasztó erdősáv (seregélyesi községhatár) végén, törpemandulával. Seregélyes: Rác-völgy. Székesfehérvár: Nagy-völgy.  
*Vinca minor* L.: Alsószentiván: Külső-Dögvölgy második oldalvölgyének tölgyesében. Dunaföldvár: Alsó Öreg-hegy, egykori löszmélyút mellett. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart alján, erdős bevágásban. Káloz-Belmajor: a völgy elejének erdejében gyakori. Lajoskomárom-Hangászpusztá:  
*Anchusa azurea* Mill.: Martonvásár: Erdőmajor (BP, BOROS Á. exsicc.).  
*Anchusa barrelieri* All.: Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB). Lajoskomárom, Kajászószentpéter (SOÓ & JÁVORKA 1951). Ez utóbbi ma Kajászó néven szerepel a térképeken.  
*Asperugo procumbens* L.: Dunaföldvár: Kálvária-hegy. Kisapostag: magaspart.  
*Echium maculatum* L.: Nagyhörcsök-Káloz, Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB, IF).  
*Lappula patula* (Lehm.) Menyhárh: Balatonkenese: Soós-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kisapostag: magaspart. Paks: téglagyár.  
*Lithospermum purpureo-coeruleum* L.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Székesfehérvár: Nagy-völgy.  
*Myosotis sparsiflora* Mikan: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Mezőszilas-Zöldmajor: földút menti cserjés szélén. Székesfehérvár: Nagy-völgy.  
*Onosma arenaria* W. et K.: Nagykarácsony: Nagyvölgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Pusztaszabolcs (KITAIBEL IS). Seregélyes, Káloz: Dégi csárda (KITAIBEL IB).  
*Pulmonaria mollis* Wulf.: Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy melletti völgy végén lévő tölgyesben. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Pátka: Tikmony-völgy.  
*Ajuga laxmannii* (L.) Benth.: Dunaföldvár: Nagy-hegy. Előszállás: Fördös oldalában. Lajoskomárom: Tüske-völgy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában tömeges. Mezőfalva: Bolondvár. Mezőszilas-Halompusztá: az ozorai út melletti tölgyes szélén. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben gyakori. Székesfehérvár:

- Nagy-völgy; Aszal-völgy. Balatonfőkajár, Dég: Hódos erdő, Nagyhörscök-Káloz, Seregélyes, Káloz-Nagyláng, Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB). Rácszentpéter (KITAIBEL IE). Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF).
- Sideritis montana* L.: Balatonkenese: Soós-hegy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Székesfehérvár: az Aszal-völgy közelébe eső, szántók által körülvevett gyepes-fás-cserjés folt.
- Origanum vulgare* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: gyárás-völgy északi része. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy melletti völgyben. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Sárbogárd: Bolondvár. Pátka: Tikmony-völgy. Székesfehérvár: Nagy-völgy. Érd, Lajoskomárom (HORVÁTH 1998).
- Stachys germanica* L.: Aba: Külsőkajtor melletti mellékvölgyben. Adony-Dajapusztá: A Sinai-hegy északi tövénél. Baracs: szakadópart pereme mögötti gyepekben. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy melletti völgyben. Kisláng: a Herpa halom környéki dűlőutak mentén szórványosan. Ivánca: magaspart. Beloianisz: magaspart. SZERÉNYI (2000) már jelezte innen. Mezőkomárom: Tüske-völgy. Mezőszilas-Halompusztá: Hosszú-völgy. Simontornya: a Bozót-patak melletti oldalban. Ercsi (KITAIBEL IE).
- Nepeta nuda* L.: Aba: Külsőkajtor melletti mellékvölgyben. Adony: Nyugati-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy aljában; a Suszter-völgy végén lévő tölgyesben. Lajoskomárom: Tüske-völgy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában tömeges. Mezőfalva: Bolondvár. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Enying-Káloz (KITAIBEL IB).
- Nepeta parviflora* M. B.: Adony: Nyugati-völgyben 62 tő; Keleti-völgyben 81 tő; az adonyi-szőlőhegy É-i végének felső peremén 6 tő. Előszállás: Tűzoki-völgy bejáratával szemben 1 tő. E helytől nem messze, Alsószentivánnál is gyűjtötte e fajt TAUSCHER Gyula 1871-ben. Nagykarácsony: útszéli mezsgye a Nagyvölgy közelében.
- Prunella grandiflora* (L.) Scholler: Dég: Aligvári-völgy; Hunyoros. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy több pontján. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőkomárom: Tüske-völgy.
- Phlomis tuberosa* L.: Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában több felé. Székesfehérvár: Aszal-völgy; Nagy-völgy. Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.).
- Salvia aethiopsis* L.: Adony: Nyugati-völgy. Dunaföldvár: Oláh-völgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Seregélyes (KITAIBEL IS). Balatonfőkajár-Lepsény (KITAIBEL IF). Balatonfőkajár (KITAIBEL IB).
- Salvia verticillata* L.: Dunaföldvár: Bánom-völgy. Kisláng: Herpa halomtól Ny-ra dűlőút-széli mezsgyéken. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy.
- Linaria angustissima* (Lois.) Borb.: a rendszertani és nevezéktani bizonytalanság következtében e fajt több helyről is jelezték korábban, mindezt ideig tévesen. Adatai legtöbbször a következő fajra vonatkoznak. A Mezőföldön e faj eddig nem került elő.
- Linaria biebersteinii* Bess.: Aba: törpemandulás mélyút. Adony: Nyugati-völgy. Bölcske: Ürgé-völgy. Dunaföldvár: Nagy-hegy; Kanacsi-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Előszállás: Fördős. Érd: Sánc-hegy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőfalva: Bolondvár. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Paks: téglagyár déli peremén. Korábbi közleményünkben (LENDVAI & HORVÁTH 1994) e fajt tévesen *L. angustissima* subsp. *kocianovichii*-ként tüntettük fel.
- Pseudolysimachion spurium* (L.) Rauschert: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Fokszabadi-Enying, Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB).
- Orobanche alba* Steph.: Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Suszter-völgy felső végénél Thymus-on. Érd (ZÓLYOMI mscr.).
- Orobanche alsatica* Kirsch.: Előszállás: Fördős oldalában. Kisláng: a Herpa-halom melletti földút mentén Ny-ra.
- Orobanche arenaria* Borkh.: Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy. *Artemisia campestris*-en. Balatonkenese (Bauer – Somlyay 2007). Paks: Malom-hegy, Dunakömlőd; Weiherthal, Dunaföldvár: Nagyhegy (MENYHÁRTH 1877).
- Orobanche elatior* Sutton: Baracs: szakadópart. Dég: Aligvári-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Lajoskomárom: Sári-völgy K-i ága. Káloz (KITAIBEL IB).
- Orobanche lutea* Baumg.: Belsőbáránd: Ebvár. Kulcs: a szélkerékes hegy északi letörésén.
- Orobanche purpurea* Jacq.: Paks: Vörösmalom-völgy (VOIGT & FARKAS 1996).
- Orobanche reticulata* Wallr.: Ercsi: A beloianniszi magasparton, a Bp.-Pécs vasútvonalat keresztező földút bevágásának nyugatra néző oldalán, Cirsium-on.
- Corydalis cava* (L.) Schw. et Koerte: Baracs: a magasparti tölgyesben kevés, a mellette levő akác-osztorfás erdőben tömegesen. Dunaföldvár: Felső Öreg-hegy ÉK-i oldalában. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes.
- Corydalis pumila* (Host) Rechb.: Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes.

- Lajoskomárom-Tüsképuszta: a völgyoldali juhererdő alján. Lajoskomárom-Külsősáripuszta: Sári-völgy keleti ága. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé.
- Erysimum diffusum* Ehrh.: Adony-Szentmihálypuszta: gyapjas csüdfüves TT. Dunaföldvár: Felső Öreg-hegy; Kálvária-hegy; Nagy-hegy. Kulcs: magaspart. Balatonkenese (ZÓLYOMI mscr.).
- Erysimum odoratum* Ehrh.: Érd: Sánc (ZÓLYOMI mscr.).
- Brassica elongata* Ehrh.: Bölcske: Üрге-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Paks: téglagyár. Pusztaszabolcs, Dég (KITAIBEL IS). Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB). Ercsi (KITAIBEL IE).
- Crambe tataria* Sebeók: A legújabb határozókbán (Simon 1992, 2000) feltüntetett lelőhelyek felsorolása pontatlan (Belsőbáránd helyett Seregélyes szerepel) vagy téves. Az eddig ismert lelőhelyeken (Balatonkenese: Partfő. Belsőbáránd: Ebvár. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Vajai-völgy. Bölske: Üрге-völgy; Leányvári-völgy; Gabonás-völgy) kívül a Mezőföldön csak még egy helyről került elő: gyepezárvány a Gyűrűs-völgy és a Kanacs-völgy találkozásától délre. (Nincs: Szekszárd; Nagyhalom; D-T: Illancs).
- Sisymbrium loeselii* Jusl.: Dunaföldvár: Kálvária-hegy. Érd, Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Ercsi (KITAIBEL IE).
- Sisymbrium orientale* Torn.: Baracs: szakadópart. Bölcske: Üрге-völgy. Dég: Bozót-patak völgye. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kisapostag: magaspart. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszta: Drótos-hegy. Mezőfalva: Bolondvár. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön. Sárbogárd: Bolondvár.
- Hesperis tristis* L.: Adony: Nyugati-völgy; adonyi-szőlőhegy É-i vége. Előszállás: Fördős oldalában; Tűzoki-völgy. Kisapostag: magaspart. Lajoskomárom: Hangászpuszta: nyugati kitétségű völgyoldalon; Külsősáripuszta: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőfalva: Bolondvár. Nagykarácsony: a nagylegelőn tömeges. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben. Székesfehérvár: Aszal-völgy.
- Alyssum turkestanicum* R. et Sch.: Kisapostag: szakadópart, löszfal pereme. Mezőfalva: Bolondvár, a vár oldalában, kunkorgó árvalányhajas száraz löszgyepecben.
- Alyssum alyssoides* (L.) Nath.: Adony-Szentmihálypuszta: gyapjas csüdfüves TT. Bölcske: Üрге-völgy. Dég: Bozót-patak völgye. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy; Nagyhegy; Felső Öreg-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Iváncsa: magaspart.
- Kisapostag: magaspart. Mezőfalva: Bolondvár.
- Reseda inodora* Rchb.: Adony: Keleti-völgy. Dunaújváros: a papírgyár alatti magasparton szórványosan. Iváncsa: Beloiannisz felé a löszoldal peremén. Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Rácalmás (BP, DÉGEN Á. exsicc.). MENYHÁRTH (1877) WIESBAURRA hivatkozva a paksi löszhalmokról is jelzi.
- Helianthemum ovatum* (Viv.) Dun.: Igarvámszőlőhegy-Dádpuszta: Suszter-völgy végi tölgyes. Székesfehérvár: Nagy-völgy. Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).
- Viola odorata* L.: Káloz-Belmajor: a völgy elejének erdejében gyakori. Nagylók-Erdőmajor: a műút melletti vegyes erdőben.
- Sedum maximum* (L.) Hoffm.: Adony: adonyi-szőlőhegy É-i vége. Baracs: szakadópart; a magasparti tölgyesben. Dunaföldvár: Alsó Új-hegy magaspartja; Felső Öreg-hegy; Kálvária-hegy; Nagy-hegy. Füle: Kő-hegy. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszta: a Drótos-hegy oldalában és a völgy végi tölgyesben. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Mezőszilas-Halompuszta: ozorai út melletti tölgyes. Paks: téglagyár; halászcserda fölötti orom.
- Hypericum elegans* Stev.: Adony: Nyugati-völgy; Keleti-völgy; Sinai-hegy. Adony-Szentmihálypuszta: gyapjas csüdfüves TT. Alap: Határ-völgy. Beloiannisz: magaspart. Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Csősz: Öreg-aszó. Dég: Hunyoros. Előszállás: Fördős oldalában; Tűzoki-völgy. Igar: Nagy-völgy. Egyetlen helyen néhány tő. Iváncsa: magaspart. Lajoskomárom-Külsősáripuszta: Sári-völgy keleti ágában. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában. Mezőszilas: Bogárdi-vízfolyás völgye. Mezőszilas-Halompuszta: Hosszú-völgy. Seregélyes: Rác-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy; Nagy-völgy. Velence: löszvölgy.
- Hypericum hirsutum* L.: Lajoskomárom-Külsősáripuszta: Sári-völgy keleti ága. Alsószentiván: Külső-Dögvölgy második mellékága.
- Campanula patula* L.: Alsószentiván: Katlan-völgy.
- Campanula bononiensis* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpuszta: Drótos-hegy. Kisapostag: magaspart. Mezőfalva: Bolondvár. Mezőszilas-Halompuszta: ozorai út melletti tölgyes. Nagykarácsony: Nagy-völgy. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön. Sárbogárd: Bolondvár; Bolondvári-völgy. Dég (MAJER 1984).
- Campanula glomerata* L.: Adony: Hosszú-völgy; Keleti-völgy; Nyugati-völgy. Belsőbáránd: Ebvár.

- Bölcske:** Űrge-völgy. **Dunaföldvár:** Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy. **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart. **Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá:** Drótos-hegy. **Kisapostag:** magaspart. **Kulcs:** magaspart. **Mezőszilas:** Vaskapu. **Nagyhőresök:** Aszó-völgy. **Sárbogárd:** Bolondvár; Bolondvári-völgy. Dég (MAJER 1984).
- Campanula persicifolia* L.: **Belsőbáránd:** Ebvár. **Dég:** Aligvári-völgy; Hunyoros. **Dunaföldvár:** Gyűrűs-völgy; Oláh-völgy. **Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá:** a Drótos-hegy oldalában és a völgy végi tölgyesben. **Lajoskomárom-Külsősáripusztá:** Sári-völgy keleti ágában. **Mezőszilas-Halompusztá:** ozorai út melletti tölgyes. **Németkér:** Hardi-hegyi törpemandulás. **Ozora:** a műút fölötti mellékvölgyekben. **Pátka:** Tikmony-völgy. **Sárbogárd:** Bolondvár; Bolondvári-völgy. **Székesfehérvár:** Nagy-völgy. Paks: Vörösmalom-völgy (VOIGT & FARKAS 1996). Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).
- Campanula sibirica* L.: **Belsőbáránd:** Ebvár; Kazalos-völgy. **Dunaföldvár:** Gyűrűs-völgy. **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart északi lejtője. Paks: Vörösmalom-völgy (VOIGT & FARKAS 1996). Dég (MAJER 1984). Káloz-Nagyláng (KITAIBEL IB). Paks-Dunakömlőd közti szőlők (MENYHÁRTH 1877).
- Campanula trachelium* L.: Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).
- Anthemis tinctoria* L.: **Aba:** törpemandulás mélyút. **Adony:** Szentmihály-hegy. **Dunaföldvár:** Alsó Új-hegy; Kálvária-hegy; Nagy-hegy; Harasztos-völgy; Kanacsi-völgy. **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart. **Kulcs:** **Németkér:** Hardi-hegyi törpemandulás. **Paks:** téglagyár; halászcserda fölötti orom. **Pátka:** Tikmony-völgy. Dég (MAJER 1984).
- Artemisia austriaca* Jacq.: Baracs: partfál (ZÓLYOMI mscr.). **Adony:** Dajapusztá (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). **Ercsi** (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Eleddig sehol nem találtuk újabban.
- Artemisia campestris* L.: **Adony:** Szentmihályi-szőlőhegyen gyakori. **Belsőbáránd:** Ebvár. **Bölcske:** Űrge-völgy. **Dunaföldvár:** Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy; Felső Öreg-hegy; Kálvária-hegy, Alsó Új-hegy. **Dunaföldvár-Vilmospusztá:** a régi megyehatár mentén a 6. út mellett. **Dunakömlőd:** Sánc-hegy. **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart. **Előszállás:** Fördös oldalában. **Kisapostag:** magaspart. **Kulcs:** magaspart. **Lajoskomárom-Külsősáripusztá:** a Sári-völgy keleti ága. **Ozora:** a műút fölött a szeméttelpel melletti gerincen csak néhány tő. **Paks:** téglagyár; halászcserda fölötti orom; Kömlődi út mentén. **Sárbogárd:** Bolondvári-völgy. Dég (MAJER 1984). Balatonkenese; Százhalombatta; Érd (ZÓLYOMI mscr.). Paks (VOIGT & FARKAS 1996).
- Artemisia pontica* L.: **Beloianisz:** a partoldal északi vége felé a vasút közelében a lejtő tövének egyetlen csoportozat. **Berhida:** Séd oldal. Baracs: partfál (ZÓLYOMI mscr.); e helyen többszöri keresés után sem találtuk. **Ercsi** (KITAIBEL IE). **Ercsi-Göböljáráspusztá** (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Ez utóbbi talán a beloianiszi adattal azonos.
- Artemisia scoparia* W. et K.: **Dunaföldvár:** Nagy-hegy. **Dunakömlőd:** Sánc-hegy oldala. **Paks:** téglagyár. Dég (MAJER 1984).
- Aster amellus* L.: **Belsőbáránd:** Ebvár. **Dunaföldvár:** Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. **Lajoskomárom-Külsősáripusztá:** a Sári-völgy keleti ágában. **Sárbogárd:** Bolondvár. **Pátka:** Tikmony-völgy. **Székesfehérvár:** Aszal-völgy. Dég (MAJER 1984).
- Aster linosyris* (L.) Bernh.: **Adony:** Nyugati völgy. **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart. **Előszállás:** Fördös oldalában. **Kisapostag:** magaspart. **Kulcs:** magaspart. **Lajoskomárom-Külsősáripusztá:** a Sári-völgy keleti ágában. **Pátka:** Tikmony-völgy. **Székesfehérvár:** Nagy-völgy. Százhalombatta; Balatonkenese; Érd (ZÓLYOMI mscr.).
- Carduus hamulosus* Ehrh.: **Ercsi** (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). SZERÉNYI (2000) Érd és Százhalombatta körül újfent megtalálta.
- Carthamus lanatus* L.: **Ercsi** (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Érd (BP, BOROS Á. exsicc.). Balatonkenese (BP, JÁVORKA S. exsicc.). Székesfehérvár-Zámoly, Paks (KITAIBEL IB).
- Centaurea solstitialis* L.: **Hantos:** Világos pusztá. **Balatonkenese:** Márkó-völgy. Székesfehérvár-Zámoly (KITAIBEL IB). Mezőszentgyörgy (KITAIBEL IF).
- Centaurea triumphetti* All.: **Pátka:** Tikmony-völgy. **Székesfehérvár:** Nagy-völgy.
- Crupina vulgaris* Pers.: **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart. **Kisapostag:** magaspart. **Lajoskomárom-Külsősáripusztá:** Sári-völgy keleti ága. **Ozora:** a Sióra néző oldalon a 9-es kilométerkőnél. **Dunaföldvár:** Nagyhegy (MENYHÁRTH 1877).
- Doronicum hungaricum* (Sadl.) Rchnb.: **Lajoskomárom-Újmajor:** Névtelen-patak völgye középső ágában. **Mezőszilas-Halompusztá:** ozorai út melletti tölgyes. Dég és Enying között: „Ozorai erdő” (KITAIBEL IF). A fenti előfordulások a majdnem 200 éves KITAIBEL-féle adat megerősítései. Nádasdladány: Kasza-völgyi erdő (SONNEVEND 2001).
- Hieracium umbellatum* L.: **Belsőbáránd:** Ebvár; Kazalos-völgy. **Bölcske:** Űrge-völgy. **Dunaújváros:** papírgyár alatti magaspart. **Kulcs:** magaspart. **Sárbogárd:** Bolondvár. **Pátka:** Tikmony-völgy. Dég (MAJER 1984). Paks:

- Vörösmalom-völgy (VOIGT & FARKAS 1996).
- Hypochoeris maculata* : Belsőbáránd: Ebvár. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart északi lejtői. Nagyhöröcsök (ZÓLYOMI mscr.). Káloz (KITAIBEL IB).
- Inula conyza* DC.: Adony: Keleti-völgy. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Paks-Dunakömlőd (MENYHÁRTH 1877).
- Inula ensifolia* L.: Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Előszállás: Fördös oldalában. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Pátka: Tikmony-völgy. Székesfehérvár: Nagy-völgy. Dég: Hódos erdő (KITAIBEL IB).
- Inula germanica* L.: Abá: törpemandulás mélyút. Adony: Nyugati-völgy; Hosszú-völgy, itt csak néhány tő; adonyi-szőlőhegy É-i vége. Alap: Határ-völgy. Beloianisz: a szeméttelap mellett a magaspart tövénél. Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Előszállás: Fördös. Hantos-Újtelep: a seregélyesi műtől Ny-ra elterülő nagy legelőn szórványosan. Ivánca: magaspart oldalán több foltban. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőfalva: Bolondvár. Mezőkomárom: Sió fölötti löszlejtő. Mezőszilas: Bogárdi-vízfolyás völgye; Bozót-patak völgyének löszlejtője Dég alatt. Sárbogárd: "Anna-völgy". Székesfehérvár: Aszal-völgy. Ercsi (KITAIBEL IE). Enying-Káloz (KITAIBEL IB). Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF).
- Inula hirta* L.: Adony: Nyugati-völgy. Csak egyetlen tőcsoport. Belsőbáránd: az Ebvár és a Bolondvár közötti lejtőkön. Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Oláh-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában. Kulcs: a szélkereket tartó hegy É-i letörésén. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Sárbogárd: Bolondvár. Seregélyes: Rác-völgy. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB, IF).
- Inula oculus-christi* L.: Adony: Keleti-völgy. Beloianisz: a magaspart oldalán a vasúti bevágás közelében. Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Előszállás: Fördös. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy oldalán. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőfalva: Bolondvár. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben tömegesen. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB). Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF).
- Inula salicina* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Kisláng: a Herpa halomtól Ény-ra, telepített nyáras szélén; a soponyai út mentén. Sárbogárd: a Bolondvári-völgyben, É-i oldalon.
- Jurinea mollis* (L.) Rchnb.: Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Dég: Bozót-patak völgye. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Előszállás: Fördös oldalában. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ágában. Lajoskomárom-Hangászpusztá: Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB).
- Scorzonera austriaca* Willd.: Százhalombatta (Zólyomi mscr.).
- Scorzonera hispanica* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Fokszabadi-Enying (KITAIBEL IB). Dég (KITAIBEL IF). Paks-Dunakömlőd, Dunaföldvár: szőlők közt (MENYHÁRTH 1877).
- Serratula radiata* (W. et K.) M. B.: Dég: Aligvári-völgy: helyenként tömeges. Érd; Lajoskomárom (HORVÁTH 1998). Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF).
- Serratula tinctoria* L.: Belsőbáránd: Ebvár. Dég: Hunyoros; Aligvári-völgy. Székesfehérvár: Nagy-völgy. Pusztai tölgyesben. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Seregélyes: Rác-völgy.
- Taraxacum erythrospermum* Andrz.: Dunaföldvár: Kanacsi-völgy. Igar: Nagyvölgy. Lajoskomárom-Hangászpusztá. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Ozora: a műút fölötti, Sióra néző lejtőkön. Sárbogárd: Bolondvár.
- Xeranthemum annuum* L.: Adony: Szentmihályi-szőlőhegy; Keleti-völgy. Baracs: szakadópart. Dunaföldvár: Alsó Új-hegy magaspartján; Felső Óreg-hegy; Kálvária-hegy; Nagy-hegy. Dunakömlőd: Sác-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Kisapostag: magaspart. Paks: téglagyár; halászcsernye fölötti orom. Pátka: Tikmony-völgy. Balatonkenese; Érd; Százhalombatta (ZÓLYOMI mscr.). Dég (MAJER 1984). Paks: Vörösmalom-völgy (VOIGT & FARKAS 1996).
- Quercus cerris* L.: Dég: Bozót-patak völgye keleti oldala a szőlők alatt: egy fiatal és egy középkorú példány telepített tölgyesben. A fiatal egyed sarj eredetű, amire egy tőből háromfelé ágazó törzse utal. Mezőszilas: Vaskapu. Az egykori tőtől ÉNy-ra húzódó oldalon néhány középkorú és számos fiatal példány.
- Quercus petraea* s.l.: Paks-Hegvespusztá: a műút melletti tölgyes legelő fölött, cserjésben.
- Quercus pubescens* Willd.: Alsószentiván: Külső-Dög-völgy második mellékága. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Suszter-völgy teljes hosszán szórványosan. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgyében elszórtan többfelé. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Kistápé-Tölgyfajmajor: két igen idős példány. Pátka: Tikmony-völgy. Dég: Hódos

- erdő (KITAIBEL IB).
- Silene bupleuroides* L.: Belsőbáránd: Ebvár környéke. Balatonkenese: Soós-hegy. Füle: Kő-hegy. Balatonkenese (ZÓLYOMI mscr.). Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Dég (MAJER 1984). Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF).
- Androsace maxima* L.: Kisapostag: löszfal. Ezen kívül Balatonakarattánál ugyancsak löszfalon (BAUER & SOMLYAI 2007).
- Polygonum patulum* M. B.: Baracs: szakadópart. Dunaföldvár: Kálvária-hegy. Löszfalak peremén ürömpusztá-növényzet alkotója.
- Bassia prostrata* (L.) A. J. Scott: Dunaföldvár: Felső Öreg-hegy; Kálvária-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart.
- Bassia scoparia* (L.) Voss.: Kisapostag: löszfal.
- Bassia sedoides* (Pall.) Asch.: Százhalombatta: szőlők közt (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Dunaföldvár: Kálvária-hegy, Nagyhegy (MENYHÁRTH 1877). Balatonszabadi: szőlő közt (BORBÁS 1900). A dunaföldvári adatot BOROS (1959) ugyan kétségbe vonta, de a battai előfordulás alapján nem lehetetlen.
- Krascheninnikovia ceratoides* Gueldenst.: Előző közleményünkben utolsó gyűjtésének időpontja pontatlanul jelent meg. A helyes dátum: 1957. október 14.
- Atriplex tatarica* L.: Dunaföldvár: Kálvária-hegy. Érd: Sánchehy (BP, BOROS Á. exsicc.).
- Atriplex oblongifolia* W. et K.: Baracs: magaspart. Dunaföldvár: Kálvária-hegy; Alsó Új-hegy magaspartja. Kisapostag: magaspart.
- Atriplex acuminata* W. et K.: Százhalombatta (ZÓLYOMI mscr.).
- Salsola kali* L.: Dunaújváros: szeméttelap környéke. Kisapostag: a löszfal peremén. Adony: szőlőhegy szélén. Paks (KITAIBEL IB).
- Veratrum nigrum* L.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Mezőszilas: Suszter-völgy végénél felhagyott löszmélyútban. Enying-Káloz (KITAIBEL IB).
- Allium atropurpureum* W. et K.: Berhida: Séd oldal. Balatonkenese (BP, JÁVORKA S. exsicc.).
- Allium atroviolaceum* Boiss.: Bölcske: Gabonás-völgy; Úrge-völgy. Érd: Sánchehy. Kishantos: a seregélyesi műút mentén. Kisláng: a Herpa halom melletti földút mentén; a halomtól ÉNy-ra lévő telepített nyáras szélén löszgyepekben. Soponya: a kislángi út mentén. Balatonkenese (BP, BÁNÓ L. exsicc.).
- Allium flavum* L.: Adony: Szentmihályi szőlőhegy; szőlőhegy keleti oldala. Kisapostag: magaspart. Baracs: szakadópart. Dég: Hunyoros, csak néhány tő. Dunaföldvár: Kálvária-hegy; Alsó Új-hegy;
- Alsó Öreg-hegy; Felső Öreg-hegy; Oláh-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy oldalán. Kulcs, Nagyhörccsök (HORVÁTH 1998).
- Allium paniculatum* L.: Aba: törpemandulás mélyút. Adony: Hosszú-völgy; Keleti-völgy; Nyugati-völgy. Alsószentiván: Katlan-völgy. Belsőbáránd: Ebvár. Dég: Hunyoros. Dunaföldvár: Nagyhegy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy. Lajoskomárom: Névtelen-patak völgye. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ágában. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyesben és szegélyén. Nagyhörccsök: Aszó-völgy. Nagylók: Nagylóki-völgy; Lóki-patak völgye. Németkér: Hardi-völgy. Ozora: Névtelen-patak völgye. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Seregélyes: Rác-völgy.
- Allium rotundum* L.: Adony: Keleti-völgy; Nyugati-völgy. Beloianisz: magaspart. Bölcske: Úrge-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Iváncsa: magaspart. Kisapostag: magaspart. Kisláng: a Herpa halom melletti földút mentén. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Ercsi (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Adony (BP, TAUSCHER Gy. exsicc.). Martonvásár (BP, Anonymous exsicc.). Balatonkenese (BP, JÁVORKA S. exsicc.).
- Allium sphaerocephalon* L.: Adony: Szentmihálypusztá: gyapjas csüdfüves TT; Hosszú-völgy; Nyugati-völgyben tömeges. Baracs: szakadópart. Belsőbáránd: Ebvár. Bölcske: Úrge-völgy. Dég: Hunyoros; Bozót-patak völgye; Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy; Nagyhegy; Felső Öreg-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy; a Suszter-völgy végén lévő tölgyes tisztásain. Iváncsa: magaspart. Kisapostag: magaspart. Kulcs: a szélkerék fölötti hegy déli oldala. Nagylók: Kuk-hegy. Ozora: az út fölötti, Sióra néző oldalakon. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Érd; Dunakömlőd; Balatonkenese (ZÓLYOMI mscr.). A faj proterandriás.
- Allium vineale* L.: Dég: Hunyoros; Aligvári-völgy. Iváncsa: magaspart. Hantos-Kishantos: a seregélyesi műút mentén.
- Scilla vindobonensis* Speta: Dunaföldvár: Felső Öreg-hegy ÉK-i lejtőjén, másodlagos cserjésben egy csoport. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában, zárt tölgyesben nagy állomány.
- Anthericum ramosum* L.: Dég: Hunyoros; Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Oláh-völgy északi lejtőjén. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart északi lejtője. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy oldalában és a völgy végén lévő tölgyesben. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy

- keleti ágában. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Sárbogárd: Bolondvár körsáncának belső, északi lejtője. Seregélyes: Rác-völgy.
- Ornithogalum pyramidale* L.: Hantos-Kishantos: a seregélyesi műút mezsgyéjében mintegy 55 tő (ÁCS Sándorné közlése alapján). A Mezőföldön eddig csak Érdről volt ismert (SZERÉNYI 2000), de újabban előkerült Balatonkenesénél is (BAUER & SOMLYAI 2007).
- Ornithogalum boucheanum* (Kunth.) Asch.: Nagykarácsony: Nagyvölgy; horhos sűrűjében.
- Sternbergia colchiciflora* W et. K.: Érd: Kakuk-hegy. Pusztai tölgyesben.
- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce: Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Oláh-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában és a völgy végi tölgyesben. Németkér: Hardi-hegyi törpemandulás. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Pátka: Tikmony-völgy.
- Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf.: Baracs: a szakadópart melletti akác-osztorfás erdőben. Dunaföldvár: Felső Öreg-hegy ÉK-i lejtőjén. Kisapostag: a magaspart bevágásában erdő alján. Kulcs: a falutól északra levő magaspart. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában és a völgy végi tölgyesben. Káloz-Belmajor: a völgyben végig. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Lajoskomárom-Tüsképusztá: a keletre néző völgyoldalakon. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Nagylók-Erdőmajor: a műút melletti vegyes erdőben tömeges. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Németkér: Hardi-hegyi törpemandulás. Perkáta: Hosszú-völgy; a völgyoldal telepített erdejében (kőris-osztorfa) egy csoportot. Pusztaszabolcs: Hosszú-völgy; a Cíkolai-halastavak melletti tölgyes mellett.
- Polygonatum multiflorum* (L.) All.: Dég: Parkerdő (MAJER 1984).
- Carex humilis* Leyss.: Adony: Keleti-völgy; Nyugati-völgy; Szentmihálypusztá: gyapjas csüdfüves TT. Perkáta: Hosszú-völgy. Igar: Hordó-völgy. Előszállás: Fördös oldalában. Mezőszilas: Vaskapu: az egykori tó fölötti gyér akácokban. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Lajoskomárom-Hangászpusztá: nyugati oldalban hatalmas csomók. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága. Ozora: Névtelen-patak völgye. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Seregélyes: Rác-völgy. Dég: (MAJER 1984).
- Carex liparicarpus* Gaud.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy keleti ága.
- Carex michelii* Host.: Adony: Nyugati-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: a Drótos-hegy oldalában és a völgy végi tölgyesben.
- Kisapostag: magaspart. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában tömeges. Lajoskomárom-Újmajor: Névtelen-patak völgye középső ágában többfelé. Mezőszilas-Halompusztá: Hosszú-völgy. Pátka: Tikmony-völgy. Seregélyes: Rác-völgy.
- Carex spicata* Huds.: Adony: Nyugati-völgy. Dég: Hunyoros. Hantos-Kishantos: a seregélyesi műút mezsgyéjében.
- Carex stenophylla* Wahlbg.: Belsőbáránd: a seregélyesi úttól délre a löszoldalban. Igar: Nagyvölgy. Mezőfalva: Bolondvár. Nagykarácsony: Nagyvölgy.
- Carex tomentosa* L.: Belsőbáránd: Ebvár-Bolondvár környéke. Sárbogárd: Bolondvári-völgy északi lejtőjén.
- Iris pumila* L.: Adony: Keleti-völgy; Nyugati-völgy. Baracs: szakadópart. Belsőbáránd: Kazalos-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magasparton tömeges. Előszállás: Fördös oldalában. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Ozora: a műút fölötti mellékvölgyekben. Székesfehérvár: Aszal-völgy.
- Iris variegata* L.: Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Lajoskomárom-Újmajor: a Névtelen-patak völgyének oldalában, tölgyesben. Pátka: Tikmony-völgy.
- Orchis coriophora* L.: Belsőbáránd: Ebvár és Bolondvár között. Bölcske: Leányvári-völgy. Dunaföldvár: Bánom-völgy. Sárbogárd: Bolondvári völgy.
- Orchis morio* L.: Nagylók: Nagylóki-völgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy.
- Orchis ustulata* L.: Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Ozora: a műút fölötti mellékvölgyekben.
- Orchis purpurea* Huds.: Székesfehérvár: Aszal-völgy.
- Anacamptis pyramidalis* (L.) Rchb.: Belsőbáránd: Ebvár és Bolondvár között.
- Elymus caninus* (L.) L.: Székesfehérvár: Nagy-völgy, tölgyesben.
- Agropyron pectiniforme* R. et Sch.: Aba: törpemandulás mélyút; Külsőkajtor. Adony: Hosszú-völgy; Keleti-völgy; Nyugati-völgy. Baracs: szakadópart. Beloianisz: magaspart. Belsőbáránd: Ebvár és Bolondvár környéke. Besnyő: a Váli-vízre néző lejtőkön. Dég: Bozót-patak völgye. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy; Oláh-völgy; a dunai partfalon végig. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Iváncsa: magaspart. Kisapostag: magaspart. Kulcs: magaspart. Mezőfalva: Bolondvár. Nagyhőrcsök: Aszó-völgy. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Nagylók: Kuk-hegy; Lóki-vízfolyás melletti oldal. Sárbogárd: Bolondvár; Bolondvári-

- völgy. Seregélyes: Rác-völgy. Balatonkenese (ZÓLYOMI mscr.). Ercsi (KITAIBEL IS, IE, IF). Benta (KITAIBEL IF).
- Aegilops cylindrica* Host.: Dunaföldvár: Kálvária-hegy melletti partfal.
- Bromus erectus* Huds.: Dég: Aligvári-völgy; Hunyoros. Mezőfalva: Bolondvári legelő. Mezőkomárom: Tüske-völgy. Nagyhőrcsök: Aszó-völgy. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Nagyvenyim. Pátka: Tikmony-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Velence: löszvölgy.
- Bromus ramosus* Huds.: Székesfehérvár: Nagy-völgy.
- Chrysopogon gryllus* (Tor.) Trin.: Adony: Hosszú-völgy; Keleti-völgy; Nyugati-völgy. Belsőbáránd. Bölcske: Ürge-völgy. Dég: Bozót-patak völgye. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy; Kanacsi-völgy. Igar: Hordó-völgy; Nagyvölgy. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá. Kulcs: gyapjas csüdfüves oldal. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Ozora: a Sióra néző lejtőkön és mellékvölgyekben. Sárbogárd: Bolondvár; Bolondvári-völgy.
- Brachypodium pinnatum* (L.) B. P.: Adony: Szentmihály-hegy alatti töltés északi oldalában. Beloianisz. Bölcske: Ürge-völgy. Dég: Hunyoros; Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Kanacsi-völgy; Gyűrűs-völgy; Oláh-völgy. Igar: Nagyvölgy. Iváncsa. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Ozora: a Sióra néző, keleties kitétségű mellékvölgy-oldalokon a 9. km-nél. Pátka: Tikmony-völgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy. Seregélyes: Rác-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IB). A Sárvíztől K-re mindenütt É-ias kitétségű lejtőkön.
- Helictotrichon adsurgens* (Schur ex Simonk) Conert: Adony: a szőlőhegy É-i végénél. Belsőbáránd: Ebvár és Bolondvár között. Dég: Hunyoros; Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Vajai-völgy; Gyűrűs-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart északi lejtője. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy K-i ága. Sárbogárd: Bolondvár, Bolondvári-völgy. Seregélyes: Rác-völgy.
- Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg.: Adony: a szőlőhegy É-i végénél; Nyugati-völgy. Adony-Szentmihálypusztá: gyapjas csüdfüves TT. Beloianisz: a magaspart bevágásában, É-i lejtőn. Belsőbáránd: Ebvár és Bolondvár között; Kazalos-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Dunaföldvár: Oláh-völgy; Vajai-völgy; Gyűrűs-völgy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart északi lejtője. Előszállás: Tüzoki-völgy bejárata mellett. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy. Iváncsa: a magaspart kis mellékvölgye a víztoronynál. Kulcs: a szélkerekes hegy északi letörésénél. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: Sári-völgy K-i ága. Nagykarácsony: Nagyvölgy. Seregélyes: Rác-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy.
- Melica transsilvanica* Schur: Adony: Szentmihály-hegy, Éles-hegy, Rác-hegy, szőlőhegy É-i vége. Adony-Szentmihálypusztá: gyapjas csüdfüves TT. Baracs: szakadópart. Beloianisz: a magaspart bevágásában, É-i lejtőn. Belsőbáránd: Ebvár. Bölcske: Ürge-völgy. Dunaföldvár: Felső Öreg-hegy; Alsó-Új-hegy. Dunaújváros: papírgyár alatti magaspart. Igarvámszőlőhegy-Dádpusztá: Drótos-hegy. Kisapostag: magaspart. Kisláng: a soponyai út mentén. Kulcs: magaspart. Ozora: a műút feletti, Sióra néző oldalon. Mezőszilas-Halompusztá: ozorai út melletti tölgyes. Paks: téglagyár; halászcserda fölötti orom. Pátka: Tikmony-völgy. Sárbogárd: Bolondvári-völgy.
- Stipa pennata* L.: Adony: Nyugati-völgy; szőlőhegy É-i vége. Beloianisz: a magaspart bevágásában, É-i lejtőn. Belsőbáránd: Kazalos-völgy; Háromág-völgy. Dég: Aligvári-völgy. Előszállás: Fördös oldalában. Igar: Nagyvölgy. Seregélyes: Rác-völgy. Székesfehérvár: Aszal-völgy. Dég: Hódos-erdő (KITAIBEL IF).
- Stipa pulcherrima* Koch: Belsőbáránd: Ebvártól keletre szórványos. Dunaföldvár: Gyűrűs-völgy (helyenként állományalkotó). Kulcs: magaspart. Lajoskomárom-Külsősáripusztá: a Sári-völgy keleti ágában helyenként állományalkotó. Azonos élőhelyen a *S. joannis*-nál kb. két héttel később virágzik.

### Összefoglalás

E dolgozatban a Mezőföld löszterületén előforduló 196 növényfajról szolgáltatunk előfordulási adatokat. A területre nézve új fajok száma csupán négy, ami a Mezőföld flórájának viszonylag jó feltártságát jelezheti. Ugyanakkor számos olyan növényföldrajzi vagy természetvédelmi szempontból jelentős adatot is közreadtunk, amelyek korábban nem voltak ismertek. A ritka és veszélyeztetett, továbbá védelem alatt álló fajokra vonatkozóan nagy számban közöltünk újabb előfordulási helyeket. A védett fajok közül több mint negyven faj esetében találtunk új, eddig ismeretlen állományokat. Ez hozzájárul e fajok elterjedésének minden eddiginél pontosabb megajzolásához, elősegíti veszélyeztetettségük mértékének felülvizsgálatát és az esetleg szükséges természetvédelmi stratégia megalapozását. Ez különösen azon fajok esetében lényeges, melyeknek eddig csupán egy vagy néhány – és általában igen sérülékeny – állománya volt csak ismeretes.

Sikerült minden eddiginél pontosabb képet kapni több jellemző sztyeppfaj mezőföldi elterjedéséről. Ezek közül különösen jelentős a borzas macskamenta (*Nepeta parviflora* M. B.) újabb lelőhelye Előszállásnál, a csikófark (*Ephedra distachya* L.) dunaföldvári termőhelyének megerősítése, a csinos árvalányhaj (*Stipa pulcherrima* Koch) további három lelőhelye Kulcsnál, Lajoskomáromnál és Belsőbáránánál. Ezek az adatok megerősítik a Mezőföld növényföldrajzi kapcsolatát az erdélyi Mezőséggel és a kelet-európai zonális sztyepekkel, és igazolják a holocén korábbi szakaszaiban valódi sztyepek itteni jelenlétét. A *Bassia sedoides* egykori előfordulása Százhalombattánál (TAUSCHER Gyula gyűjtése az 1870-es évekből) ugyancsak figyelemre méltó. E faj eddig csak a Dunától keletre volt ismert az Alföldön, bár MENYHÁRTH (1877), BORBÁS (1900) majd – feltehetőleg ezek nyomán – SIMON (1992, 2000) a Mezőföldről is jelzi. Felméréseink további hozadéka néhány olyan pusztai tölgyes állomány „felfedezése”, melyek faji összetételük és méretük alapján is kiemelkedő tudományos értéket képviselnek.

#### Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozunk a Magyar Természettudományi Múzeumnak és munkatársainak, hogy ottani munkánkat lehetővé tették és támogatták. A munka elkészítéséhez hozzájárult az OTKA F 48785 pályázat támogatása is.

#### Summary

Data to the flora of the loess-covered plateau of Mezőföld.

G. LENDVAI – A. HORVÁTH

We compiled the known localities of 200 uncommon vascular plant species occurring on the loess plateau of the area between the Danube and the Lake Balaton (Mezőföld). The species names are followed by the names of the township and geographic locations where the species have been recorded or collected. In addition to the current positions (underlined), old records (from literature and herbaria) are also listed.

We recovered several new occurrences of many infrequent, rare or threatened species. Four species have not been previously reported for the region. In terms of their phytogeographical significance, the new positions of regionally rare species (*Ephedra distachya*, *Nepeta parviflora*, *Stipa pulcherrima*) characterising East-European steppes are of particular importance.

#### Irodalom

- BAUER N. – SOMLYAY L. (2007): *Sisymbrium polymorphum* (Murr.) Roth és más florisztikai adatok a Nyugat-Mezőföldről. – *Kitaibelia* **12**: 52–55.
- BORBÁS V. (1900): A Balaton tavának és partmellékének növényföldrajza és edényes növényzete. A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei. pp. 432.
- BOROS Á. (1959): A Mezőföld növényföldrajza. In: ÁDÁM L. – MAROSI S. – SZILÁRD J. (szerk.): A Mezőföld természeti földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp.: 365–383.
- BÖLÖNI J. (1997): Madárpirs (*Cotoneaster*) fajok Magyarországon. – *Kitaibelia* **2**: 174–176.
- FARKAS S. (1994): Bölske község határának természetes növénytakarója, florisztikai értékei. In: SZABÓ G. (szerk.): Bölskei tanulmányok 1. Múlt és jelen Bölskén. – Bölske. pp.: 37–54.
- FARKAS S. (szerk.) (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
- FARKAS S. – KUN A. (1998): A *Spirea media* Fr. Schm. a tolnai Mezőföldön (Colocense). – *Kitaibelia* **3**: 317.
- GOMBOCZ E. (szerk.) (1945): Diaria Itinerum Pauli Kitaibelii III. – Természettudományi Múzeum, Budapest.
- HORVÁTH A. (1998): A mezőföldi fátlan löszvegetáció florisztikai és cönológiai jellemzése. – *Kitaibelia* **3**: 91–94.
- HORVÁTH A. (2002): A mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése. – Scientia Kiadó, Budapest.
- KEVEY B. (2004): Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei. – *Kitaibelia* **9**: 67–83.
- LENDVAI G. (1993): Régi-új elem a magyar flórában: a borzas macskamenta (*Nepeta parviflora* M. Bieb.). – *Bot. Közlem.* **80**: 99102.
- LENDVAI G. – HORVÁTH A. (1994): Adatok a Mezőföld löszflórájához. – *Bot. Közlem.* **81**: 9–12.
- LŐKÖS L. (szerk.) 2001: Diaria itinerum Pauli Kitaibelii III. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.
- MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA Cs. – VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. – Községi Tanács; Dég. pp. 6377.
- MENYHÁRTH L. (1877): Kalocsa vidékének növénytenyésztete. – Budapest.
- SIMON T. (1992): A Magyarországi edényes flóra határozója. 1. kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

- SIMON T. (2000): A Magyarországi edényes flóra határozója. 2. kiadás. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
- SONNEVEND I. (2001): Tatárjuharos lösztölgyes maradványok a Nyugat-Mezőföldön (előzetes közlemény). – Kitaibelia 6: 377380.
- SOÓ R. – JÁVORKA S. (1951): A magyar növényvilág kézikönyve. – Akadémiai Kiadó, Budapest.
- SZERÉNYI J. (2000): Adatok az Észak-Mezőföld löszflórájához. – Kitaibelia 5: 249270.
- VOIGT W. – FARKAS S. (1996): A paksi határ növényvilága. – Paks Város Önkormányzata, Paks.
- ZÓLYOMI B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. In: PÉCSI M. (szerk.): Budapest természeti képe. – Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 509642.
- ZÓLYOMI mscr.: *Salvia (nutantis-nemorosae) - Festucetum sulcatae* cönológiai tabella (Dunántúl és Pest megye). – Kézirat, Vácrátót.