

# Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége flórájához

STETÁK Dóra

MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás, H-2131 Göd, Jávorka S. u. 14., E-mail: tatardora@hotmail.com

## Bevezetés

A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége a Tolnai-Sárköz keleti felén található (a Duna 1498 - 1468 fkm között), a Szigetköz után Magyarország második legnagyobb hullámtere. A terület 1977 óta védett, a nemzeti park 1996-ban alakult meg. A Magyar Dunakutató Állomás 1995 óta folytat itt hidrobiológiai kutatásokat, ennek része a terület flórájának és vegetációjának vizsgálata is.

A DDNP Gemenci Tájegysége florisztikailag a pannóniai flóratartomány (*Pannonicum*) alföldi flóraidékének (*Eupannonicum*) Mezőföld és Solti-sík flórajárásához (*Colocense*) tartozik.

## Anyag és módszer

Munkám során összegyűjtöttem a területre vonatkozó, nyomtatásban vagy kéziratban megjelent florisztikai adatokat és herbáriumi adatokkal (MTM Növénytár Herbarium Carpato-Pannonicum; az áttekintés még nem teljes) ill. saját megfigyeléseimmel egészítettem ki. BARTAL (1910) és HOLLÓS (1911) dolgozatából a mai védett területen kívül eső sárközi adatokat is felvettem, mert nem sokkal e munkák írása előtt még az egész Tolnai-Sárköz vízjárta ártér volt, ezért feltételeztem, hogy flórája a mainál egységesebb lehetett, azaz a mai védett területen is megvolt a felsorolt növényfajok nagy része. A talán hosszúnak tűnő felsorolást indokolja, hogy a fajok ötöde eddig csak kéziratból (BALANYI 1956, 1957, 1958a, 1959, 1960, KÁRPÁTI 1957, JEANPLONG 1975, RADEMAKERS 1992), 9 faj pedig herbáriumból volt ismert. JEANPLONG (1975) munkájában gyakran idéz korábbi szerzőket, nevét itt csak akkor vettem fel, ha ő maga is látta az adott fajt. Ahol a név és évszám előtt nem szerepel lelőhely, ott azt az idézett munkából nem lehetett egyértelműen megállapítani.

„\*„ jelöli a Gemenci Tájegységre új fajokat, „!”, ha az adott lelőhelyen a növényt én is megfigyeltem. A herbáriumi adatok jele „Exs.”, minden adat a budapesti Növénytár herbáriumából [BP] származik, ezért ezt külön nem jelöltem. A ritkább fajok lelőhelyeit erdőrésztlet-szinten feltüntettem, az erdőrésztlet száma {kapcsos zárójelben} van. A használt térképek jegyzékét ld. az irodalomjegyzék után. A dolgozatban szereplő lelőhelyek az alábbi településekhez tartoznak (a védett területen kívülieket [szögletes zárójel], az árvízvédelmi töltésen kívülieket *dőlt betű* jelzi):

### Bács-Kiskun megye

#### Baja

Alsó-Pörbölly  
Arany-tó  
Baizsinzsa-tó  
Báli-tó  
Cserta  
Cserta-Duna  
Csörösz  
[Dunafüred]  
Felső-Pörbölly  
Hosszú-Dzsindzsa-fok  
Kádár-Duna  
Kádár-sziget  
Káposztás-Duna  
Kecske-fok  
Kerek-tó  
Kerülő-Duna  
Kis-Báli-tó  
Kis-Rezét

Kis-Rezéti- (Fás-) Duna  
Koppány (sziget)  
Koppány-zátony  
Közép-Pörbölly  
Móric-Duna  
Nagy-Pandúr  
Nagy-Rezét  
Ó-Falu-tava  
Öreg-Bundás  
Pál-tanya (sziget a Dunán)  
Pandúr-sziget  
[Peterdi-tó]  
[Petőfi-sziget]  
Pörböllyi-erdő  
Rezéti-Duna  
Sárkány-fok  
Simon-Duna  
Simon-sziget  
Szeremlei-Duna vagy  
Sugovica

Szeremlei-Vén-Duna (a  
Pandúr-szg.-en)  
Szúnyog-sziget  
Vén- vagy Koppány-Duna  
Zsold-kaszáló

#### Érsekcsanád

Rezéti-Duna  
[Vajas-fok vagy Vajas-  
Duna]  
Veránka (sziget)

#### Sükösd

[Vajas-fok]  
Vajastorok

#### Tolna megye

#### Alsónyék

Kerülő-Duna  
Pörbölly-Sugó

#### Báta

Bátai-Duna  
Címer-fok

Gyűrűsalj	Keszeges-tó	Borz-fok
Nyéki-Holt-Duna	Kis-Lídia-tó	Fekete-erdő
Pörböly-Sugó	Lassi	Forgó-tó
<i>Pusztaré</i>	Lídiák	Gemenc
<b>Bogyiszló</b>	Malomtelelő	Grébeci-Duna
<i>Góga</i>	Nagy-Lídia-tó	Keselyűs
<b>Decs</b>	Szomfova	Kis-Gemenc
Buvat	Visszafolyó-csatorna	Makkospart
Csíplek-tó	Zátonytava	Sárosalja
Decsi-Kis-Holt-Duna	<b>Öcsény</b>	Sulymos-tó
Decsi-Nagy-Holt-Duna	Alsó-Gemenc	<b>Szekszárd</b>
Felső-Lassi-tó	Báló-tó	[ <i>Vám-erdő</i> ]
<i>Gyöngyös-oldal</i>	Bárányfok	
<i>Keskeny-oldal</i>	Borrév	

Az idézett szerzők és adatközlők nevének rövidítései:

BK — BARTAL Károly	KGy — KOHÁRI György
BL — BALANYI László	MZs — MOLNÁR Zsolt
HL — HOLLÓS László	RAD. — J. G. M. RADEMAKERS
JJ — JEANPLONG József	SD, TD — STETÁK (TATÁR) Dóra
KI — KÁRPÁTI István	TT — TOBISCH Tamás

További rövidítések:

csat. — csatorna	m. — mellett, melletti
e. — erdő	szg. — sziget

A cönotaxonok megnevezésekor BORHIDI (1996), a növénynevek tekintetében HORVÁTH et al. (1995), BORHIDI (1998) és néhány esetben ROTHMALER (1988) munkáját követtem. A növényfajokat ABC-rendben közlöm, a régi nevek helyett a ma érvényes nevek szerepelnek. A növényfajok elterjedésének megállapításához a Növényhatározót (SIMON 1992) és a Hínárhatározót (FELFÖLDY 1990) használtam.

#### A vizsgált terület vegetációja

A Gemenci Tájegység természetes növényzetét egykor jórészt bokorfűzesek (*Rumici crispi* – *Salicetum purpureae*, *Polygono hydropiperi* – *Salicetum triandrae*), fűz- és nyárligetek (*Leucojo aestivi* – *Salicetum albae*, *Carduo crispi* – *Populetum nigrae*, *Senecio sarracenic* – *Populetum albae*), tölgy-köris-szil ligeterdők (*Scillo vindobonensi* – *Ulmum*), a legmagasabban fekvő területeken pedig feltehetően gyertyános tölgyesek (*Carpesio abrotanoidis* – *Carpinetum*, TÓTH 1958, KEVEY – TÓTH 1992) alkották, ezek helyén ma gyakran ültetvényeket találunk (nemesnyár, fekete dió, amerikai köris, stb.). Emellett a hosszú időn át víz alatt álló mélyedésekben, egykori medrekben mindig jelen voltak a vízi és mocsári növényzet képviselői, a mellék- és holtágakat pedig gyakran teljesen beborítják a különböző hínárfajok. Jellemző társulások a mocsaras helyeken a harmatkásások (*Glycerietum maximae*), nádasok (*Phragmitetum australis*), magassásosok (*Caricetum gracilis*), valamivel magasabb térszint foglalnak el a kisebb, de nagyon különböző fajösszetételű pántlikafű-állományok (*Carici gracilis* – *Phalaridetum*?), a legmagasabban fekvő fátlan vegetációtípust pedig a múltban az erdők helyén irtással létrehozott ecsetpázsitos mocsárrétek (*Carici* – *Alopecuretum pratensis*) képviselik, ezeknek megkülönböztethető egy nedvesebb és egy "szárazabb", egyúttal kissé gyomosabb típusa. A hosszú időre és/vagy gyakran víz alá kerülő ún. laposok, régi medrek növényzete mutatja időben a legváltozatosabb képet: vízborítás esetén hínárok jelennek meg bennük (általában gyökerező, alámerült fajok, pl. *Potamogeton*-ok), a kiszáradás során/után pedig egymást követik, ill. egymással keveredve jelennek meg a *Nanocyperion*-, *Bidentetea*- és *Agropyro-Rumicion*-fajok. Mindez akár egy év alatt is lejátszódhat, de ha a következő évben elmarad az áradás, megint újabb fajok válnak uralkodóvá; ezeket a területeket neveztem röviden „kiszáradó helyek”-nek.

## Florisztikai adatok

- Acer campestre* L.: Dunamelléki erdő (BK 1910); Keselyűs (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957), Pörböly-Sugó, Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957); Báránfyok, Gemenc, Keselyűs, Pandúr-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1998 TD)
- Acer negundo* L.: a védgát m. (HL 1911); Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Nagy-Rezét (KI 1957); Báránfyok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyöngyös-oldal, Kis-Rezét, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Buvat, Cserta, Fekete-e., Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), közönséges; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Acer platanoides* L.: Pusztarét (BL 1959)
- \**Acer saccharinum* L.: Kádár-szg. zátonyán, szubszpontán (1997 TD)
- Acer tataricum* L.: Pörböly-Sugó (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Felső-Pörböly, Simon-szg., Szomfova (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Cserta, Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Achillea collina* J. BECKER: dunamelléki erdő (BK 1910); gemenci út (HL 1911); Buvat, Fekete-e., Gyöngyös-oldal, Koppány (TI 1958)
- Achillea millefolium* L.: Báli-tó (BL 1957); Pörbölyi-e., Nagy-Rezét (KI 1957); Nagy-Rezét (1999 SD)
- Acorus calamus* L.: Gemenc: a Sió-toroktól délre (BL 1959); Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Exs.: Keselyűs (1952. VII. 18. JÁVORKA); a két öcsényi adat feltehetően ugyanarra a lelőhelyre vonatkozik, RADEMAKERS megfigyelését kétlem
- Adonis aestivalis* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Aegopodium podagraria* L.: Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957); Veránka, Keselyűs, "üde, rendkívül magas területeken" (TI 1958)
- Aethusa cynapium* L.: Gemenc (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957); Kádár-szg., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1998 TD)
- (*Agropyron* → *Elymus*)
- Agrostis stolonifera* L.: Báli-tó (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét (KI 1957); TI 1958; JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Öreg-Bundás, Zsold-kaszáló (1997 TD), Csíplek-tó, Kis-Rezét, Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Csörösz, Ó-Falu-tava, Pandúr-szg., Szeremlei-Vén-Duna (1999 SD), nyiladékokon is; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Ailanthus altissima* (MILL.) SWINGLE: Veránka (1999 FELSŐ ex verb.), Buvat (1999 SD)
- Ajuga genevensis* L.: Pusztarét (BL 1959)
- Ajuga reptans* L.: Pörbölyi-e. (KI 1957); Pörböly-Sugó (BL 1959)
- Alisma gramineum* C. C. GMEL.: a gemenci úton (HL 1911)
- Alisma lanceolatum* WITH.: a gemenci úton gyakori (HL 1911); Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957); Pandúr-szg. (TI 1958); Koppány-zátony, Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992)
- Alisma plantago-aquatica* L.: Koppány, Kis-Rezét (KI 1957); JJ 1975; Pandúr-szg. (1999 SD)
- Alliaria petiolata* (M. B.) CAVARA et GRANDE: Nagy-Pandúr, Felső-Pörböly (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Gemenc, Gyűrűsalj, Pandúr-szg., Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Pörbölyi-e. (1996 TD), Pandúr-szg., Simon-Duna (1998 TD)
- Allium angulosum* L.: Bába: nedves réteken (HL 1911); Cserta, Gyűrűsalj, Veránka (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Zsold-kaszáló (1999 SD)
- Allium scorodoprasum* L.: Pandúr-szg.: erdőszélen (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), árvízvédelmi töltésen Nagy-Rezét m. (1999 SD), mocsárréten
- Alnus glutinosa* (L.) GAERTN.: Duna mentén, Pörböly (HL 1911); Báli-tó (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Koppány (KI 1957); Sárosalja (TI 1958); Pörbölyi-e. {Baja 75B} (1999 SZARVAS ex verb.)
- Alnus incana* (L.) MÖNCH: Baja: Cserta (TI 1958); "a Duna árterén Baján túl leereszkedik" (BOROS 1970)
- Alopecurus aequalis* SOBOL.: Koppány (KI 1957); TI 1958; JJ 1975; Báli-tó (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Báló-tó, Kecse-fok, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), időszakosan vízzel borított helyeken
- Alopecurus geniculatus* L.: "mocsárréteken, vízpartokon szórványos" (JJ 1975)
- Alopecurus pratensis* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét,

- Veránka (KI 1957); Báránfyok, Cserta, Gyűrűsalj, Gemenc, Koppány, Sárosalja, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Kis-Rezét, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsártereken állományalkotó
- Althaea officinalis* L.: Szekszárd: vám, védgát (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); JJ 1975; Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1998 TD)
- \**Amaranthus blitum* L.: Kádár-szg. zátonyán (1997 TD), Csörösz: kiszáradt mederfenéken, Lassi (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD), valószínűleg még egyéb helyeken is előfordul
- \**Amaranthus retroflexus* L.: Pandúr-szg. (1998 TD)
- \**Ambrosia artemisiifolia* L.: Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Báli-tó, Pandúr-szg. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Amorpha fruticosa* L.: Nagy-Pandúr, Felső-Pörböly (BL 1957); Buvat, Koppány (TI 1958); "ültetik és elvadul a Duna menti ártéren" (JJ 1975); Koppány-zátony, Kádár-szg. (RAD. 1992); Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), erdőszéleken, nyári gáton helyenként gyakori, terjedőben; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Anagallis arvensis* L.: BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert; Pandúr-szg.: vadföldön, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), bolygatott helyeken; Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Anchusa azurea* MILL.: gemenci út (HL 1911)
- Anchusa officinalis* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957)
- Anemone ranunculoides* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Keskeny-oldal {Decs 61A} (1997 KALOCSA ex verb.), Gemenc {Őcsény 40D} (1999 KALOCSA ex verb.); Pandúr-szg. {Baja 124H} (1999 MÓROCS ex verb.)
- Angelica sylvestris* L.: Szekszárd: védgát, Pörböly (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Koppány, Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Pörbölyi-erdőben több helyen (1998 TD)
- Anthemis austriaca* JACQ.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Anthemis cotula* L.: Kis-Rezét (BL 1957)
- Anthriscus cerefolium* (L.) HOFFM.: Gemenc (TI 1958); JJ 1975; Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Anthriscus sylvestris* (L.) HOFFM.: Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957)
- Arabis auriculata* LAM.: Szomfova (TI 1958)
- Arabis hirsuta* (L.) SCOP.: Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957); Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Pörbölyi-e.: a Kecse-fok m. réten {Baja 75TI3} (1997. V. 26. TATÁR)
- Arctium lappa* L.: Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Arctium minus* (HILL.) BERNH.: gemenci út, Őcsény (HL 1911); Cserta, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); Pandúr-szg. (JJ 1975)
- Arctium tomentosum* MILL.: Gemenc (BL 1959)
- Arenaria serpyllifolia* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: védgát (HL 1911); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Aristolochia clematitis* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (BL 1957), BL 1958a, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Báránfyok, Buvat, Cserta, Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét, Pandúr-szg. (1997 TD)
- Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. PRESL.: Pusztarét (BL 1959); árvízvédelmi töltésen (1999 SD)
- \**Artemisia annua* L.: Pandúr-szg. (1997 TD)
- Artemisia campestris* L.: Bátán a védgáton (HL 1911)
- Artemisia vulgaris* L.: Szekszárd: gemenci út, Őcsény (HL 1911); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Koppány-zátony, Pál-tanya (RAD. 1992)
- Arum maculatum* L.: "a Dunamenti erdőkben" (JJ 1975)
- Asclepias syriaca* L.: BL 1957; Koppány, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg., Kecse-fok m. rét, Pandúr-szg., Zsold-kaszáló (1997 TD), Pörbölyi-e., Lídiák, Malomtelelő (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), nemesnyarasokban, árvízvédelmi töltéseken, erdőszéleken helyenként tömeges
- Asparagus officinalis* L.: gemenci út (HL 1911); Koppány (KI 1957); Gyűrűsalj (TI 1958); fiatal telepített fűzesben a Nyéki-Holt-Duna m. {Báta 12C} (1998 TD), Pörbölyi-e. {93B vagy F m. a nyiladékon} (1999 SD)
- Aster ericoides* L.: Közép-Pörböly (BL 1956)

- Aster tradescantii* L.: Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992)
- Aster × lanceolatus* WILLD.: Fekete-e., Buvat (TI 1958); az észak-amerikai eredetű adventív őszirózsák főleg a nemesnyarasokban gyakoriak
- Astragalus cicer* L.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Astragalus glycyphyllos* L.: Szekszárd: vám (HL 1911); Fekete-e. (TI 1958)
- Athyrium filix-femina* (L.) ROTH: Közép-Pörböly (BL 1960)
- Atriplex prostrata* BOUCHER: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Azolla filiculoides* LAM.: Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (FEHÉR - SCHMIDT 1998); Cserta-Duna, Szeremlei-Duna (1998 TD), terjedőben lévő adventív vízinövény; Dunafalva: Bezerédy-Duna (1999 TAMÁS ex verb.); Exs.: Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (1998. VII. 14. STETÁK)
- Ballota nigra* L.: Góga (TI 1958); JJ 1975; Pandúr-szg. (1997 TD)
- Barbarea stricta* ANDRZ.: Nagy-Pandúr (BL 1957); Pörbölyi-e., Cserta (KI 1957); Nyéki-Holt-Duna m. mocsárrét (1996 TD), Pörbölyi-e., Visszafolyócsat. m. (1998 TD)
- Barbarea vulgaris* R. BR.: Gemenc (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957)
- Bassia scoparia* (L.) VOSS: Öcsény (HL 1911)
- Batrachium aquatile* (L.) DUM.: Gemenc: a Siótoroktól délre (BL 1959)
- Batrachium circinatum* (SIBTH.) SPACH: Vajas-fok (BL 1960); Decsi-Kis-Holt-Duna, Szeremlei-Duna (1997 TD), Csörösz (1999 SD); Exs.: Nyéki-Holt-Duna (1997. VI. 2. TATÁR)
- \**Batrachium rionii* LAGGER: Buvat: keréknyomban, Csíplek-tó, Kis-Rezét {Baja 35TN2}, Malomtelelő, Móric-Duna öble, Nyéki-Holt-Duna, Sulymos-tó (1998 TD), feltehetően máshol is
- Batrachium trichophyllum* (CHAIX) VAN DEN BOSCH: Keselyűs közelében a mocsarakban (BK 1910); gemenci út (HL 1911); Kerülő-Duna (BL 1959); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. keréknyomban (1998 TD); Exs.: Szeremlei-Vén-Duna (1997. V. 23. TATÁR)
- Berula erecta* (HUDS.) COVILLE: Pörbölyi-e. (KI 1957)
- Betula pendula* ROTH: Veránka (BL 1957)
- Bidens frondosus* L.: Koppány, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Lassi, Szeremlei-Duna Baja felőli, mocsaras vége (1998 TD), bizonyára máshol is; Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Bidens tripartita* L.: gemenci úton, a vám körül (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956); Koppány, Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-Duna, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Baizsinza-tó, Bálótó, Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Csörösz, Kecse-fok, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Duna (1998 TD)
- \**Blackstonia acuminata* (KOCH et ZIZ) DOM.: Szeremle: egykori kubikgödör, több száz példány {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- \**Bolboschoenus maritimus* (L.) PALLA: Báli-tó (1996 TD), Forgó-tó m. (1997 TD), Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Kádár-Duna zátonysziget (rizóma, 1957. VII. 11. JÁVORKA, KÁRPÁTI I., CSAPODY)
- Brachypodium sylvaticum* (HUDS.) R. et SCH.: Közép-Pörböly (BL 1956), Felső-Pörböly, Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Pörböly-Sugó, Sárosalja, Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Brassica juncea* (L.) CZERN.: Kecse-fok m. réten {Baja 75TI3} (1997 TD)
- Brassica nigra* (L.) KOCH: Koppány (KI 1957)
- Bromus benekenii* (LANGE) TRIMEN: Cserta (KI 1957)
- Bromus commutatus* SCHRAD.: Cserta, Nyéki-Holt-Duna m., Visszafolyócsat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Pörbölyi-e. (1948. VII. 20. KÁRPÁTI I.), Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Bromus hordeaceus* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Gemenc, Pusztarét (BL 1959); Cserta (KI 1957); Buvat, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD)
- \**Bromus inermis* LEYSS.: árvízvédelmi töltésen (1999 SD)
- Bromus ramosus* HUDS.: Buvat (TI 1958); Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Bromus secalinus* L.: Gemenc (HL 1911)
- Bromus sterilis* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr, Felső-Pörböly (BL 1957); Góga (TI 1958); árvízvédelmi töltésen (1999 SD)
- Bromus tectorum* L.: dunamelléki erdő (BK 1910)

- Bryonia alba* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Szekszárd: gemenci út (HL 1911)
- Bryonia dioica* JACQ.: Koppány-zátony (RAD. 1992); valószínűleg téves határozás
- Bupleurum tenuissimum* L.: Gemenc (HL 1911)
- Butomus umbellatus* L.: a vám körül, gemenci úton, védgát m., Őcsény (HL 1911); Pörbölyi-e. (BL 1957); Báli-tó, Cserta (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kis-Rezét, Möríc-Duna, Szeremlei-Duna (1998 TD), Nagy-Rezét, Ó-Falu-tava, Zsold-kaszáló (1999 SD), mocsaras helyeken, nem gyakori
- \**Cabomba caroliniana* A. GRAY: Vajas-torok, a Duna bal partja mentén a Vajas-toroktól legalább Dunafalváig, uszadék, talán a Vajas-Dunából (1999 SD)
- Calamagrostis epigeios* (L.) ROTH: dunamelléki erdő (BK 1910); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Fekete-e., Gyöngyös-oldal, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Pandúr-szg. (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Calendula officinalis* L.: elvadult a gemenci úton is (HL 1911)
- \**Callitriche cophocarpa* SENDTN.: Csörösz, Pörbölyi-e.: keréknyomban (1999 SD); Exs.: Nyéki-Holt-Duna (1999. VII. 11. STETÁK)
- \**Callitriche palustris* L.: Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Caltha palustris* L.: BK 1910; Pandúr-szg. (BL 1957), Gyűrűsalj (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957); Alsó-Pörböly, Gyűrűsalj (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), nádasokban, magassásosokban, nem gyakori
- Calystegia sepium* (L.) R. BR.: a mélysfokon, Sárvíz mente, vám, védgát (HL 1911); Felső-Pörböly (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Keselyűs (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg., Kecse-fok m. rét (1997 TD)
- Cannabis sativa* L.: "ártéri erdőkben, gyomtársulásokban közönséges" (JJ 1975); Pandúr-szg. (1997 TD), egyáltalán nem közönséges
- Capsella bursa-pastoris* (L.) MEDIK.: BK 1910; Gemenc (BL 1959); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét (1997 TD), Kecse-fok (1998 TD)
- Cardamine impatiens* L.: Gemenc (BL 1959); Gemenc (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. (1997. V. 22. TATÁR)
- Cardamine parviflora* L.: Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Decsi-Nagy-Holt-Duna közelében harmatkásásban (1997 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna m., Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő (1998 TD); Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. (1997. VI. 10. TATÁR)
- Cardamine pratensis* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Gemenc (BL 1959); Koppány (KI 1957); Koppány (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- Cardamine pratensis* ssp. *dentata* (SCHULT.) CELAK.: Gemenc, Gyűrűsalj (BL 1959)
- Carduus acanthoides* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT), vágásterületeken gyakori; Exs.: Pörbölyi-erdő (1998. XI. 21. TATÁR)
- Carduus nutans* L.: Szekszárd: vám (HL 1911); Pörbölyi-e. (KI 1957)
- Carex acuta* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Pörbölyi-e., Vén-Duna m., Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Cserta (KI 1957); Báli-tó, Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Szúnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; közönséges, holtágak partján, időszakosan vízzel borított helyeken társuláskötő, mocsártereken is gyakori
- Carex acutiformis* EHRH.: gemenci út (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a; Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Gemenc (TI 1958); Szeremlei-Duna (KÁRPÁTI V. 1963); JJ 1975
- Carex brizoides* L.: Koppány (KI 1957)
- \**Carex cuprina* (SÁNDOR) NENDTVICH: Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Szeremlei-Duna (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Carex distans* L.: gemenci út, Őcsény (HL 1911)
- Carex divisa* HUDS.: Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a; Dunafüredő (JJ 1975)
- Carex divulsa* STOKES: Felső-Pörböly, Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1958a), Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Cserta, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pusztarét (1996 TD), Nyéki-Holt-Duna m., Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Carex elata* ALL.: Pandúr-szg.: holtágak m. (JJ 1975)
- Carex flacca* SCHREB.: Gemenc: a Sió-toroktól délre (BL 1959)

- Carex hirta* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); gemenci út (HL 1911); Nagy-Pandúr, Felső-Pörböly (BL 1957), Gemenc (BL 1958a), Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Pörbölyi-e. (KI 1957); Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét, Pandúr-szg. (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Carex muricata* agg. L.: Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Cserta, Fekete-erdő, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Sárosalja (TI 1958)
- Carex nigra* (L.) REICHHARD: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben, Sárvíz m. a híd közelében (BK 1910)
- Carex pairae* F. SCHULTZ: Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- Carex praecox* SCHREB.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben, dunamelléki erdő (BK 1910); BL 1958a; Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), "szárazabb" típusú esetpázsitos mocsárréteken
- Carex remota* JULS.: Felső-Pörböly, Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1958a), BL 1958b, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Simon-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Pörbölyi-e. (1998. VII. 2. TATÁR), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Carex riparia* CURT.: Báli-tó (BL 1957), BL 1958a; Bányfok, Cserta, Fekete-e., Koppány, Sárosalja, Szomfova (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna m., Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Lassi, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Kis-Rezét, Lidiák, Malomtelelő, Móric-Duna öble, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), állandó (holtágak), ritkábban időszakos vizek partján, mocsárréteken; Exs.: Nyéki-Holt-Duna (1998. V. 25. TATÁR)
- Carex spicata* HUDS.: Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Carex stenophylla* WAHLBG.: Pandúr-szg.: gyepekben (JJ 1975)
- Carex strigosa* HUDS.: Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957, 1958b), BL 1958a, Veránka, Gemenc (BL 1958b); Gemenc, Keselyűs, Pandúr-szg., Veránka (TI 1958); Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD), keményfaligetekben, de telepített amerikai körtesekben is, gyakran az erdei utakon; Exs.: Pörbölyi-e. (1957. V. 15. TÓTH, 1957. VI. 16. BALANYI, 1957. VII. 11. TÓTH, JÁVORKA, KÁRPÁTI I., CSAPODY)
- Carex sylvatica* HUDS.: Felső-Pörböly, Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, 1958b, Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bányfok, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Pusztarét (1996 TD), Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1997 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Carex tomentosa* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Pörböly-Sugó, Pusztarét (BL 1959); Cserta, Gyöngyös-oldal (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Cserta (1998 TD), "szárazabb" típusú esetpázsitos mocsárréteken
- Carex vesicaria* L.: Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Alsó-Pörböly, Bányfok, Cserta, Fekete-e., Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Szűnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m., Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Fekete-e., Kis-Rezét, Lassi, Lidiák, Malomtelelő, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), magassásosban; Exs.: Decsi-Kis-Holt-Duna (1998. V. 28. TATÁR)
- Carex vulpina* L.: dunamelléki erdő, Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Pörbölyi-e. (KI 1957); Pusztarét (BL 1959)
- Carpesium abrotanoides* L.: Kis-Rezét (BL 1957); Koppány (KI 1957); Pörbölyi-e. (KÁRPÁTI ap. SOÓ – BORSOS 1957); Bányfok, Fekete-e., Gemenc, Góga, Kis-Rezét, Szomfova (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg., Pusztarét (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD), keményfaligetekben, de telepített fekete dióban és vágásokban is, gyakran az erdei utakon
- Carpesium cernuum* L.: BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem

- ismert; Decs: "ármentett árnyas nyiladékokon", Gemenc † 1954 (TI 1958)
- Carpinus betulus* L.: Gyűrűsalj, Szomfova, Gemenc (TI 1958); Decsi-Kis-Holt-Duna m. (ültetett?, 1997 TD); Keskeny-oldal (1997 SZARVAS ex verb.)
- Centaurea jacea* L.: Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg. (RAD. 1992)
- Centaurea amara* L. (= ? *C. jacea* ssp. *amara* (L.) ROTHM.): Gemenc (HL 1911)
- Centaurea pannonica* (HEUFF.) SIMK.: Koppány (TI 1958)
- Centaureum erythrea* RAFN.: tömegesen a védgáton a pörbolyi őrház m. (HL 1911)
- Centaureum littorale* ssp. *uliginosum* (W. et K.) ROTHM.: Szekszárdon a vám körül (HL 1911); BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert
- Centaureum pulchellum* (SW.) DRUCE: Szekszárdon a vámon túl és a vasúti töltés árkaiban tömérdek, Őcsény (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna m., Kecse-fok m. rét (1996 TD), Pörbolyi-e. (1998 TD), napsütötte nyiladékokon; Exs.: Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998. VII. 20. STETÁK)
- Cephalanthera damasonium* (MILL.) DRUCE: Pusztarét (BL 1959); Gemenc (TI 1958); Decsi-Nagy-Holt-Duna közelében (1998 TAMÁS ex verb.)
- Cephalaria pilosa* (L.) GREIN. et GODR.: a védgát mentén: Szekszárd, Báta, Pörboly (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbolyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Fekete-e., Gemenc, Góga, Keselyűs, Kis-Rezét, Pörboly-Sugó, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), leggyakrabban nemesnyarasokban
- Cephalaria transsylvanica* (L.) SCHRAD.: Őcsény (HL 1911)
- Cerastium fontanum* ssp. *triviale* (LINK) JALAS: Gyűrűsalj (BL 1959); Nagy-Rezét (1999 SD)
- Ceratophyllum demersum* L.: a vám m. Szekszárdon (HL 1911); Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (BL 1957); Pandúr-szg. (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Forgó-tó, Hosszú-Dzsindza-fok, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Báló-tó, Cserta-Duna, Csíplek-tó, Káposztás-Duna, Kerek-tó, Kis-Rezét, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna, Lídiák, Malomtelelő, Móric-Duna, Peterdi-tó (1998 TD), Batai-Duna, Kádár-Duna (1999 SD), holtágakban közönséges, társuláskötő, sekély vízben és ritkán keréknyomban is; Exs.: Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (1991. IX. 4. FELFÖLDY)
- \**Ceratophyllum submersum* L.: Nyéki-Holt-Duna (1996 TD); Exs.: Csörösz (1999. VIII. 4. STETÁK)
- Cerinthe minor* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét (BL 1959)
- Chaerophyllum temulum* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc, Pusztarét (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörboly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörboly-Sugó, Szomfova (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbolyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Nyéki-Holt-Duna m. erdőben (1997. V. 22. TATÁR)
- Chelidonium majus* L.: Nagy-Pandúr, Felső-Pörboly, Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbolyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Fekete-e., Gemenc, Góga, Keselűs, Kis-Rezét, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Pandúr-szg. (1997 TD)
- Chenopodium album* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e. (KI 1957); Pandúr-szg. (1999 SD), Báli-tó (1998 TD)
- \**Chenopodium ficifolium* SM.: Kecse-fok (1996 TD), Báli-tó, Pandúr-szg. (1997 TD), Sulymos-tó (1998 TD), időszakos vízborítású helyeken száraz években gyakori
- Chenopodium polyspermum* L.: Nyéki-Holt-Duna, Koppány, Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Báli-tó, Baizsinza-tó, Csörösz, Kecse-fok, Malomtelelő, Pörbolyi-e., Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), időszakos vízborítású helyeken száraz években gyakori
- \**Chenopodium rubrum* L.: Kádár-szg. (1997 TD), Kecse-fok, Pörbolyi-e., Sulymos-tó, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), időszakos vízborítású helyeken száraz években
- Chenopodium urticum* L.: "útszéleken, ártereken, parlagokon gyakori" (JJ 1975)
- (*Chlorocyperus* → *Cyperus*)
- Chrysanthemum balsamita* L.: Baja: a Duna árterén (KÁRPÁTI ap. SOÓ - BORSOS 1957)
- (*Chrysanthemum* p. p. → *Leucanthemum*, *Tanacetum*)
- Chrysopogon gryllus* (TORN.) TRIN.: védgát (HL 1911)
- Cichorium intybus* L.: rendkívül sok a védgáton (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- Circaea lutetiana* L.: Borrév (HL 1911); Pörbolyi-e., Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, 1958b, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörboly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörboly-Sugó, Simon-szg., Szomfova,



- Veránka (TI 1958); JJ 1975; Rezáti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Cirsium arvense* (L.) SCOP.: a vám körül (HL 1911); Pörbölyi-e., Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Fekete-e., Gemenc, Gyűrűsalj, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezáti-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), "szárazabb" típusú mocsárrétekre jellemző
- Cirsium brachycephalum* JUR.: Gemenc (HL 1911)
- Cirsium canum* (L.) ALL.: Báli-tó (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Cserta, Koppány (TI 1958)
- Cirsium vulgare* (SAVI) TEN.: Pörbölyi-e., Báli-tó (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Rezáti-Duna m. (RAD. 1992); Kecse-fok m. rét (1997 TD), Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD), vágásterületeken gyakori
- \**Citrullus lanatus* (THUNB.) MANSFELD: Buvat: a Dunapart homokján, Kádár-szg. zátonyán, szubszpontán (1999 SD)
- Clematis integrifolia* L.: Őcsény felé a vasúti töltés mentén és a Sárvíz töltésén (BK 1910); Szekszárd: gemenci út, védgát, vám, Decs (HL 1911); Pusztaréti (BL 1959); Fekete-e. (TI 1958); Veránka {Érsekcsanád 51TI} (1999 SZARVAS ex verb.); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), az árvízvédelmi töltés és a Visszafolyó-csat. között {Decs 41TI2 és TI3} (1998 TD)
- Clematis recta* L.: Szekszárd: gemenci út, védgát, vám (HL 1911); Felső-Pörböly (TI 1958)
- Clematis vitalba* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957); Pörbölyi-e. (KI 1957); Pandúr-szg. (TI 1958); JJ 1975
- Clinopodium vulgare* L.: Buvat, Szomfova (TI 1958); JJ 1975
- Colchicum autumnale* L.: Pörböly-Sugó (BL 1959); Pörbölyi-e. (KI 1957); az árvízvédelmi töltés m. a Zátonytavához közel (1999 SZARVAS ex verb.); Nyéki-Holt-Duna m. mocsárréten, erdőben, nyári gát oldalában (1996 TD), feltehetően máshol is
- Conium maculatum* L.: Szekszárdon a vám körül bőven (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Pörbölyi-e. (KI 1957); Keselyűs, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Pörbölyi-e. (1998 TD)
- \**Consolida regalis* S. F. GRAY: Cserta: erdei úton egy kis otthagott kavicsshalmon (1998 TD)
- Convallaria majalis* L.: Borrév (HL 1911); Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gemenc (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Pandúr-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna m., Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD)
- Convolvulus arvensis* L.: Koppány (TI 1958); Kádár-szg. zátonyán (1997 TD), Cserta, Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Conyza canadensis* (L.) CRONQ: Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bányafok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc (TI 1958); Rezáti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Lassi, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna (1998 TD)
- Cornus mas* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957); Pandúr-szg.: keményfaligetben (JJ 1975)
- Cornus sanguinea* L.: BK 1910; Szekszárd: védgát (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1956, 1957), Felső-Pörböly, Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1958a, 1959), Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Pusztaréti (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bányafok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezáti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); közönséges; Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. ssp. *hungarica* (KÁRP.) SOÓ (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- (*Coronilla varia* → *Securigera* v.)
- \**Coronopus squamatus* (FORSKÁL) ASCH.: Exs.: Pandúr-szg.: Ó-Falu-tava kiszáradt medrében (1998. VII. 19. STETÁK)
- Corylus avellana* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Gemenc, Keselyűs (TI 1958); Pörbölyi-e. (1997 TD)
- Crataegus monogyna* JACQ.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1956, 1957), Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Pusztaréti, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezáti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Crataegus nigra* W. et K.: Pusztaréti (BL 1959); Pörbölyi-e. (KI 1957); Fekete-e. (TI 1958); Kádár-szg., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m., Pusztaréti (1996 TD), Decsi-

- Nagy-Holt-Duna m. (1997 TD), Cserta, Pandúr-szg., Pörbolyi-e. (1998 TD), középmély fekvésben, nem ritka; Exs.: Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (1998. V. 29. TATÁR), Pandúr-szg. (1999. VIII. 6. STETÁK), Pörbolyi-e. (1999. IX. 16., X. 1. STETÁK)
- Crataegus × degenii* ZSÁK: Nagy-Pandúr (BL 1956), BL 1957, Pusztarét (BL 1959); Cserta (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Gemenc, Góga, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); Pörbolyi-e. (1998 TD), az egybibés és a fekete galagonya között sok átmeneti alak figyelhető meg, termésük ± fekete, 2-4 maggal; Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Pandúr-szg. (1999. VIII. 6., IX. 25. STETÁK)
- Crepis capillaris* (L.) WALLR.: Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992)
- Crepis rhoeadifolia* M. B.: Szekszárd: gemenci út, vám, védgát (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957); Pörbolyi-e. (1998 TD)
- Crepis setosa* HALL. f.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Pandúr-szg. (1997 TD)
- Crepis tectorum* L.: Buvat (TI 1958)
- Cruciata laevipes* OPIZ: BL 1958a
- Cruciata pedemontana* (BELL.) EHREND.: Buvat, Fekete-erdő, "ártéri korcserdőkben" (TI 1958)
- Cucubalus baccifer* L.: Szekszárd: gemenci út, védgát (HL 1911); Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Cserta, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörboly-Sugó, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Pörbolyi-e. (1998 TD)
- \**Cucumis sativus* L.: sarkantyúkon a Duna partján, szubszontán (2000 MÓROCZ ex verb.)
- \**Cuscuta australis* R. BR.: Báli-tó kiszáradt medrében, főleg *Persicaria lapathifolia*-n (1998 TD), a Duna-völgyre új; Exs.: Kis-Báli-tó (1998. VII. 8. TATÁR)
- Cuscuta europaea* L.: Kádár-szg. (RAD. 1992)
- Cuscuta lupuliformis* KROCKER: *Lycium*-on a Duna mentén, *Salix* sarjakon és *Rubus*-on a vámhíd m. füzesben, a gemenci úton szintén (HL 1911); Baja: "ártéri erdőkben, szórványos" (JJ 1975)
- \**Cynodon dactylon* (L.) PERS.: Pörbolyi-e. (1998 TD)
- Cyperus fuscus* L.: Gemenc (HL 1911); Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Pörbolyi-e. (1996 TD), Kádár-Duna (1997 TD), Cserta-Duna, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), kiszáradó iszapos vízpartokon közönséges; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Fekete-erdő: Bálótó (1998. VI. 18. TATÁR)
- \**Cyperus glomeratus* TORN in L.: Kádár-szg. zátonyán (1997 TD), Szeremlei-Vén-Duna kiszáradó partján, Pörbolyi-e. időszakosan vízzel borított gyomos tisztásán {Baja 89F}, Szeremlei-Duna Baja felőli végén magassásban (1998 TD), bizonyára máshol is, de ritka; Exs.: Vén-(Koppány-) Duna (1961. X. 23. BOROS)
- Cyperus michelianus* L.: Bátán a védgát m. (HL 1911); Rezáti-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó (1996 TD), Kádár-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Bálótó, Csörösz, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Öreg-Bundás, Sulymos-tó, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), kiszáradó iszapos vízpartokon közönséges; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Vén-(Koppány-) Duna (1961. X. 23. BOROS), Móric-Duna (1998. VII. 2. TATÁR)
- Dactylis glomerata* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Nagy-Pandúr, Felső-Pörboly (BL 1957), BL 1958a, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e. (KI 1957); Buvat, Fekete-e., Góga, Gyöngyös-oldal (TI 1958); JJ 1975; Nagy-Rezét (1999 SD)
- \**Datura stramonium* L.: Kádár-szg., Nagy-Rezét, Pörbolyi-e. (1997 TD), Pandúr-szg. (1999 SD), vágásterületen többfelé
- Daucus carota* L.: Buvat (TI 1958); Báli-tó (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Deschampsia caespitosa* (L.) P. B.: JJ 1975  
(*Dichostylis* → *Cyperus*)
- Dipsacus sylvestris* HUDS.: Pörbolyi-e., Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Pörbolyi-e. (KI 1957); Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét (1997 TD), Pörbolyi-e. (1998 TD)
- \**Dryopteris carthusiana* (VILL.) H. P. FUCHS: Pörbolyi-e. {Baja 91A}, egyetlen tő (1996 VÁRNAGY ex verb.), azóta azt az erdőrezletet kivágták
- Dryopteris filix-mas* (L.) SCHOTT: Gyöngyös-oldal: 2 tő (TI 1958); Nagy-Rezét {Baja 131} (1999 SD)
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. B.: a védgáton (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957); Koppány, Nagy-Rezét, Veránka (KI 1957); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezáti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó (1996 TD), Kádár-Duna, Kecse-fok m. rét, Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna m., Csörösz, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pandúr-szg., Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), kiszáradó helyeken gyakori
- Echinocystis lobata* (MICHX.) TORR.: "Baja, ártéren" (JJ 1975); Kádár-szg. zátonyán, Pandúr-szg. (1997 TD)
- Echium vulgare* L.: Felső-Pörboly (BL 1957)

- Eleocharis acicularis* (L.) R. et SCH.: Bátán a védgát mentén (HL 1911); Gemenc (BL 1959); Fekete-e. (TI 1958); Szeremlei-Duna partján a révnél (1997 TD); Exs.: Kis-Rezét (1998. VI. 17. TATÁR)
- Eleocharis palustris* (L.) R. et SCH.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Kis-Rezét (1998 TD), Csörösz, Nagy-Rezét, Ó-Falu-tava, Pandúr-szg. (1999 SD)
- \**Elodea canadensis* L. C. RICH.: Szeremlei-Duna, legtöbb a révnél (1997 TD)
- Elymus caninus* (L.) L.: Fekete-e. (TI 1958)
- Elymus repens* (L.) GOULD: Felső-Pörböly, Kis-Rezét (BL 1957), Pusztaréti (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyöngyös-oldal, Koppány, Sárosalja (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Epilobium angustifolium* (L.) HOLUB: Lankóc körül a védgáton (HL 1911)
- Epilobium hirsutum* L.: Szekszárd: gemenci út (HL 1911); JJ 1975; Pandúr-szg. (1997 TD), Szeremlei-Duna Baja felőli, mocsaras vége (1998 TD)
- Epilobium lanceolatum* SEB. et MAURI: Gemenc (TI 1958)
- Epilobium parviflorum* SCHREB.: JJ 1975; Szeremlei-Duna Baja felőli, mocsaras vége, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Epilobium tetragonum* L.: Báli-tó (BL 1957); JJ 1975
- Epilobium tetragonum* ssp. *lamyi* (F. W. SCHULTZ) NYM.: Cserta-Duna m., Szeremlei-Duna Baja felőli, mocsaras vége, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD)
- \**Epipactis helleborine* CR.: Szeremle: nemesnyarasban az árvízvédelmi töltés közelében (1997 TD), Pörbölyi-e.: fehérsnyarasban (1998 TD)
- Equisetum arvense* L.: BL 1958a, Pusztaréti (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Felső-Pörböly (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg., Zsold-kaszáló (1997 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- \**Equisetum hyemale* L.: Pörbölyi-e.: erdőszélén {Baja 98A} (SIMON és STETÁK 1998)
- Equisetum × moorei* NEWMAN: Cserta (BL 1957)
- Equisetum palustre* L.: Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957); Koppány (TI 1958); JJ 1975; Kis-Gemenc: a Duna partján (1999 SD)
- \**Equisetum ramosissimum* DESF.: Pandúr-szg. (1997 TD), Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- \**Eragrostis minor* HOST.: Kádár-szg. zátonyán (1997 TD)
- Erigeron acris* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Erigeron annuus* (L.) PERS.: Szekszárd: gemenci út, védgát (HL 1911); Felső-Pörböly, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Lassi, Lídiák, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Duna (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY);
- (*Erigeron* p. p. → *Conyza*)
- Erucastrum nasturtiifolium* (POIR.) SCHULTZ: Koppány (TI ap. JJ 1975)
- Eryngium planum* L.: Gemenc (HL 1911)
- Erysimum cheiranthoides* L.: Gemenc (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957); Kecse-fok és m. rét (1998 TD)
- Euonymus europaea* L.: Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957), Pörböly-Sugó, Gemenc (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyűrűsalj, Keselyús, Pandúr-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Eupatorium cannabinum* L.: Szekszárd: gemenci út, védgát (HL 1911); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957); Gyöngyös-oldal, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975
- Euphorbia cyparissias* L.: Cserta, Koppány (TI 1958)
- Euphorbia falcata* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Pandúr-szg.: vadföldön (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Euphorbia helioscopia* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911)
- Euphorbia lucida* W. et K.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Szekszárdon a vám körül, gemenci erdőben (HL 1911), Báli-tó (BL 1957), BL 1958a, Pusztaréti, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Báli-tó, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja, Szünyog-szg., Veránka (TI 1958); Pörbölyi-e. (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Forgó-tó m.,

- Kecske-fok m. rét, Lassi, Zsold-kaszáló (1997 TD), Báli-tó, Báló-tó, Cserta, Fekete-e., Kis-Rezét, Lidiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken, gyakori; Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. mocsárréten (1998. VI. 26. TATÁR)
- Euphorbia palustris* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Gemenc (BL 1959); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg., Lassi (1997 TD), Pörbölyi-e., Ó-Falu-tava (1999 SD), nádasokban, nem gyakori
- \**Euphorbia platyphyllos* L.: Báli-tó (1996 TD), Pandúr-szg. (1997 TD), Kecske-fok, Pörbölyi-e., Szeremlei-Vén-Duna, vadföldön a Visszafolyó-csat. közelében (1998 TD), időszakos vízborítású helyeken száraz években gyakori, vadföldeken; Exs.: Kis-Báli-tó (1998. VII. 8. TATÁR)
- Euphorbia salicifolia* HOST.: Nagy-Pandúr (BL 1957)
- \**Euphorbia stricta* L.: Nagy-Rezét (1999 SD)
- Euphorbia villosa* W. et K.: gemenci erdőben, réten (HL 1911)
- Euphorbia virgata* W. et K.: gemenci út (HL 1911)
- Fagus sylvatica* L.: Bányfok, Gyűrűsalj, Pörbölyi-e. (TI 1958)
- Fallopia convolvulus* (L.) A. LÖVE: Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Visszafolyó-csat. m. (1998 TD)
- Festuca arundinacea* SCHREB.: Nagy-Pandúr (BL 1957); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992)
- Festuca gigantea* (L.) VILL.: Felső-Pörböly, Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bányfok, Cserta, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó (TI 1958); JJ 1975; Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Festuca pratensis* HUDS.: Báli-tó (BL 1957); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Festuca pseudovina* HACK.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Festuca rubra* L.: Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg. (RAD. 1992); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- \**Festuca rupicola* HEUFF.: Alsó-Gemenc: betonozott út m. (1998 TD)
- Festuca valesiaca* SCHLEICH.: Fekete-e., Koppány (TI 1958)
- (*Ficaria verna* → *Ranunculus ficaria*)
- Filipendula vulgaris* MÖNCH: Szekszárd: vám (HL 1911)
- \**Fragaria vesca* L.: Pandúr-szg. {Baja 105B, C, D találkozásánál} (SZAPPANOS ex verb.)
- Frangula alnus* MILL.: Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Felső-Pörböly, Keselyűs, Pandúr-szg., Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Fraxinus angustifolia* ssp. *danubialis* POUZAR: Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Bányfok, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Pandúr-szg., Simon-szg., Szomfova (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Fraxinus excelsior* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); a védgáttöltés mentén (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Pandúr-szg. (1998 TD)
- Fraxinus pennsylvanica* MARSH.: Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e. (BL 1957), BL 1958a; Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Bányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Simon-szg., Szúnyog-szg., Veránka (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Malomtelelő, Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Fumaria officinalis* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Gagea lutea* (L.) KER-GAWL.: Pandúr-szg.: ártéri erdőben (JJ 1975)
- \**Gagea villosa* (M. B.) DUBY: Pörbölyi-e.: fekete diósban {Baja 92B} (1996 SZARVAS ex verb.)!
- Galanthus nivalis* L.: Veránka, Közép- és Felső-Pörböly (BL 1957, 1958b); TI 1958; Pörbölyi-e.: fehérynarásban {Baja 73C}, Pandúr-szg.: a "dezei szóró"-nál {Baja 123C} (1998 TD); Keselyűs (1999 TAMÁS és KALOCSA ex verb.)
- Galega officinalis* L.: Borrév, Decs, Ócsény (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956), Felső-Pörböly (BL 1957); Pörbölyi-e. (KI 1957); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD)
- Galeopsis bifida* BOENN.: Gemenc, Keselyűs, Veránka (TI 1958)
- Galeopsis ladanum* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); a védgáton Pörböly körül (HL 1911)
- Galeopsis pubescens* BESS.: Cserta, Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957)

- Galeopsis speciosa* L.: a védgát mentén tömegesen (HL 1911); Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a; Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Keselyűs, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Simon-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Cserta, Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna (1998 TD)
- Galeopsis tetrahit* L.: Rezéti-Duna m. (RAD. 1992)
- \**Galinsoga parviflora* CAV.: Móric-Duna partján (1998 TD)
- Galium aparine* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Pandúr-szg. (1997 TD), Báli-tó, Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Galium boreale* L.: Cserta (KI 1957)
- Galium elongatum* C. PRESL.: Pörbölyi-e. (BL 1957); Csíplek-tó (1998 TD); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Galium glaucum* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Galium mollugo* L.: dunamelléki erdő, Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány (KI 1957); Koppány (TI 1958); JJ 1975
- Galium mollugo* × *verum*: dunamelléki erdő (BK 1910)
- Galium odoratum* (L.) SCOP.: Borrév, csak egyetlen folt (TI 1958)
- Galium palustre* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Báli-tó, Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Szűnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Öreg-Bundás, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Decsi-Kis-Holt-Duna m., Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), magassásosokban; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Nyéki-Holt-Duna m. mocsárreton (1998. VI. 26. TATÁR)
- Galium uliginosum* L.: Gemenc (HL 1911); BL 1958a; Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975
- Galium verum* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Gyűrűsalj (BL 1959); Buvat (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. mocsárreton (1996 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD)
- Genista tinctoria* L.: Pörbölyi-e.: fehérmnyaras szélén {Baja 93B} (1998 TD)
- Genista tinctoria* ssp. *elatior* (KOCH) SIMK.: Cserta (KI 1957); Cserta, Sárosalja (TI 1958)
- Gentiana pneumonanthe* L.: mocsaras réten Deecs körül (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna m. mocsárreton és a mellette lévő fiatal fűzesben (1996 TD), Pörbölyi-e. {93B vagy F m. a nyiladékon} (1999 SD)
- \**Geranium dissectum* L.: Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Báli-tó, Kecse-fok m. rét (1997 TD), Kecse-fok, Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), bolygatott helyeken
- Geranium pusillum* BURM. f.: gemenci út (HL 1911); Kis-Báli-tó (1998 TD)
- Geranium pyrenaicum* BURM.: BL 1958a
- Geranium robertianum* L.: Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (BL 1957), Pörböly-Sugó, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Cserta, Gemenc, Góga, Keselyűs, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Szomfova, Veránka (TI 1958); Pörbölyi-e. (JJ 1975); Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- \**Geranium rotundifolium* L.: Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Geum urbanum* L.: Felső-Pörböly (BL 1957), BL 1958b, Pörböly-Sugó, Pusztarét (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Fekete-e., Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Sárosalja, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Gladiolus imbricatus* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Glechoma hederacea* L.: BK 1910; Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957), Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD),

- Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pandúr-szg., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD)
- \**Gleditsia triacanthos* L.: Pörbölyi-e. (1996 TD), Pandúr-szg. (1998 TD), Buvat (1999 SD), valószínűleg máshol is
- Glyceria maxima* (HARTM.) HOLMBERG: vám, gemenci út (HL 1911); Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957); Nagy-Rezét (KI 1957); Alsó-Pörböly, Báli-tó (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Forgó-tó, Kádár-szg., Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Csíplek-tó, Káposztás-Duna, Kis-Rezét, Lídiák, Móric-Duna öble, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Sulymos-tó (1998 TD), Batai-Duna, Hosszú-Dzsindza-fok, Nagy-Rezét, Ó-Falu-tava, Zátontyava (1999 SD), időszakosan vízzel borított helyeken, ritkábban holtágak partján gyakori, társulásalkotó
- Glycyrrhiza echinata* L.: Öcsény, Decs (HL 1911)
- Gnaphalium uliginosum* L.: Bata: védgát (HL 1911); Baja (PRODAN 1915); Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó (1996 TD), Kádár-Duna (1997 TD), Csörösz, Sulymos-tó, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), kiszáradó iszapfelszíneken; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGY, MZs, SD és TT); Exs.: Pörbölyi-erdő (1998. VII. 2. TATÁR)
- (*Gnaphalium* p. p. → *Pseudognaphalium*)
- Gratiola officinalis* L.: Szekszárd: vám körül (HL 1911); Gemenc, Pusztaréti (BL 1959); Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Gyűrűsalj, Veránka (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Cserta, Kecse-fok, Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), mocsáréteken; Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. mocsáréteken (1998. VI. 26. TATÁR)
- Heleochoa alopecuroides* (PILL. et MITTERP.) HOST: Gemenc (BL 1959); Kádár-szg. zátonyán, Pandúr-szg. (1997 TD); Exs.: Pandúr-szg. (1999. IX. 24. STETÁK)
- \**Helianthus annuus* L.: Kádár-szg. zátonyán, szubspontán (1999 SD)
- Heliotropium europaeum* L.: Szekszárd körül a mélysíkon (HL 1911)
- \**Helleborus odoratus* W. et K.: Pusztaréti, mentett oldalon keményfaligetben {Bata 15A} (KALOCSA ex verb.)!
- Hibiscus trionum* L.: Öcsény, Decs (HL 1911)
- Holcus lanatus* L.: Gemenc (HL 1911)
- Humulus lupulus* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); a Dunamenti ligetekben: Pörböly, Keselyűs, Öcsény (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956), Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e. (BL 1957), Pörböly-Sugó, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Gemenc, Góga, Keselyűs, Pandúr-szg. (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna (1998 TD)
- Hydrocharis morsus-ranae* L.: gemenci út, Öcsény (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Batai-Duna (1999 SD)
- Hypericum perforatum* L.: Szekszárd: védgát, Borrév (HL 1911); Buvat, Fekete-e., Koppány (TI 1958)
- Hypericum tetrapterum* FR.: Szekszárd: védgát, Borrév (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957); Kecse-fok m. rét (1997 TD), Pörbölyi-erdőben többfelé (egykori kubikgödörben, időszakosan vízzel borított helyeken, 1998 TD), nyilván máshol is előfordul; Exs.: Pörbölyi-e. (1998. IX. 22. TATÁR)
- Impatiens glandulifera* ROYLE: Koppány-zátony, Kádár-szg. (RAD. 1992); Koppány-zátony, Pörbölyi-e., Kádár-szg., Duna balpart Szeremle alatt (1999 TAMÁS és SZARVAS ex verb.)
- Impatiens noli-tangere* L.: Felső-Pörböly, Kis-Rezét (BL 1957), BL 1958a, Pusztaréti, Gemenc (BL 1959), Közép-Pörböly (BL 1960); Koppány, Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957); Fekete-e., Gemenc, Kis-Rezét (TI 1958); Csíplek-tó, Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Impatiens parviflora* DC.: Kis-Rezét (BL 1957); Kis-Rezét, Veránka (TI 1958); Dunafürdő (JJ 1975); Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Inula britannica* L.: Közép-Pörböly (BL 1956), Felső-Pörböly (BL 1957); Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- Inula ensifolia* L.: Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Veránka (TI 1958)
- \**Inula salicina* L.: Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Cserta (1998 TD), mocsáréteken, nyiladékokon
- Iris pseudacorus* L.: mocsarakban mindenfelé (BK 1910); gemenci erdő és vám (HL 1911); Pörbölyi-e., Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1958a), Gyűrűsalj, Pusztaréti, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Báli-tó, Bányafok, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Szúnyog-szg., Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony,

- Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Gemenc, Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Buvat, Cserta, Decsi-Kis-Holt-Duna m., Fekete-e., Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), mocsarakban és fűzesekben is gyakori
- \**Iris sibirica* L.: Gyűrűsalj (1998 KALOCSA ex verb.); Visszafolyó-csat. közelében erdőszélen {Decs 44E} (1998 TAMÁS ex verb.)!
- Juglans nigra* L.: Felső-Pörböly, Nagy-Pandúr (BL 1957); TI 1958; Pandúr-szg. (1997 TD), Cserta, Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Juglans regia* L.: Góga (TI 1958)
- Juncus articulatus* L.: Őcsény (HL 1911); JJ 1975; Forgó-tó m., Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Juncus bufonius* L.: Szekszárd: vám (HL 1911); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Juncus compressus* JACQ.: a vám körül, a védgáton, Bába (HL 1911); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Cserta, Malomtelelő, Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Juncus effusus* L.: "vízpartokon, ártéri gyomtársulásokban gyakori" (JJ 1975); Pál-tanya (RAD. 1992)
- \**Juncus gerardii* LOIS.: Báli-tó (1997 TD), Kecskefok m. réten {Baja 75TI3}, Zsold-kaszáló (1997 TD)
- \**Kickxia spuria* (L.) DUM.: Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Knautia arvensis* (L.) COULT.: dunamelléki erdő (BK 1910); Pusztarét (BL 1959); árvízvédelmi töltésen a Nyéki-Holt-Duna közelében (1998 TD)
- Knautia drymeia* HEUFF.: Gyöngyös-oldal: ármentett részen (TI 1958, BL 1958b)
- (*Kochia* → *Bassia*)
- Lactuca quercina* L.: Cserta (KI 1957)
- Lactuca serriola* L.: Kis-Rezét (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); JJ 1975; Lassi, Pandúr-szg., Szeremlei-Duna (1998 TD)
- Lamium maculatum* (L.) L.: TI 1958; Kádár-szg. (RAD. 1992)
- Lamium purpureum* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Gemenc (BL 1959); Cserta (KI 1957); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- Lappula squarrosa* (RETZ.) DUM.: a Sárvíz mentén (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957)
- Lapsana communis* L.: Felső-Pörböly, Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Góga, Gyöngyös-oldal, Fekete-e., Felső-Pörböly, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Veránka (TI 1958); Pandúr-szg. (1997 TD), Csíplek-tó, Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Lathraea squamaria* L.: Kis-Rezét: fekete nyár tövében (1998 VÁRNAGY ex verb.); Zátontava közelében a mentett oldalon {Decs 76C} (1999 KALOCSA ex verb.)
- \**Lathyrus hirsutus* L.: Pandúr-szg. (1997 TD)
- Lathyrus pratensis* L.: Szekszárd: vám, Keselyűs (HL 1911); BL 1957, Pusztarét (BL 1959), Közép-Pörböly (BL 1960); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecske-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárreteken
- Lathyrus tuberosus* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD)
- Lavatera thuringiaca* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911)
- \**Leersia oryzoides* (L.) Sw.: Cserta-Duna partján magassásosban (1998 TD)
- Legousia speculum-veneris* (L.) CHAIX: Gyöngyös-oldal (TI 1958)
- Lemna minor* L.: gemenci út és vám m. (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Buvat, Cserta-Duna, Decsi-Kis-Holt-Duna, Grébeci-Duna, Káposztás-Duna, Kerülő-Duna, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna, Lassi, Malomtelelő, Móric-Duna, Peterdi-tó, Sárkány-fok (1998 TD), Báli-tó, Batai-Duna, Csörösz, Hosszú-Dzsindzsa-fok, Lidiák, Felső-Lassi-tó, Kádár-Duna, Ó-Falu-tava, Szeremlei-Vén-Duna, Zátontava, Zsold-kaszáló (1999 SD), gyakori, kisebb (gyakran árnyékos) állóvizekben állományalkotó, keréknyomokban is előfordul
- Lemna trisulca* L.: gemenci út és vám m. (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Szeremlei-Duna (1997 TD), Szeremlei-Vén-Duna (1999 SD), holtágakban, de sehol sem gyakori
- Leontodon autumnalis* L.: Pál-tanya (RAD. 1992); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Leonurus cardiaca* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Felső-Pörböly (BL 1957), BL 1958a; Gemenc (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD)
- Leonurus marrubiastrum* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957); Keselyűs, Pandúr-szg. (TI 1958); Pörbölyi-e. (1996 TD), Báli-tó, Forgó-tó m., Kecske-fok m. rét, Pandúr-szg. (1997 TD), Bálótó, Ó-Falu-tava, Szeremlei-Vén-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), időszakosan vízzel borított helyeken kiszáradás után szálanként, de szinte mindig előfordul
- Leucanthemum vulgare* LAM.: Őcsény (HL 1911); Gyűrűsalj, Gemenc, Pusztarét (BL 1959);

- Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken, nem gyakori
- Leucocjum aestivum* L.: a vasúti töltés m. Öcsény felé (BK 1910); Szekszárd: vám, védgát, Borrév (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957); Alsó-Pörboly, Bányfok, Cserta, Felső-Pörboly, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Pörbolyi-e. (1996 TD), Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Lassi (1997 TD), Buvat, Cserta-Duna m., Decsi-Kis-Holt-Duna m., Fekete-e., Kis-Rezét, Malomtelelő, Pandúr-szg., Szeremlei-Duna (1998 TD), Batai-Duna m. (1999 SD), fűzesekben, holtágak m., mélyen fekvő területeken gyakori; Exs.: Sugovica part (1924. V. 2. MOESZ), Pörbolyi-e. (1951. V. 30. CSAPODY), Gemenc (1959. V. 24. PÉNZES)
- Ligustrum vulgare* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Cserta, Koppány, Pörbolyi-e. (KI 1957); Cserta, Gyűrűsalj, Keselyűs, Siópart (TI 1958)
- Limosella aquatica* L.: Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Kádár-Duna (1997 TD), Lassi, Malomtelelő, Móric-Duna öblében (1998 TD), vízparti kiszáradó iszapon, feltehetően máshol is, de nem gyakori
- Linaria arvensis* (L.) DESF.: Buvat, Sárosalja (TI 1958)
- Linaria genistifolia* (L.) MILL.: Szekszárd: vám (HL 1911); Felső-Pörboly (BL 1957)
- Linaria vulgaris* MILL.: a védgáton helyenkint temérdek (HL 1911); Felső-Pörboly (BL 1957); JJ 1975; Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992)
- \**Lindernia procumbens* (KROCK.) BORB.: Cserta-Duna, Malomtelelő (1998 TD), vízparti kiszáradó iszapon
- Linum austriacum* L.: a Sárvíz m. töltésén (BK 1910); Szekszárd: védgát (HL 1911)
- \**Linum catharticum* L.: Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Listera ovata* (L.) R. BR.: Pandúr-szg.: ártéri töltésoldalon (JJ 1975)
- Lithospermum arvense* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957)
- Lithospermum officinale* L.: Gemenc (HL 1911)
- Lolium perenne* L.: BK 1910; Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD)
- \**Loranthus europaeus* JACK.: Pörbolyi-e.: kaményfaligetben {Baja 91A} (1998 TD)
- Lotus corniculatus* L.: Pörbolyi-e. (KI 1957); Pandúr-szg. (1997 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Vén-Duna m. ssp. *hirsutus* (KOCH) ROTHM. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Lotus glaber* Mill.: Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- (*Lotus tenuis* W. et K. → *L. glaber*)
- Luzula sylvatica* (HUDS.) GAUD.: Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); valószínűleg téves határozás
- Lychnis flos-cuculi* L.: Pusztarét (BL 1959); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken, nem gyakori
- \**Lycopersicon esculentum* Mill.: a Kádár-szg. zátonyán, szubspontán (1997 TD)
- Lycopus europaeus* L.: Koppány, Cserta, Pörbolyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Páltanya (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Forgó-tó m. (1997 TD), Pandúr-szg., Szeremlei-Duna (1998 TD), Szeremlei-Vén-Duna (1999 SD), holtágak partján, uszadékfákon, nem gyakori; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Lycopus exaltatus* L. f.: gemenci út (HL 1911); JJ 1975
- Lysimachia nummularia* L.: Szekszárd: gemenci út (HL 1911); Felső-Pörboly, Vén-Duna m., Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Pörboly-Sugó, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörboly, Bányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörboly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Szűnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Öreg-Bundás, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbolyi-e., Simon-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Lysimachia vulgaris* L.: Szekszárd: gemenci út, Duna mente (HL 1911); Pörbolyi-e., Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbolyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörboly, Báli-tó, Bányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Csíplek-tó, Decsi-Kis-Holt-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Fekete-e., Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbolyi-e., Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD),



- magassásosokban, mocsárréteken közönséges; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Lythrum hyssopifolia* L.: Nyéki-Holt-Duna m. keréknyomban (1996 TD), Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Lythrum salicaria* L.: Szekszárd: gemenci út, Ócsény (HL 1911); Felső-Pörböly, Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m. (1997 TD), Cserta, Csíplek-tó, Kis-Rezét, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), nádasokban, magassásosokban, mocsárréteken közönséges; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Lassi (1998. IX. 7. TATÁR)
- Lythrum virgatum* L.: Szekszárd: a vám körül (HL 1911); Cserta, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Malus sylvestris* (L.) MILL.: Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Felső-Pörböly, Gyűrűsalj, Szomfova (TI 1958); Pandúr-szg., ligeterdőkben (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD), a mélyen fekvő területek kivételével szinte minden erdőrésztletben megtalálható
- Malva pusilla* SM.: legelőn Ócsény felé (HL 1911)
- Marsilea quadrifolia* L.: Forgó-tó (TI 1958)
- Matricaria chamomilla* L.: Szekszárd: vám (HL 1911); Pál-tanya (RAD. 1992); a Nyéki-Holt-Duna m. réten átvezető úton (1996 TD), Báli-tó (1998 TD)
- \**Matricaria discoidea* DC.: Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- (*Matricaria* p. p. → *Tripleurospermum*)
- Medicago falcata* L.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Medicago lupulina* L.: Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Gyöngyös-oldal, Sárosalja (TI 1958); Kecse-fok m. rét (1997 TD), Báli-tó, Kecse-fok, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Vén-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), főként kiszáradó helyeken; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Medicago sativa* L.: a bátai védgáton gyakori (HL 1911)
- (*Melandrium* → *Silene*)
- Melilotus albus* DESR.: Szekszárd: gemenci út, vám (HL 1911); Felső-Pörböly (BL 1957); Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Melilotus officinalis* (L.) PALL.: Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957)
- Mentha aquatica* L.: gemenci út, Keselyűs, védgát, Decs (HL 1911); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Gyűrűsalj, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Zsold-kaszáló (1997 TD), Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét, Pandúr-szg. (1999 SD), mocsarakban, mocsárréteken gyakori; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Mentha arvensis* L.: Keselyűs (HL 1911); Cserta, Gemenc, Gyöngyös-oldal (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Cserta (1998 TD)
- Mentha longifolia* ssp. *mollissima* (BORKH.) DOM.: gemenci út (HL 1911)
- Mentha pulegium* L.: Decs (HL 1911); Báli-tó (BL 1957); Kádár-szg. zátonyán (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Mentha* × *verticillata* L.: Bátán a védgát m. (HL 1911)
- Moehringia trinervia* (L.) CLAIRV.: Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Fekete-e., Kis-Rezét, Pandúr-szg. (TI 1958); Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Morus alba* L.: Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a; Pörbölyi-e., Veránka (KI 1957); Bárányfok, Cserta, Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Veránka (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Lassi, Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Morus nigra* L.: Buvat (TI 1958)
- Myagrurn perfoliatum* L.: Ócsény (HL 1911)
- Mycelis muralis* (L.) DUM.: Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert, valószínűnek tartom, hogy Béda környékéről származik (vö.: KEVEY - TÓTH 1992), RADEMAKERS adata pedig téves határozás
- Myosotis palustris* (L.) NATH.: dunamelléki erdő (BK 1910); gemenci úton és a vám m. (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956), Vén-Duna m., Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét (KI

- 1957); Alsó-Pörböly, Buvat, Cserta, Fekete-e., Koppány, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-Duna, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD); Exs.: Pörbölyi-e. (1998. VI. 26. TATÁR), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Myosotis ramosissima* ROCH.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Myosotis stricta* LINK: Fekete-e. (TI 1958)
- Myosoton aquaticum* (L.) MÖNCH: a Vám m. mocsár szélén (BK 1910); gemenci út (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956), Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bányafok, Pandúr-szg. (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Csíplek-tó, Kecse-fok, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), kiszáradó helyeken
- Myriophyllum spicatum* L.: a Sárvíz és a keselyüsi út mentén, a keselyüsi erdőben meg a vám körül (HL 1911); Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (BL 1957), Vajas-Duna (BL 1960); Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Forgó-tó, Nyéki-Holt-Duna, Szeremlei-Duna (1997 TD), Cserta-Duna, Csíplek-tó, Káposztás-Duna, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna, Móric-Duna, Nagy-Lídia-tó (1998 TD), Bártai-Duna, Kádár-Duna (1999 SD), holtágakban, helyenként társulásalkotó; Exs.: Decsi-Kis-Holt-Duna (1998. V. 28. TATÁR)
- Myriophyllum verticillatum* L.: Vajas-Duna (BL 1960); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Malomtelelő (1999 SD); Exs.: Nyéki-Holt-Duna (f. *limosum* (HECT.) DC. 1998. VI. 26. TATÁR)
- \**Najas minor* ALL.: BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert; Exs.: Móric-Duna (1998. VII. 9. TATÁR)
- Nonea pulla* (L.) LAM. et DC.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Nuphar lutea* (L.) SM.: Szigeth-pusztá (HL 1911); Vajas-Duna (BL 1960); Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Cserta-Duna, Káposztás-Duna, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (1998 TD), Bártai-Duna (1999 SD), holtágakban társulásalkotó
- Nymphaea alba* L.: a Sárvíz m. mocsarakban (BK 1910); Keselyűs, Ócsény, Pörböly (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957), Vajas-Duna (BL 1960); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Szeremlei-Duna (1997 TD)
- Nymphoides peltata* (S. G. GMEL.) KTZE.: Decsi-Nagy-Holt-Duna (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Forgó-tó, Hosszú-Dzsindzsa-fok, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna, Csíplek-tó, Grébeci-Duna, Káposztás-Duna, Kerek-tó, Kis-Rezét, Nagy-Lídia-tó, Sulymos-tó (1998 TD), Bártai-Duna (1999 SD), holtágakban, sekély, nem ritkán kiszáradó vizekben, gyakori
- Odontites vulgaris* MÖNCH: Buvat, Gemenc (TI 1958); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Oenanthe aquatica* (L.) POIR.: gemenci úton és erdőben (HL 1911); Pörbölyi-e. (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Baja: Duna-holtágak (JJ 1975); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Csíplek-tó, Csörösz, Kecse-fok, Kis-Rezét, Lassi, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Duna (1998 TD), Bártai-Duna, Hosszú-Dzsindzsa-fok, Lídiák, Ó-Falu-tava, Zátonytava (1999 SD), magassásosokban, kiszáradó iszapon, egyes években sekély vízben állományalkotó; Exs.: Pörbölyi-e. (1998. VI. 27. TATÁR)
- Oenothera biennis* L.: Szekszárd: vám, gemenci út, védgát (HL 1911); Cserta (KI 1957); JJ 1975
- Onobrychis vicifolia* SCOP.: Pusztarét (BL 1959)
- Ononis arvensis* L.: Keselyűs (HL 1911); Pusztarét (BL 1959)
- Ononis spinosa* L.: a vám m. (HL 1911)
- Onopordum acanthium* L.: gemenci út (HL 1911)
- Ophioglossum vulgatum* L.: Pörbölyi-e. (BL 1958a); Cserta, Gyöngyös-oldal, Közép-Pörböly (TI 1958); Kis-Rezét {Baja 30I}, Pörbölyi-e. {Baja 84C}, Bába {Bába 4A} (1999 MÓROCZ ex verb.); Nyéki-Holt-Duna m. mocsárértén (1996 SIMON és STETÁK); Pandúr-szg.: keményfaligetben {Baja 110F} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Orchis laxiflora* ssp. *palustris* (JACQ.) BONNIER et LAYENS: Gemenc (HL 1911); Pusztarét (BL 1959)
- Ornithogalum umbellatum* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a; Forgó-tó közelében (1999 SZARVAS ex verb.)
- \**Oxalis dillenii* JACQ.: Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Oxalis stricta* L.: Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Veránka (KI 1957); Bányafok, Buvat, Gemenc, Góga, Fekete-e., Keselyűs, Kis-

- Rezét, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Szomfova, Veránka (TI 1958); Pörbölyi-e. (JJ 1975); Rezét-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Forgó-tó m. (1997 TD), Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Exs.: Rezét-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Padus avium* MILL.: Pörbölyi-e. (KI 1957)
- \**Panicum capillare* L.: Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- \**Papaver rhoeas* L.: Cserta: erdei úton egy kis otthagytott kavicsalmon (1998 TD)
- Parietaria officinalis* L.: Keselyűs (HL 1911); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Kádár-szg. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD); Pörbölyi-e. (1998 TD)
- \**Paris quadrifolia* L.: Nagy-Rezét és az árvízvédelmi töltés között (1998 BOZSÉR ex verb.); Borz-foknál kőrisesben legalább 7 tő {Öcsény 43} (1999 MÓROCZ ex verb.)
- \**Parthenocissus quinquefolia* (L.) PLANCH: BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert; Pandúr-szg. (1997 TD)
- Pastinaca sativa* L.: a szekszárd-bátai védgáton helyenkint temérdek, Szekszárd: vám, Keselyűs (HL 1911)
- Persicaria amphibia* (L.) S. F. GRAY: gemenci út (HL 1911); Báli-tó, Vén-Duna m., Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Szúnyog-szg., Báli-tó, Koppány, Cserta (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Forgó-tó m., Kádár-szg., Kecse-fok m. rét, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Csíplek-tó, Fekete-e., Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), Bátai-Duna, Cserta-Duna, Hosszú-Dzsindzsa-fok, Nagy-Rezét, Ó-Falu-tava (1999 SD), időszakos vizekben, mocsarakban, mocsárréteken gyakori
- Persicaria hydropiper* (L.) SPACH: Nagy-Pandúr (BL 1956), Vén-Duna m., Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Nagy-Rezét (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Koppány, Szomfova, Szúnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezét-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Öreg-Bundás (1997 TD), Bálótó, Csíplek-tó, Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), üde, árnyékos helyeken (keréknyomok, kiszáradó, árnyékos medrek) a legtoimegesebb
- Persicaria lapathifolia* (L.) S. F. GRAY: Szekszárd: vám, gemenci út (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); JJ 1975; Báli-tó, Kecse-fok (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-szg., Kecse-fok m. rét, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna m., Lassi, Malomtelelő, Pörbölyi-e., Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD), időszakosan vízzel borított területeken kiszáradás után gyakori; Exs.: Kis-Báli-tó (1998. VII. 8. TATÁR)
- Persicaria maculosa* S. F. GRAY: Koppány (KI 1957); Gyöngös-oldal, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezét-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992)
- Persicaria minor* (HUDS.) OPIZ: Keselyűs (HL 1911); JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Szeremlei-Duna (1998 TD), magassásosokban, nádasokban; Exs.: Kis-Báli-tó (1998. VII. 8. TATÁR)
- Persicaria mitis* (SCHRANK) ASSENOV: Keselyűs (HL 1911); Gemenc (BL 1959); Koppány, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Szeremlei-Duna (KÁRPÁTI V. 1963); Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Báli-tó, Lassi, Malomtelelő (1998 TD)
- Peucedanum carvifolia* VILL.: "ártéri erdőszegélyen szórványos" (JJ 1975)
- Peucedanum palustre* (L.) MÖNCH.: Báli-tó (BL 1957)
- Phalaris arundinacea* L.: a vám m. (HL 1911); Felső-Pörböly, Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Bárányfok, Cserta, Fekete-e., Gyöngös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Szúnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezét-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó, Kádár-szg., Kis-Rezét, Lassi, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Cserta, Csíplek-tó, Decsi-Kis-Holt-Duna m., Fekete-e., Kecse-fok, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsarakban, mocsárréteken gyakori, állományalkotó
- (*Phalaroides* → *Phalaris*)
- Phleum pratense* L.: Kádár-szg. (RAD. 1992)
- Phragmites australis* (CAV.) TRIN.: BK 1910; a Duna mentén (HL 1911); Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957); Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezét-Duna m.,

- Decsi-Nagy-Holt-Duna, Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Forgó-tó, Kádár-szg., Lassi, Malomtelelő, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Csíplek-tó, Fekete-e., Pörbölyi-e., Sulymos-tó (1998 TD), Felső-Lassi-tó, Zátontava (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Physalis alkekengi* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Cserta (KI 1957); Fekete-e., Kis-Rezét, Sárosalja (TI 1958)
- Picris hieracioides* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911)
- Pinus nigra* ARN.: Gyöngyös-oldal (TI 1958)
- Plantago altissima* L.: Borrév, gemenci út (HL 1911); Pörbölyi-e. (BL 1957); Buvat, Fekete-e., Veránka (TI 1958); Pandúr-szg. (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), mocsárrétek "szárazabb" típusában helyenként tömeges lehet
- Plantago lanceolata* L.: Szekszárd: gemenci út, védgát (BK 1910); HL (1911); Gyűrűsalj (BL 1959); Buvat, Koppány (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1998 TD), Nagy-Rezét, Pandúr-szg. (1999 SD)
- Plantago major* L.: Szekszárd: vám (HL 1911); Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e. (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Kis-Rezét, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-Duna, Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna m., Csörösz, Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), elsősorban kiszáradó helyeken; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Plantago maxima* JUSS.: Tolna, Bába, Szekszárd (HL 1911)
- Plantago media* L.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Platanthera bifolia* (L.) RICH: Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Gyűrűsalj, Pusztarét (BL 1959), Közép-Pörböly (BL 1960); Pörbölyi-e. (KI 1957); Bányafok (TI 1958); Petőfi-szg. (JJ 1975); Cserta-Duna m., Pörbölyi-e. (1998 TD); Kis-Rezét (1998 BOZSÉR ex verb.); Keskeny-oldal, Pusztarét (2000 MÓRO CZ ex verb.)
- \**Platanus × hybrida* BROTT.: Pandúr-szg. (1997 TD), többfelé telepítve
- Poa angustifolia* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Fekete-e., Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Pörbölyi-e., Nagy-Rezét (KI 1957); JJ 1975; Pandúr-szg. (1999 SD); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Poa bulbosa* L.: Gemenc (HL 1911)
- Poa nemoralis* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét (KI 1957); "ártéri erdőkben gyakori" (JJ 1975)
- Poa palustris* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Felső-Pörböly, Báli-tó (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Báli-tó, Bányafok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Szűnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-szg., Nyéki-Holt-Duna m., Pandúr-szg., Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Duna (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken; Exs.: Kádár-Duna, zátonysziget (1957. VII. 12. JÁVORKA, KÁRPÁTI I., CSAPODY), Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Zsold-kaszáló (1997. V. 28. TATÁR)
- Poa pratensis* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Sárosalja, Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Fekete-e., Kecse-fok, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), mocsárréteken gyakori
- Poa trivialis* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Felső-Pörböly, Báli-tó, Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Bányafok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Sárosalja, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m. erdőben (1997 TD), Báli-tó, Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken
- Podospermum canum* C. A. MEY.: Szekszárd: gemenci út, Öcsény (HL 1911)
- Polygala comosa* SCHKUHR.: Gyűrűsalj (BL 1959); Buvat (TI 1958); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Polygala vulgaris* L.: gemenci rétek (HL 1911)

- Polygonatum latifolium* (JACQ.) DESF.: Bárányfok, Pandúr-szg. (TI 1958); Vajastorok (1998 BOZSÉR ex verb.); a Sió árterében a kirándulóközpontról nem messze (1999 TAMÁS ex verb.); Pandúr-szg.: keményfaligetben {Baja 110F} (1998 KGy, MZs, SD és TT); Pörbölyi-e.: fiatal fehéryanarásban {Baja 79K} (1998 TD)
- Polygonum aviculare* agg.: JJ 1975; Kádár-szg., Páltanya (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Kecse-fok (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD)
- (*Polygonum* p. p. → *Persicaria*)
- Populus alba* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); a gemenci úton, a védgát mentén (HL 1911); Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Veránka (TI 1958); JJ 1975; Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); közönséges
- Populus × canadensis* MÖNCH: Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e. (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957); Alsó-Pörböly, Bárányfok, Cserta, Fekete-e., Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Koppány, Sárosalja, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony (RAD. 1992); az egész területen kiterjedten ültetik
- Populus × canescens* (AIT.) SM.: TI 1958; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992)
- Populus nigra* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Gemenc (HL 1911); Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Veránka, (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Páltanya (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD)
- Populus tremula* L.: TI 1958
- Portulaca oleracea* L.: Kádár-szg., Páltanya (RAD. 1992); a Kádár-szg. zátonyán (1997 TD), Sulymos-tó (1998 TD)
- \**Potamogeton × angustifolius* BERCHT. et PRESL.: Csörösz: a szülőfajok között (1999 SD), a magyarországi Duna-völgyre új
- \**Potamogeton berchtoldii* FIEBER: Buvat: keréknyomban, Móric-Duna öblében (1998 TD)
- Potamogeton crispus* L.: a gemenci út mentén (HL 1911); Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (BL 1957); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Forgó-tó, Hosszú-Dzsindzsa-fok, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Bálótó, Buvat: keréknyomban, Cserta-Duna, Csíplek-tó, Káposztás-Duna, Kis-Rezét, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Móric-Duna (1998 TD), Bártai-Duna, Zsold-kaszáló (1999 SD), holtágakban, néha időszakos vizekben, sehol sem tömeges; Exs.: Malomtelelő f. *planifolius* MEYER (1999. IX. 17. STETÁK)
- Potamogeton gramineus* L.: Gemenc, Sió-toroktól délre (BL 1959); Báli-tó (1996 TD), Cserta-Duna (1998 TD); Exs.: Báli-tó (1999. VI. 24. STETÁK), Csörösz (1999. VII. 11. STETÁK)
- Potamogeton lucens* L.: a gemenci út mentén (HL 1911); Gemenc, Sió-toroktól délre (BL 1959); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Hosszú-Dzsindzsa-fok, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Csíplek-tó, Kis-Rezét {Baja 35TN2}, Lídiák (1998 TD), Ó-Falu-tava, Zsold-kaszáló (1999 SD), holtágakban és időszakosan kiszáradó vizekben is gyakori; Exs.: Csörösz (1999. VIII. 4. STETÁK)
- \**Potamogeton nodosus* POIR.: Móric-Duna (1998 TD), Csörösz (1999 SD); Exs.: Cserta-Duna (1999. VI. 25. STETÁK)
- \**Potamogeton panormitanus* BIVONA: Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Hosszú-Dzsindzsa-fok, Szeremlei-Duna (1997 TD), Kis-Lídia-tó, Móric-Duna (1998 TD), Zsold-kaszáló (1999 SD); Exs.: Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1999. VII. 11. STETÁK)
- Potamogeton pectinatus* L.: a gemenci út mentén (HL 1911); Gemenc, Sió-toroktól délre (BL 1959); Báli-tó (1996 TD), Szeremlei-Duna (1997 TD), Móric-Duna (1998 TD), Csörösz, Ó-Falu-tava, Zsold-kaszáló (1999 SD); Exs.: Kis-Lídia-tó (1999. VII. 10. STETÁK)
- \**Potamogeton trichoides* CHAM. et SCHLECHTD.: Exs.: Zsold-kaszáló (1999. VIII. 3. STETÁK)
- Potentilla anserina* L.: Őcsény (HL 1911); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Fekete-e., Lídiák, Malomtelelő (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Potentilla arenaria* BORKH.: Buvat (TI 1958)
- Potentilla argentea* L.: Őcsény (HL 1911); Buvat, Fekete-erdő (TI 1958)
- Potentilla reptans* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Őcsény (HL 1911); Közép-Pörböly (BL 1956), Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Báli-tó, Bárányfok,

- Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja, Szomfova, Szúnyog-szg., Veránka (TI 1958); JJ 1975; Rezéli-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Lassi, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Fekete-e., Kis-Rezét, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken közönséges; Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. mocsárréten (1998. VI. 26. TATÁR)
- Potentilla supina* L.: Szekszárd: gemenci út, Őcsény (HL 1911); Báli-tó (1996 TD), Kádár-szg. zátonyán, Zsold-kaszáló (1997 TD), Kis-Rezét, Pandúr-szg., Sulymos-tó, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), kiszáradó helyeken; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Prunella vulgaris* L.: Közép-Pörböly (BL 1956), Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bányfok, Buvat, Cserta, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Rezéli-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Bálótó, Lassi, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), nyiladékokon, mocsárréteken; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- \**Prunus spinosa* L.: Pörbölyi-e. (1998 TD), kicsi fává nőtt; Exs.: Pandúr-szg. (1999. IX. 26. STETÁK)
- \**Pseudognaphalium luteo-album* (L.) HILL. et BURTT: Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Pseudolysimachion longifolium* (L.) OPIZ: a gemenci út árkaiban, bátai védgát (HL 1911); Pörbölyi-e. (BL 1957); Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Fekete-e., Gyűrűsalj (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Cserta, Malomtelelő (1998 TD), mocsárréteken; Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. mocsárréten (1997. IX. 11., 1998. VI. 26. TATÁR)
- Pulicaria dysenterica* (L.) BERNH.: "ártereken, vízpartokon szórványos" (JJ 1975)
- Pulicaria vulgaris* GÄRTN.: Szekszárdon a vám körül és a Sárvíz mentén (HL 1911); "iszapos vízparton elterjedt" (JJ 1975)
- Pyrus pyraeaster* BURGSD.: Pörbölyi-e. (KI 1957); Cserta, Felső-Pörböly, Sárosalja (TI 1958); Cserta (1998 TD), Pörbölyi-e.
- Quercus cerris* L.: Borrév (HL 1911); Rezéli-Duna m. {Alsónyék 2A?}, ültetve (1997 TD); Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (2000 MÓROCZ ex verb.)
- Quercus robur* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Keselyűs (HL 1911); Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéli-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); közönséges *Ranunculus acris* L.: BK 1910; Pandúr-szg. (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Bányfok, Cserta, Gyűrűsalj (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Rezéli-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét (1997 TD), mocsárréteken, ritka
- Ranunculus auricomus* L.: BL 1958a, Gyűrűsalj (BL 1959); Szomfova (TI 1958); Pörbölyi-e. {Baja 84C} (1998 TD)
- Ranunculus ficaria* L.: BK 1910; Pörbölyi-e., Pandúr-szg. (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Pusztarét (BL 1959); JJ 1975; Pörbölyi-e. (1996 TD), Forgó-tó, Lassi (1997 TD), Pandúr-szg. (1998 TD)
- Ranunculus polyanthemus* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: vám (HL 1911)
- Ranunculus repens* L.: BK 1910; Szekszárd: védgát (HL 1911); Pörbölyi-e., Pandúr-szg. (BL 1957), BL 1958a, Gemenc, a Sió-toroktól délre (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Cserta, Fekete-e., Gemenc, Gyűrűsalj, Koppány, Szúnyog-szg., Veránka (TI 1958); JJ 1975; Rezéli-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Lassi, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Fekete-e., Kecse-fok, Kis-Rezét, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken közönséges; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Ranunculus sardous* CR.: Cserta (KI 1957); Pörbölyi-e. (1996 TD); Exs.: Rezéli-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Ranunculus sceleratus* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Gemenc, a Sió-toroktól délre (BL 1959); Pandúr-szg. (JJ 1975); Báli-tó (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-Duna, Kecse-fok m. rét, Szeremlei-Vén-Duna (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Kis-Rezét, Móric-Duna öble, Nyéki-Holt-Duna m., Pandúr-szg., Simon-Duna, Sulymos-tó, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), kiszáradó helyeken; Exs.: Rezéli-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- (*Ranunculus* p. p. → *Batrachium*)
- Reseda lutea* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911)

- Reseda luteola* L.: Felső-Pörbölly (BL 1957)
- Rhamnus catharticus* L.: Öcsény (HL 1911); Pörböllyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957); Cserta, Pörböllyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Cserta, Felső-Pörbölly, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Pandúr-szg. (1997 TD)
- Rhinanthus minor* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910)
- Rhinanthus serotinus* (SCHÖNHEIT) OBORNY: Szekszárd m. a védgát mentén (HL 1911); árvízvédelmi töltésen (1998 TD)
- Robinia pseudo-acacia* L.: Felső-Pörbölly (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörböllyi-e. (KI 1957); Buvat, Fekete-e., Felső-Pörbölly, Simon-szg. (TI 1958); Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD)
- Rorippa amphibia* (L.) BESS.: dunamelléki erdő és a vám m. mocsarakban (BK 1910); Vén-Duna m. (BL 1957), Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Pusztaré, Gemenc (BL 1959); Koppány, Pörböllyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörbölly, Bárányfok, Cserta, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátóny, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó, Csörösz (1996 TD), Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Forgó-tó m., Kádár-szg., Kecse-fok m. rét, Lassi, Nyéki-Holt-Duna m., Öreg-Bundás, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Kecse-fok, Kis-Rezét, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörböllyi-e., Simon-Duna, Sulymos-tó, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), Ó-Falutava (1999 SD), kiszáradó helyeken gyakori
- Rorippa austriaca* (CR.) BESS.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Felső-Pörbölly (BL 1957); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- Rorippa kernerii* MENYH.: Keselyűs közelében a Duna m. erdőben (BK 1910)
- Rorippa palustris* (L.) BESS.: gemenci út (HL 1911); Koppány (KI 1957); JJ 1975; Sulymos-tó (1998 TD), bizonyára máshol is
- Rorippa sylvestris* (L.) BESS.: Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörböllyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörbölly, Cserta, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-szg., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Fekete-e., Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörböllyi-e., Simon-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), kiszáradó helyeken; Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Rosa canina* L.: Cserta, Fekete-e., Keselyűs (TI 1958); a *Rosa*-fajok a területen ritkák
- Rubus caesius* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: vám, Gemenc (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1956, 1957), Pörböllyi-e., Kis-Rezét (BL 1957), BL 1958, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Pusztaré, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörböllyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörbölly, Báli-tó, Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörbölly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörbölly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Szúnyog-szg., Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátóny, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); közönséges
- Rumex conglomeratus* MURR.: Szekszárd: vám, Keselyűs (HL 1911); Pörböllyi-e. (BL 1957), Pusztaré (BL 1959); Koppány (KI 1957); Buvat, Fekete-e., Koppány (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Rumex crispus* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Öcsény (HL 1911); Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörböllyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Pandúr-szg., Sárosalja, Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-szg. zátonyán, Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Csörösz, Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Pandúr-szg., Pörböllyi-e., Sulymos-tó, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken, kiszáradó helyeken gyakori
- Rumex hydrolapathum* HUDS.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1957), Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány (KI 1957); Bárányfok, Cserta, Gyűrűsalj, Koppány, Szúnyog-szg. (TI 1958); JJ 1975; Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg., Lassi, Öreg-Bundás (1997 TD), Cserta-Duna m., Csíplek-tó, Kis-Rezét, Lídiák, Malomtelelő, Szeremlei-Duna (1998 TD), Batai-Duna (1999 SD), magassásosokban, nádasokban
- Rumex maritimus* L.: Koppány-zátóny, Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Baizsinza-tó, Báli-tó, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD), kiszáradó helyeken; Exs.: Kádár-Duna, zátónysziget (1957. VII. 12. JÁVORKA, KÁRPÁTI I. és CSAPODY)
- Rumex obtusifolius* L.: BL 1958a; Fekete-e., Koppány (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátóny, Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD),

- Kádár-szg. zátonyán, Kecse-fok m. rét (1997 TD), Lassi, Pörbölyi-e., Sulymos-tó (1998 TD)
- Rumex palustris* SM.: Szekszárd: gemenci út, vám (HL 1911); Kis-Rezét (BL 1957); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg. zátonyán, Kecse-fok (1997 TD), Arany-tó, Baizsinza-tó, Cserta-Duna m., Káposztás-Duna, Lassi, Szeremlei-Duna (1998 TD), kiszáradó helyeken
- Rumex sanguineus* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Öcsény (HL 1911); Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét (BL 1959); Koppány, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); JJ 1975; Cserta, Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Kis-Rezét, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Nyéki-Holt-Duna m., Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD), erdőben gyakori; Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Rumex stenophyllus* LEDEB.: Báli-tó (BL 1957); Báli-tó (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Malomtelelő (1998 TD)
- \**Rumex thyriflorus* FINGERHUT: árvízvédelmi töltésen Nagy-Rezét közelében (1999 SD)
- Sagittaria sagittifolia* L.: a gemenci úton s a vám körül (HL 1911); JJ 1975; Decsi-Kis-Holt-Duna (1999 MÓROCZ ex verb.); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Szeremlei-Duna (1998 TD)
- Salix alba* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: vám, Keselyűs (HL 1911); Nagy-Pandúr, Vén-Duna m., Kis-Rezét (BL 1957), Gemenc (BL 1958a), Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Báli-tó, Bányafok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Koppány, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Szúnyog-szg., Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); közönséges
- Salix caprea* L.: Szigeth-pusztá (HL 1911); Nagy-Rezét (TI 1958)
- Salix cinerea* L.: Pörbölyi-e. (KI 1957); Pandúr-szg. (1997 TD), Címer-fok partján a Nyéki-Holt-Dunához közel, Malomtelelő, Peterdi-tó m., Pörbölyi-e. {Baja 101TI}, Szeremlei-Duna Baja felőli, mocsaras végén (1998 TD)
- Salix fragilis* L.: Gyűrűsalj (BL 1959); "ártéren gyakori" (JJ 1975)
- Salix purpurea* L.: Báli-tó (BL 1957); Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Fekete-e., Gemenc, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó (1996 TD), Kis-Rezét, Pörbölyi-e. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Salix triandra* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957), Gyűrűsalj (BL 1959); Koppány, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Pál-tanya (RAD. 1992); Báli-tó (1998 TD), Szeremlei-Duna (1999 SD)
- Salix viminalis* L.: Pandúr-szg. (JJ 1975)
- Salsola kali* ssp. *ruthenica* (ILJIN) SOÓ: Öcsény (HL 1911)
- Salvia verticillata* L.: Decs (HL 1911); árvízvédelmi töltésen a Nyéki-Holt-Duna közelében (1998 TD)
- \**Salvinia natans* (L.) ALL.: BL (1956) kéziratában szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert; Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Kerülő-Duna, Peterdi-tó (1998 TD), Batai-Duna, Decsi-Kis-Holt-Duna, Hosszú-Dzsindzsa-fok, Felső-Lassi-tó, Kádár-Duna, Nagy-Rezét, Szeremlei-Vén-Duna, Zátonytava, Zsold-kaszáló (1999 SD), sekély vizekben gyakori, békalencsékkel együtt
- Sambucus nigra* L.: BK 1910; Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bányafok, Cserta, Góga, Kis-Rezét, Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992)
- Sanicula europaea* L.: Gemenc, Sió-toroktól délre (BL 1959)
- Saponaria officinalis* L.: "ártéren, vízparton közönséges" (JJ 1975)
- Schoenoplectus lacustris* (L.) PALLA: dunamelléki erdő (BK 1910); gemenci út, vám, Öcsény (HL 1911); Báli-tó, Nagy-Pandúr (BL 1957), Gemenc (BL 1959); TI 1958; Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Forgó-tó, Öreg-Bundás, Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Bálótó, Csíplek-tó, Kis-Rezét, Lídiák, Sulymos-tó (1998 TD), Felső-Lassi-tó, Hosszú-Dzsindzsa-fok (1999 SD), mocsarakban, holtágakban, ritkán alkot nagyobb állományt; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- \**Schoenoplectus supinus* (L.) PALLA: Exs.: Pandúr-szg.: iszapos úton (1999. VIII. 6. STETÁK)
- Scilla vindobonensis* SPETA: Pörbölyi-e. (BL 1957); Forgó-tó közelében, Pandúr-szg. {Baja 117C} (1999 SZARVAS ex verb.); Pandúr-szg.: a "dezsei szóró"-nál {Baja 123C} (1998 TD); Exs.: Közép-Pörböly {Baja 81A, B} (1997. III. 12. TATÁR)
- \**Scirpus radicans* SCHKUHR: Malomtelelő: magassásosban egy kis időszakos vízállás partján (1998 TD)
- Scrophularia nodosa* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Felső-Pörböly, Pörbölyi-e. (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Sárosalja, Szomfova (TI 1958); Pandúr-szg. (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)



- Scutellaria altissima* L.: Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); valószínűleg téves határozás
- Scutellaria galericulata* L.: Pörbölyi-e. (KI 1957); Keselyűs (TI 1958); Lassi, Szeremlei-Duna (1998 TD), holtágak partján, uszadékfákon, nem gyakori
- Scutellaria hastifolia* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: vám, Őcsény (HL 1911); Felső-Pörböly (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Gemenc, Gyűrűsalj (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken; Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. (1997. V. 27. TATÁR)
- Securigera varia* (L.) LASSEN: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: vám (HL 1911); Pusztarét (BL 1959)
- Sedum acre* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Buvat (TI 1958)
- Senecio erraticus* ssp. *barbareifolius* (W. et Gr.) BEGER: Szekszárd: vám, Sárvíz mente (HL 1911); Pörbölyi-e. (BL 1957); JJ 1975; Pörbölyi-e. (1997 TD)
- Senecio jacobaea* L.: Szekszárd: vám, Őcsény (HL 1911); Buvat (TI 1958)
- Senecio paludosus* L.: Báli-tó (BL 1957); Cserta (KI 1957); Cserta, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja, Szúnyog-szg. (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Káposztás-Duna m., Keszeges-tó m., Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő (1998 TD), nedvesebb mocsárréteken, füzesekben; Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Serratula tinctoria* L.: főleg a mély síkon, Őcsény (HL 1911); Fekete-e. (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), "szárazabb" típusú mocsárréteken
- Setaria italica* (L.) P. B.: elvadultan a védgáton (HL 1911)
- Setaria pumila* (POIR.) R. et SCH.: Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); JJ 1975; Báli-tó, Pandúr-szg. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT); Exs.: Pörbölyi-e. (1998. VII. 8. TATÁR)
- Setaria verticillata* (L.) P. B.: védgát (HL 1911)
- Setaria viridis* (L.) P. B.: Rezéti-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Silene latifolia* ssp. *alba* (MILL.) GREUT. et BURD.: HL 1911; Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Cserta (KI 1957)
- Silene vulgaris* (MÖNCH) GARCKE: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Sinapis alba* L.: Őcsény (HL 1911)
- Sinapis arvensis* L.: Gemenc (BL 1959); Pörbölyi-e.: a Kecse-fok m. réten (Baja 75TI3) (1997 TD), Pandúr-szg.: egy etető m. (1999 SD)
- Sisymbrium officinale* (L.) SCOP.: Felső-Pörböly (BL 1957), Gemenc (BL 1959); JJ 1975; Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Sisymbrium strictissimum* L.: Pörbölyi-e. (KI 1957); "a Duna mentén" (JJ 1975)
- Sium latifolium* L.: Keselyűs, Gemenc (HL 1911); Pörböly-Sugó (BL 1957), Nagy-Rezét, Gemenc (BL 1959); Alsó-Pörböly, Bányafok, Cserta, Koppány (TI 1958); Pörbölyi-e., Cserta, Koppány, füzesekben (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Kis-Rezét, Lassi (1998 TD), Malomtelelő (1999 SD), magassásosokban
- Solanum dulcamara* L.: Sárvíz m. mocsarakban és a Vámerdőben (BK 1910); Őcsény (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Fekete-e., Felső-Pörböly, Gyűrűsalj, Koppány, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Koppány-zátony, Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kádár-szg. zátonyán (1997 TD)
- Solanum nigrum* L.: Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Simon-Duna (1998 TD)
- Solidago gigantea* ssp. *serotina* (AIT.) MCNEILL: Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e. (BL 1957), BL 1958a, Pörböly-Sugó, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Csörösz, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Báli-tó, Pandúr-szg. (1997 TD), Cserta, Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Sonchus arvensis* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Fekete-e., Keselyűs, Pandúr-szg. (TI 1958); Báli-tó (1997 TD)
- Sonchus asper* (L.) HILL: Kis-Rezét (BL 1957); Pandúr-szg. (1997 TD), Bálótó, Lassi, Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Sonchus oleraceus* L.: Gemenc (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Pörbölyi-e. (KI 1957); JJ 1975
- Sonchus palustris* L.: Szekszárd: gemenci út, vám (HL 1911)
- Sorbus torminalis* (L.) CR.: Keselyűs közelében (BK 1910)
- Sparganium erectum* L.: a védgát m. (HL 1911); "ártereken szórványos" (JJ 1975); Báli-tó (1997

- SZARVAS ex verb.) !; az 1999-es, nagyon vizes évben gyakori a Zsold-kaszálón, azelőtt ott nem találtam
- Spirodela polyrhiza* (L.) SCHLEIDEN: gemenci út és vám m. (HL 1911); Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Csörösz, Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Hosszú-Dzsindzsa-fok, Öreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Buvat: keréknyomban, Cserta-Duna, Csípleg-tó, Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Káposztás-Duna, Kerek-tó, Kerülő-Duna, Kis-Rezét, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna, Lassi, Lídiák, Malomtelelő, Móric-Duna, Sárkány-fok (1998 TD), Batai-Duna, Felső-Lassi-tó, Kádár-Duna, Ó-Falu-tava, Pandúr-szg., Szeremlei-Vén-Duna, Zátontyava (1999 SD), sekély vizekben; Exs.: Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (1991. IX. 4. FELFÖLDY), Káposztás-Duna (1991. IX. 17. FELFÖLDY)
- \**Stachys annua* (L.) L.: Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Stachys germanica* L.: Koppány (TI 1958)
- Stachys palustris* L.: gemenci út, védgát, Decs (HL 1911); Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Gyűrűsalj, Keselyűs, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kádár-szg., Zsold-kaszáló (1997 TD), Csörösz, Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pandúr-szg., Szeremlei-Vén-Duna, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), nedvesebb mocsárréteken, magassásokban, nádasokban; Exs.: Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Stachys recta* L.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Stachys sylvatica* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Kis-Rezét (BL 1957, 1958b), Nagy-Rezét (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét (KI 1957); Góga, Gyöngyös-oldal, Kis-Rezét (TI 1958); Pandúr-szg. (1997 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- \**Stellaria holostea* L.: Pusztarét, mentett oldalon keményfaligetben {Báta 15A} (SD)
- Stellaria media* (L.) VILL.: BK 1910; Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bányafok, Buvat, Cserta, Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Pandúr-szg. (1998 TD)
- Stellaria nemorum* L.: Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); valószínűleg téves határozás
- Stellaria palustris* EHRH.: Koppány (TI 1958)
- (*Stenactis* → *Erigeron*)
- Stratiotes aloides* L.: Vajas-Duna (BL 1960); u. ott (1999 TAMÁS ex verb.)
- Symphytum officinale* L.: Szekszárd: vám, védgát (HL 1911); Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Alsó-Pörböly, Bányafok, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyűs, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); közönséges
- Tanacetum vulgare* L.: Szekszárd: gemenci út, öcsényi út, védgát, Öcsény (HL 1911); Báli-tó (BL 1957), Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Gemenc (TI 1958); Páltanya (RAD. 1992); Báli-tó (1996 TD), Kecse-fok m. rét (1997 TD), Kecse-fok, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Simon-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1998 TD)
- Taraxacum officinale* WEBER: BK 1910; Nagy-Pandúr (BL 1957), Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); Koppány-zátony, Rezéti-Duna m., Páltanya (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken, nem gyakori
- Teucrium scordium* L.: vizek körül, Szekszárd: vám (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna m., Kecse-fok m. rét (1996 TD), Zsold-kaszáló (1997 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken; Exs.: Pörbölyi-e. (1998. VII. 13. TATÁR)
- Thalictrum flavum* L.: Pörbölyi-e. (BL 1957), Gyűrűsalj, Gemenc (BL 1959); Koppány (KI 1957); Gyűrűsalj (TI 1958); Kádár-szg., Rezéti-Duna m. (RAD. 1992); Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta-Duna m., Kis-Rezét, Lassi, Malomtelelő, Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), mocsárréteken; Exs.: Nyéki-Holt-Duna m. mocsárréten (1998. VI. 26. TATÁR)
- Thalictrum lucidum* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárdon a vámhíd m. levő fűzesben (HL 1911)
- Thlaspi perfoliatum* L.: Pusztarét (BL 1959)
- \**Tilia platyphyllos* SCOP.: Rezéti-Duna m. {Alsónyék 2A?}, ültetve (1997 TD)

- Tilia tomentosa* MÖNCH: Pörbölyi-e.: 1 csoport (TI 1958); Rezéti-Duna m. {Alsónyék 2A?}, ültetve (1997 TD)
- \**Torilis arvensis* (HUDS.) LINK: Báli-tó m. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör {Szeremle 2B} (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Torilis japonica* (HOULT.) DC.: Szekszárdon a vám körül tömegesen (HL 1911); Pörbölyi-e., Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Pusztarét (BL 1959); Bárányfok, Buvat, Cserta, Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Sárosalja, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Kádár-szg., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg., Pörbölyi-e. (1998 TD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Tragopogon orientalis* L.: Szekszárd: gemenci út, Öcsény (HL 1911); Felső-Pörböly (BL 1957)
- Trapa natans* L.: Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (BL 1957), Vajas-Duna (BL 1960); Szeremlei-Duna (KÁRPÁTI V. 1963); Decsi-Nagy-Holt-Duna (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Decsi-Kis-Holt-Duna, Decsi-Nagy-Holt-Duna, Forgó-tó, Kecse-fok m. réten egy mélyedésben, Óreg-Bundás, Szeremlei-Duna (1997 TD), Bálótó, Cserta-Duna, Fekete-e.: Hókony, Káposztás-Duna, Kis-Rezéti- (Fás-) Duna, Lassi, Malomtelelő, Nagy-Lídia-tó (1998 TD), Bátai-Duna, Szeremlei-Vén-Duna (1999 SD), mellék- és holtágakban, társuláskötő, néha szemisztatikus vizekben is; feltöltődő mellékágakban az első megtelepedő (FELSŐ ex verb.); Exs.: Kis-Rezéti- (Fás-) Duna (1991. IX. 4. FELFÖLDY)
- Trifolium arvense* L.: Szekszárd: vám (HL 1911); Gyöngyös-oldal, Koppány (TI 1958)
- Trifolium aureum* POLL.: Szekszárd: gemenci út, Öcsény (HL 1911); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD)
- \**Trifolium campestre* SCHREB.: Kecse-fok m. ré, Pandúr-szg., Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Trifolium fragiferum* L.: Szekszárd: vám, gemenci út (HL 1911)
- Trifolium hybridum* L.: Öcsény (HL 1911)
- Trifolium pratense* L.: a vám körül (HL 1911); Gemenc (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Fekete-e. (TI 1958); Kecse-fok m. ré, Zsold-kaszáló (1997 TD), Báli-tó, Kecse-fok (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Trifolium repens* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Öcsény (HL 1911); BL 1957; Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét (KI 1957); Forgó-tó m., Kecse-fok m. ré, Zsold-kaszáló (1997 TD), Báli-tó, Kecse-fok, Pandúr-szg. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD); Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Tripleurospermum inodorum* (L.) SCHULTZ-BIP.: Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Gemenc (BL 1959); Kádár-szg. zátonyán (1997 TD), Bálótó, Pörbölyi-e., Szeremlei-Duna (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD)
- \**Trisetum flavescens* (L.) P. B.: Szomfova: árvízvédelmi töltésen (1998 TD), valószínűleg vetett
- Tussilago farfara* L.: Szekszárd: a vám körül, védgát (HL 1911); Pörbölyi-e. (1996 TD)
- Typha angustifolia* L.: Öcsény (HL 1911); Báli-tó (BL 1957); JJ 1975; Kis-Rezét {Baja 36A}, Szeremlei-Duna (1998 TD), ritka; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Typha latifolia* L.: gemenci út, vám (HL 1911); JJ 1975; Forgó-tó (1997 TD), Malomtelelő, Szeremlei-Duna (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), ritka
- Ulmus campestris* agg.: dunamelléki erdő (BK 1910); Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Nagy-Pandúr (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyús, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958)
- Ulmus laevis* PALL.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gyöngyös-oldal, Keselyús, Pandúr-szg., Sárosalja, Veránka (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppány-zátony, Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezéti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Vén-Duna m. (1998. VII. 14. FELFÖLDY)
- Ulmus minor* MILL.: JJ 1975; Kádár-szg., Rezéti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Kis-Rezét (1998 TD); Exs.: Pörbölyi-e. (1998. VII. 8. TATÁR)
- Urtica dioica* L.: Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957), BL 1958a, Nagy-Rezét, Gyűrűsalj, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Bárányfok, Buvat, Cserta, Fekete-e., Felső-Pörböly, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Keselyús, Kis-Rezét, Koppány, Pandúr-szg., Pörböly-Sugó, Sárosalja, Simon-szg., Szomfova, Veránka (TI


- 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna, Koppányzátóny, Kádár-szg., Rezáti-Duna m., Decsi-Nagy-Holt-Duna m., Pál-tanya (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Gemenc, Kádár-szg., Pandúr-szg. (1997 TD), Báló-tó, Buvat, Cserta, Fekete-e., Kis-Rezét, Lassi (1998 TD)
- Urtica urens* L.: Bárányfok (TI 1958)
- Utricularia vulgaris* L.: Ócsényben a Szigethpusztán vízállásos helyeken (HL 1911); Vajasduna (BL 1960); "a Duna holtágaiban" (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna (1996 TD), Szeremlei-Duna (1997 TD)
- Vaccaria hispanica* (MILL.) RAUSCHERT: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Valeriana dioica* L.: Pandúr-szg., magassásosban (JJ 1975)
- Valeriana excelsa* POIR.: dunamelléki erdő (BK 1910)
- Valeriana officinalis* L.: gemenci erdő (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Veránka (KI 1957); Buvat, Cserta, Felső-Pörböly, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Rezáti-Duna m. (RAD. 1992); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét (1997 TD), Cserta, Simon-Duna (1998 TD)
- Valerianella locusta* (L.) LATTERADE: Nagy-Pandúr (BL 1957)
- Verbascum austriacum* SCHOTT: Felső-Pörböly (BL 1957)
- \**Verbascum blattaria* L.: Pandúr-szg. (1997 TD); Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Verbascum phlomoides* L.: Cserta (KI 1957)
- Verbascum phoeniceum* L.: Szekszárd: védgát (HL 1911)
- Verbena officinalis* L.: Felső-Pörböly (BL 1957); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Koppány (TI 1958); JJ 1975; Nyéki-Holt-Duna (RAD. 1992); Kecse-fok m. rét, Pandúr-szg. (1997 TD), Báli-tó, Báló-tó (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD), kiszáradó helyeken szálanként; Szeremle: egykori kubikgödör (1998 KGy, MZs, SD és TT)
- Veronica anagallis-aquatica* L.: gemenci erdő (HL 1911); Gemenc, a Sió-toroktól délre (BL 1959)
- Veronica anagalloides* GUSS.: bátai védgát (HL 1911); Exs.: Zsold-kaszáló (1997. V. 28. TATÁR)
- Veronica beccabunga* L.: Pandúr-szg.: holtág m. (JJ 1975)
- \**Veronica catenata* PENNELL: Báli-tó, Csörösz, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Szeremlei-Vén-Duna, Zsold-kaszáló (1997 TD), Báló-tó, Kis-Rezét, Lassi, Móric-Duna öble, Pandúr-szg., Pörbölyi-e., Sulymos-tó, Szeremlei-Duna (1998 TD), Báta-Duna, Nagy-Rezét (1999 SD), mocsarakban, nedves iszapon nem ritka; Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Veronica chamaedrys* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr, Kis-Rezét (BL 1957), Pörböly-Sugó, Pusztarét, Gemenc (BL 1959); Buvat, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Kis-Rezét, Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Veronica hederifolia* L.: Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Gemenc (BL 1959); JJ 1975; Pörbölyi-e. (1996 TD)
- (*Veronica longifolia* → *Pseudolysimachion l.*)
- Veronica officinalis* L.: BL 1958a
- Veronica peregrina* L.: Koppány (BOROS 1970); Pandúr-szg.: holtág szegélyén iszapon (JJ 1975); Pandúr-szg., Zsold-kaszáló (1997 TD), Báli-tó, Buvat, Malomtelelő, Móric-Duna öble, Sulymos-tó, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), nedves iszapon, bizonyára máshol is; Exs.: Pandúr-szg.: Ó-Falu-tava kiszáradt medrében (1997. V. 23. TATÁR)
- \**Veronica persica* POIR.: Pörbölyi-e. (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD)
- Veronica scutellata* L.: TI 1958; Pandúr-szg.: holtág m. (JJ 1975); Nyéki-Holt-Duna m. magassásosban (1996 TD)
- Veronica serpyllifolia* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Nagy-Pandúr (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Exs.: Pörbölyi-e.: a Kecse-fok m. réten {Baja 75TI3} (1997. V. 26. TATÁR)
- Veronica triphyllos* L.: Szekszárdon a vám körül (HL 1911)
- Viburnum opulus* L.: dunamelléki erdő (BK 1910); Szekszárd: védgát mente, pörbölyi őrház környéke (HL 1911); Nagy-Pandúr, Pörbölyi-e. (BL 1957), BL 1958a, Pusztarét (BL 1959); Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Nagy-Rezét, Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Cserta, Felső-Pörböly, Gemenc, Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Koppány, Pandúr-szg., Simon-szg., Szomfova (TI 1958); JJ 1975; Kádár-szg., Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pandúr-szg. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD)
- Vicia angustifolia* L.: Gemenc (BL 1959); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét (1997 TD), Báli-tó, Lídiák, Pörbölyi-e. (1998 TD), Nagy-Rezét (1999 SD)
- Vicia angustifolia* ssp. *segetalis* (THUILL.) ARC.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- Vicia cracca* L.: BL 1957; Koppány, Cserta, Pörbölyi-e., Kis-Rezét, Veránka (KI 1957); Gyűrűsalj, Sárosalja (TI 1958); JJ 1975; Báli-tó, Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Forgó-tó m., Kecse-fok m. rét, Zsold-kaszáló (1997 TD), Cserta, Lídiák, Malomtelelő, Pörbölyi-e., Pandúr-szg., Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), Nagy-Rezét

- (1999 SD), mocsárréteken; Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY), Nyéki-Holt-Duna m. mocsárréten (1998. VI. 26. TATÁR)
- \**Vicia grandiflora* SCOP.: árvízvédelmi töltésen a Nyéki-Holt-Duna közelében (1998 TD)
- Vicia hirsuta* (L.) S. F. GRAY: Felső-Pörböly (BL 1957), Pusztarét (BL 1959); Pörbölyi-e. (KI 1957); Nyéki-Holt-Duna m. (1997 TD), Pörbölyi-e. (1998 TD); Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Vicia lathyroides* L.: Nagy-Pandúr (BL 1957)
- Vicia pannonica* ssp. *striata* (M. B.) NYM.: gemenci út (HL 1911); Nagy-Pandúr (BL 1957)
- Vicia sativa* L.: Rezáti-Duna m. (RAD. 1992)
- Vicia tenuifolia* RÖTH: Pörböly-Sugó (BL 1959); Fekete-e. (TI 1958)
- Vicia tetrasperma* (L.) SCHREB.: BL 1957; Koppány, Cserta (KI 1957); Lídiák, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD)
- \**Vicia villosa* ROTH: Exs.: Rezáti-Duna partján (1991. VII. 3. FELFÖLDY)
- Vincetoxicum hirundinaria* MEDIK.: Kis-Rezét (BL 1957); Pörbölyi-e. (KI 1957); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Cserta (1998 TD)
- Viola arvensis* MURR.: Felső-Pörböly (BL 1957), Pörböly-Sugó (BL 1959); Buvat, Fekete-e., Gyöngyös-oldal (TI 1958)
- Viola cyanea* CELAK.: Koppány, Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Gemenc (BL 1959); Fekete-e. (1998 TD)
- Viola elatior* FR.: BL 1958a, Pusztarét (BL 1959); Cserta, Pörbölyi-e. (KI 1957); Buvat, Cserta, Gemenc, Sárosalja, Veránka (TI 1958); Nyéki-Holt-Duna m. (1996 TD), Kecse-fok m. rét (1997 TD), Cserta, Pörbölyi-e., Sulymos-tó, Visszafolyó-csat. m. (1998 TD), mocsárréteken és tölgy-köris-szil ligeterdőkben
- Viola hirta* L.: ártéri erdőkben szórványos (JJ 1975)
- Viola mirabilis* L.: Cserta (KI 1957); Pandúr-szg. (JJ 1975)
- Viola odorata* L.: Pörbölyi-e. (BL 1957); Bárányfok, Gemenc, Góga, Gyöngyös-oldal, Keselyűs, Pandúr-szg., Szomfova, Veránka (TI 1958); Decsi-Nagy-Holt-Duna m. (RAD. 1992); Pörbölyi-e. (1996 TD), Pandúr-szg. (1998 TD)
- Viola reichenbachiana* JORD.: Nagy-Pandúr (BL 1957), Nagy-Rezét, Pörböly-Sugó, Gyűrűsalj (BL 1959); Gyöngyös-oldal, Gyűrűsalj, Pandúr-szg. (TI 1958); Pandúr-szg. (JJ 1975); Pörbölyi-e.: keményfaligetben {Baja 71B}, fehérnyarásban {Baja 83D} (1998 TD)
- \**Viscum album* L.: Malomtelelő: *Salix alba*-n (2000 SD)
- \**Vitis riparia* MICHX.: Pörbölyi-e.: erdei út m. {Baja 72J} és Arany-tó m. (1998 TD), Pandúr-szg. (1999 SD)
- Vitis sylvestris* C. C. GMEL.: Góga, Szomfova (TI 1958)
- Vitis vinifera* L.: vadon a dunamenti ligetekben, a védgát m. (HL 1911), lehet, hogy *V. sylvestris*; BL (1956) kéziratában "*V. vinifera (sylvestris?)*" néven szerepel egy Bajától a szerb határig tartó kirándulás fajlistájában, de a pontos lelőhely nem ismert
- Xanthium italicum* MORETTI: Kádár-szg., Pál-tanya (RAD. 1992); Kádár-szg. (1997 TD); Exs.: Pandúr-szg. (1999. IX. 24. STETÁK)
- Xanthium spinosum* L.: Szekszárd: vám, gemenci út (HL 1911)
- Xanthium strumarium* L.: Szekszárd: vám (HL 1911)
- \**Zea mays* L.: Szeremlei-Duna: magassásosban (1998 TD)

### Összefoglalás

Jelen dolgozatban 644 taxon szerepel, ezek közül 78 csak BARTAL (1910) és HOLLÓS (1911) munkáiból ismert, a vizsgált területről azóta vagy eltűnt, vagy a mai Gemenci-erdő területén régen sem fordult elő, 5 pedig valószínűleg téves határozás. 561 faj ma is megtalálható a Duna gemenci hullámterén, ezek közül 90 a területre új. Az új fajok nagy része közönséges gyom, amelyek részben – az intenzív területhasználat következtében – az utóbbi időben kerültek be a vizsgált területre (pl.: *Ambrosia artemisiifolia*, *Xanthium italicum*, *Artemisia annua*), más részük azért nem található meg korábbi szerzőknél, mert – útszéleken, vágásokban, zátonyokon élve – nem szerepelnek pl. a társulástani felvételekben. A jelentősebb, területre új fajok: *Lemnetaea*- és *Potametea*-fajok: *Batrachium rionii*, *Ceratophyllum submersum*, *Potamogeton nodosus*, *P. berchtoldii*, *P. × angustifolius*, *P. panormitanus*, *Najas minor*, *Elodea canadensis*, *Cabomba caroliniana*; *Nanocyperetalia*-fajok: *Lindernia procumbens*, *Blackstonia acuminata*, *Scirpus radicans*, *Schoenoplectus supinus*; mocsári, lág- és kaszálórétű fajok: *Iris sibirica*, *Equisetum hyemale*, *Rumex thyrsiflorus*; *Fagetalia*-fajok: *Lathraea squamaria*, *Paris quadrifolia*, *Helleborus odorus*, egyéb erdei fajok: *Dryopteris carthusiana*, *Epipactis helleborine*, *Stellaria holostea*; az adventívek közül kiemelendő a Duna-völgyből eddig nem jelzett *Cuscuta australis*.

1. térkép. A Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége a dolgozatban szereplő lelőhelyek feltüntetésével



## Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönöm meg TAMÁS Enikőnek (Baja), KALOCSA Bélának (Baja), MÓRO CZ Attilának (Baja), SZARVAS Pongrácnak (DDNPI), VÁRNAGY Dávidnak (Baja), BOZSÉR Orsolyának (Baja), Prof. SIMON Tibornak (ELTE), FELŐ Barnabásnak (DDNPI), MOLNÁR Zsoltnak (MTA ÖBKI), KOHÁRI Györgynek (Baja), TOBISCH Tamásnak (Budapest) és SZAPPANOS Jánosnak (Szeremle), hogy florisztikai megfigyeléseiket közlésre átengedték. Köszönöm Dr. FELŐLDY Lajosnak (Budapest), hogy segített a növényfajok meghatározásában és a herbárium áttekintésében, valamint a kéziratához számos értékes megjegyzést és kiegészítést fűzött. Prof. SIMON Tibor témavezetőnek szakmai tanácsaiért, Dr. KEVEY Baláznak (JPTE) pedig a kézirat elkészítésében nyújtott segítségéért mondok köszönetet. Köszönöm BUZETZKY Győző (DDNPI) területvezetőnek, hogy a terepi kutatásokat lehetővé tette. Köszönet illeti mindazokat, akik a – nem mindig könnyű – terepi munka során segítettek. A kutatásokat az OTKA (F 026134) és a KTM támogatta.

## Summary

Floristical data concerning the Gemenc Region of the Danube-Drava National Park, Hungary  
D. STETÁK

The author summarises her floristical observations on the protected floodplain of the Gemenc Region, as well as all the floristical data found in the literature. With the exception of very old data from the beginning of the 20<sup>th</sup> century, 561 plant species (taxa) can be found on the studied area. 90 of them are new for the area. A lot of the new species are common weeds, but aquatic macrophytes, *Nanocyperion*- and *Fagetalia*-species have also been found, some of them are new for the Hungarian Danube-valley, or rare in Hungary.

## Irodalom

- BALANYI L. (1956, 1957, 1958a, 1959, 1960): A Bajai Állami Tanítóképző Jávorka Sándor Természetrajzi Körének 1955/56., 1956/57., 1957/58., 1958/59., 1959/60. évi munkálatai. – Baja, kézirat
- BALANYI L. (1958b): Baja és környéke néhány érdekes növénye. – Bot. Közlem. **47**: 350.
- BARTAL K. (1910): Adatok Szekszárd környékének flórájához. – Bot. Közlem. **9**(1): 33-40.
- BORHIDI A. (1996): Critical revision of the hungarian plant communities. – Janus Pannonius University, Pécs, 138 pp.
- BORHIDI A. (1998): Nevezéktani korrekciók és egyéb kiegészítések a Magyarországi Edényes Flóra Határozójához. – Kitaibelia **3**(1): 83-89.
- BOROS Á. (1970): Florisztikai közlemények V. – Bot. Közlem. **57**(1): 69-72.
- FEHÉR G. – SCHMIDT A. (1998): Adventív vízipáfrányfaj egy gemenci holtágban: *Azolla filiculoides* LAM. – Bot. Közlem. **85**(1-2): 57-61.
- HOLLÓS L. (1911): Tolna vármegye flórájához – Bot. Közlem. **10**(3-4): 89-108.
- HORVÁTH F. és mtsai (1995): Flóra adatbázis 1.2 Taxon-lista és attribútum állomány. – MTA ÖBKI, Vácrátót. 267 pp.
- JEANPLONG J. (1975): Baja flórája. – kézirat.
- KÁRPÁTI I. (1957): A hazai Duna-ártér erdei. – Kandidátusi értekezés, Vácrátót, kézirat.
- KÁRPÁTI V. (1963): Die zöologischen und ökologischen Verhältnisse der Wasservegetation des Donau-Überschwemmungsraumes in Ungarn – Acta Botanica Acad. Sci. Hung. **9**(3-4): 323-385.
- KEVEY B. – TÓTH I. (1992): A béda-karapancsai Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (*Quercus robori-Carpinetum*) – Dunántúli Dolgozatok Term. tud. Sorozat **6**: 27-40.
- PRODAN Gy. (1915): Bács-Bodrog vármegye flórája – Magyar Botanikai Lapok **14**: 120-269.
- RADEMAKERS, J. G. M. (1992): Vegetations-ökologische Untersuchung im Donau-Auenwaldgebiet von Gemenc, Südungarn – In: Floodplain Rehabilitation Gemenc, Working Document 1A, RIZA, Lelystad, The Netherlands
- ROTHMALER, W. (1988): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD (Schubert, R. und Vent, W. Hrsg.) Band 4: Kritischer Band – Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin
- SOÓ R. – BORSOS O. (1957): Új adatok a Magyar Növényvilág Kézikönyvéhez – Bot. Közlem. **47** (1-2): 95-98.
- TÓTH I. (1958): Az Alsó-Dunaártér erdőgazdálkodása, a termőhely- és az erdőtípusok összefüggése – Erdészeti Kutatások **5**(1-2): 77-160.

## Térképek

- 1: 25.000 katonai térkép (1987) L-34-50-D-c, L-34-50-D-d, L-34-62-B-a, L-34-62-B-b, L-34-62-B-c, L-34-62-B-d, L-34-62-D-a, L-34-62-D-b
- 1: 10.000 erdészeti üzemtervi térkép DN-22-2 (1974), DN-22-3 (1976), DN-23-2 (1980), DN-23-3 (1979), DN-24-2 (1974), DN-24-3 (1979), DN-25-2 (1973), DN-25-3 (1979)
- 1: 10.000 Gauss-Krüger topográfiai térkép L-34-62-B-c-4 (1966), L-34-62-B-d-3 (1964), L-34-62-D-b-1 (1964)
- 1: 10.000 EOY topográfiai térkép 25-312 (1983), 25-314 (1982), 25-321 (1983), 25-323 (1983), 25-334 (1982), 25-341 (1984), 25-343 (1984)